

580

odd

ÍSLENZKA  
GRASAFRÆÐI

AF

Ó. J. HJALTALÍN,

DISTRIKTSKÍRÚRGUS.

*Lundbókasafn*

ÚTGEFIN AD TILHLUTUN  
HINS ÍSLENZKA BÓKMENTAFÉLAGS.

---

KAUPMANNAHÖFN.

Í PRENTSMÍÐJU N. G. F. KRISTENSENS EKKJU.

PRENTUD AF J. D. KVIST.

1830.



Þeim staka lærða yðjusama

Vísdomselskara,

Hávelbornum Herra Konferenzráði

**Dr. J ú r i s M. S T E P H E N S E N,**

Justitiario í þeim konúngliga íslenska Landsýfirrétti.  
Tilsjónarmanni ens konúngliga íslenska Landsnppfræð-  
ingar-félags o. s. fr. o. s. fr.

Mínum ógleymanligum Velgjörara,  
Fyrsta Frumkvöðli þessa Bæklings,  
sem Vottr minnar djúpustu Virðingar og þakklætis

tilcinkuð

andmjúklíkast

af

*O. Hjaltalín.*



## Til Lesarans.

---

**Þ**ess ber ei að dylja að nokkrir meðal landa vorra hafa gefið næg rök til þess, að þeir fræða vildu landsmenn sína um urtir, þær er á voru landi gróa: nefni eg þartil á seinni tímum viselögmann Eggert Olafsson, landfysikus Bjarna Pálsson, prófast Björn Haldórsson og kammersekretæra Olaf Olavíus er að visu vandliga hafa lýst ei að eins ræktunarmáta einstakra, heldr og svo nytsemi margra eðr velflestra villiurta. En allar ritgjörðir þessara manna sýnast mér vantað hafa hið nauðsynligasta, nefnilega nákvæma lýsing sjálfra urtanna, hvaraf þær þekkjast og aðgreinast kynnu hvör frá annari. Nú vita allir að þekking hvörs hlutar verður að ganga á undan lærdómnum um nytsemi hans, egi þessi síðari nokkuð að gylða.

Hér af flýtr að ofantaldar ritgjörðir eigi hafa að svo miklu gagni komið, sem þær að öðru leiti gjört hefðu, og land vort hefir þessvegna mátt ánvera nauðsynligra grasafræða.

Það hefði og að öllu leiti verið forgefins að vænta slíkrar ritgjörðar af mér, hefði eigi sá að útbreiddun lærdómi og stakri yðjusemi alkuinni landi vor, Hra. Konferenzráð Dr. júris

M. Stephensen, jústitiarius í landsins yfir-  
rætti, hértil ei einasta upphvatt mig, heldr og-  
svo með sínum ráðum og nauðsynliga bóka  
láni, styrkt og viðborgið minum í slíku starfi  
veika mætti. Með hans styrk hefi eg því  
samið ritkorn þetta, er lýsa á velflestum urt-  
um lands vors, þannig að bæði þekkist þær  
sjálfar sem og nytsemi þeirra, eptir þeim regl-  
um, sem viðteknar eru af urlaþekkjurum (bo-  
tanister).

I tilliti til sjálfs bæklingsins sýnist mér  
nauðsynligt að geta þess:

1. Að hann samanlesinn er, og útlagðr  
úr ýmsum skrifum urlaþekkjara, og lagaðr  
sem kunnátta mín til var, eptir þeirra máta;  
nefni eg þartil náttúruspekinginn Karl Linné,  
prófessor Oeder, en enkum prófessor í  
grasafræðinni og riddara J. W. Hornemann,  
hvörs mükilsmetnu ritgjörð: Forsøg til en  
dansk økonomisk Plantelære og all-  
staðar, hvar möguligt var, fylgt hefi. Hérað-  
auki hefi eg til samanburðar haft við höndina  
Georg Wahlenbergs Floram Lapponicam;  
Samúel Liljulaðs svensku Floram; Kæn-  
igs Floram Islandicam; Mohrs Forsøg  
tilen islandsk Naturhistorie; Sra Björns  
Haldórssonar Grasnytjar og Hra. Konfer-  
enzráðs Dr. júrís M. Stephensens snotru Af-  
handling, om de til Menneskeføde  
brugelige Tangarter, og aðrar fleiri  
minna markverðar ritgjörðir; og að endingu  
hér og hvar lagfært verk þetta, eptir þeim



athugasemdum, er sá lærði og grasafróði Hra. distrikts-kirúrgus Sveinn Pálsson hafði gefið mér þaryfir.

2. Allt hvað nytsemi og brúkun urtanna, svo vel til lækninga sem búskapar hagnytja snertir, er slíkt samið, sumpart eptir eigin reynslu, sumpart eptir fyrirmælum áðrtaðra ritgjörða; og kunna þeir tilteknu skamtar opt að vera heldr linir enn frekir, en eg vona að hvörs og eins reynsla muni héra bót ráða; þar eg áleit betra, að sú tilætlaða verkun nokkuð frestaðist, heldr enn að ofsterkir skamtar settu nokkurn í hættu eðr vanda. Þó má eg hærhjá geta þess, að fæstar urtir lands vors hafa hastarliga sterka verkun (drasticæ), og er því sem optast óhætt að frekja skamt þann, sem tiltekinn er, þó með varúð, og að aðgættum kröptum og aldri þess veika.

3. Hvað áhrærir nöfn urtanna og þeirra einstöku parta, hefi eg leitast við að smíða þau svo lík túngu vorri, sem eg bezt kunna, og þó á einstaka stað orðið að brúka en útlenzku. Orsök þessa hefir að nokkru leiti verið vankunnátta mín, er eg ei þekkti öll annars máskemöguliginnlensk urtanöfn, og að nokkru leiti fæð túngumáls vors á slíkum nöfnum, en með því slíkt er sameiginligr brestr flestra túngumála, að þau nefniliga í fyrstu vanta orð eðr nöfn til þess er ný vísindi og kunstir útheimta, þá vona eg að slíkt eigi til fram-  
búðar hindri nytsemi bæklingins.

Að endingu má eg viðrkannast að margt og mikið kann að vera áfátt í ritkorni þessu, bæði hvað snótrt mál og skiljanliga útskýringu áhrærir; en — þar engum er lánað að kveða betr enn kann, eru það einustu úrræði mín, að biðja þá betr sjáandi um vorkun og umburðarlyndi, eins og eg ætíð skal meta það þá gleðligustu umbun míns léttvæga erfiðis, geti það í nokkru styrkt framför þekkingar, velmegunar lífs- og heilsu-betrunar minna elskudu landsmanna.

Grundarfróði þann 20ta janúar 1826.

Ó. HJAL'TALÍN.

---

---

## I n n g á n g r.

---

**Þ**að er óefandi sannleiki, að á landi voru spretta urtir allmargar, sem til lækninga og annara lífsins nauðsynja kynnu, framar enn skeðr, saman safnast og notast, ollir því meir vankunnátta og vanefni, heldr enn ei tilsæu, að þeirra kraptar ekki verða oss að gagni.

Þrennt er það sem útheimtist til þess, að maðr notað geti sér, sem vera ber, blómstríkisins auðlegð:

1. Nákvæm þekking urtanna sjálfra.
2. Þekking máta þess, er brúka skal, við söfnun, þurkun og geymslu urtanna.
3. Þekking á urtanna kröptum og nytsemi, blandi, og yfirhöfuð allri tilreiðslu þeirra, til verkunar þess góða, er þær af náttúrunnar herra tilætlaðar eru.

Þareð það er víst, að manneskjan með urtnuðum kann að fullnægja síns lífs og uppheldis stærstu kröfum, kann af þeim að fá fæði, klæði, húsaefni og læknisdóma, er ei að undra þótt manneskjan fljótt hafi skynjað þeirra ágæti, og rótfest sér þeirra eiginligleika, og að þarfyrr seinna hafi kviknað vísindi þau, sem kallast grasafræði eðr *botanik*,

hvör þó að sönnu í fyrsta var ófullkomin, en hefir nú á seinni tímum náð rétta vísinda-formi.

Það væri að öllu leiti ómöguligt að grannskoða og þekkja þann ótöluliga fjölda allra nú fundinna urta, ef menn ei til léttrirs sèr niðröðuðu þeim í vissa orðu: orða þessi kallast *system*, en til að geta ákvarðað þeirra rétta stað í systeminu, er nauðsynligt að ánefna þeim ýmislig kennimerki. Kennimerki þessi kunna samt eigi alltið að útskírast með almennu máli, hafa menn því neyðst til að smíða sèr margvíslig Vísinda-orð (*terminos*), sem þó öll útleggjast í Vísinda orðanna útskíringu (*terminólógi*).

## T e r m í n ó l ó g í

eðr

### Vísinda-orðanna útskírung.

Urtirnar eru festar við vissan stað, t. d. jörðina, steinana eðr aðrar urtir, partr þeirra sá, hvarmeð þær festar eru við tèða hluti, kallast Rót, og eru fáar urtir til, sem ei hafa hana, að undanteknum nokk-  
rum af 23ja hópnun.

Rótin (*Radix*) er:

trèlík (*lignosa*), þètt og hörð sem af trè væri;  
kjötlig (*carnosa*), af kjötilíku efni;  
holótt (*loculosa*), sem innanf hefir mörg geymsli;  
hol (*cava*), sem er hol innan;  
þètt (*solida v. integra*), þètt og án hola innanf;  
einföld (*simplex*), sem enga ánga hefir;  
greinótt (*ramosa*), sem skiptist í margar greinir;

hárilík (*capillaris*), sem hefir margar smáar og hárilíkar greinir;

þræðilík (*filiformis*), sem er ærið mjó og jafnþykk;

aungótt (*fibrosa*), sem hefir marga þræðilíka ánga;

sívöl (*cylindriaca*), sem er sívöl og allstaðar jafnþykk;

ormlík (*vermicularis*), sívöl, en í smáhlykkjum sem ormr;

þveingilík (*sarmentosa*), sívöl, laung og mjó;

liðótt (*articulata*), er sú rót, sem hnúta hefir á sér, en er nokkuð mjórri á milli þeirra;

tönnótt (*denticulata*), er kjötlig rót með smá-nöbbum útúr;

vendilík (*fasciculata*), með margar og mjóar kjötligar rætr, sem ofantil samtengjast í eitt;

hendilík (*palmata*), er kjötlig rót, sem ofantil er heil, en neðantil skiptist í marga smáparta sem fingr;

tvíhnöllótt (*testiculata*), nær tveir kjötligir, aflángir eðr hnöllóttir líkamir hánnga samfastir ofantil;

toppilík (*fusiformis*), er sem toppr þykk ofantil, en fer ætíð jafnt mjókkandi niðreptir;

afbitin (*præmorsa*), er sem afbitin væri fyrir neðri endann;

kúlulík (*globulosa*), er sem kúla, með smáaungum útúr;

róumlík (*napiformis*), ofan þykk, en neðan með mjóum enda;

hnúskótt (*tuberosa*), er samanstandr af mörgum kjötligum hnúskum, þessir hánnga nú annaðhvort

saman við endann á staunglinum, og kallast þá rötin

sitjandi hnúskótt (*tuberosa sessilis*); eðr og þessir hnúskar eru samanbundnir með smáþráðum og kallast hún þá

hángandi hnúskótt (*tuberosa pendula*);

kornótt (*granulata*), er samanstendr af mörgum smáum kjötligum hnöttóttum kornum eðr þörtum; laukilík (*bulbosa*), nær rötin er kjötlig og hnöttótt, en er samansett, sem með lögum eðr hinnum hvört utanyfir öðru;

vazflöt (*horizontalis*), nær rötin liggr lángs með jörðunni, án þess að stíga upp eða niðr;

rètthángandi (*perpendicularis*), þegar rötin gengr rött niðr í jörðina;

skáhöll (*obliqua*), nær hún gengr skáhöll niðr í jörðina;

skriðandi (*repens*), þá rötin gengr vazflöt, en þó undir sverðinum, og gefr smáþræði frá sér;

skrámótt (*cicatricata*), með holum útvortis, sem opt framkoma af affalli blaðstaunglanna;

hreystruð (*paleacea*), sem hefir smátt og þunnt hreystri utaná.

Framvegis kallast rötin:

árleg (*annua*),

tveggja ára (*biennis*) og

ævarandi (*perennis*).

Staungullinn (*Cormus*).

Urianna blöð og blómstr spretta annaðtveggja beinleiðis útaf sjálfri rötinni, eðr þau berast af

einhlvörjum öðrum líkama, sem eptir sínu efni og ásigkomulagi hefir ýmislig nöfn, t. d.

Staungull (*caulis*) kallast hann enkum hjá þeim eiginligu urtum, hann ber þar blöð og blómstr.

Kvíslar þær, hann síðan skiptist í, kallast greinar (*rami*).

Bolr (*truncus*) finnst alleina við eikr og trè, hann ber, sem áður er greint, blöð, blómstr og greinir.

Stráid (*culmus*) á heima hjá strágrösunum.

Stafr (*stipes*) á heima hjá sveppunum og orðu þeirri, er hefir inni að halda Tófugras, Eltíngar, Túnglurtar- og Jafnakynið,

Skaptið (*scapus*) er staungull, sem ber blómstr en engin blöð.

Mosastaungull (*surculus*) á heima hjá mosunum.

Vínkræklur (svipa), (*sarmentum*) eru langar þræði líkar og ófrjósamar rótatægjur, sem fyrst ganga upp úr jörðunni, og síðan niðr í hana aptr, og þá fyrst bera nýja urt.

Reingla (*stolo*), eru blöðum settar skriðandi og ófrjósamar rótatægjur, sem þó á efri enda bera nýja urt.

Blaðstaungull (*petiolus*) er leggrinn, sem heyrir til hvörju blaði.

Blómstrstaungull (*pedunculus*) er leggrinn, sem ber hvört blómstr.

Í tilliti til Staungulsins (*caulis*) hefir maðr tilfundið eptirfylgjandi Kunst-ord.

a. Í tilliti til staðarins, sem hann stendr á: sníkjandi (*parasiticus*), þá rætr hans eru fastar við aðrar urtir;

sveimandi (*natans*), er hann flýtr á vatni;  
niðrsokkinn (*demersus* og *submersus*), þá hann  
er niðri í vatni.

b. *I tilliti til hvörnig hann sýnist, þá yfir þvert er  
skorinn:*

sívalr (*teres*), þegar hann er sem kefli;  
hálssívalr (*semiteres*), nær hann er sívalr á eina  
síðu, en flatr á aðra;  
samanþrykktr (*compressus*), nær hann er flatr á  
báðar síður;

tvíeggjaðr (*anceps*), þá leggrinn er flatr, og hefir  
2 eggjar hvörja móti annari;

streindr (*angularis*), hafi hann fleiri enn 2 eggjar,  
á hvörjum hærri ber enn hliðunum, soleidis  
eru til 3- 4- 5- og marg-streindir staunglar (legg-  
ir), (*tri- quadr- quin- mult- angularis*);

þrístreindr (*trigonus*), hefir 3 sljófar eggjar og  
3 flatar síður;

liðótttr (*articulatus*), hafi leggrinn liði á sèr, og  
sèu þeir ekki digrari enn staungullinn sjálftr;  
þarámóti sè hann digrari um liðina enn annar-  
staðar, kallast hann (*nodoso-articulatus*).

c. *I tilliti til ytri dsýndar og þeirra hluta, sem utand  
hönum finnast:*

nakinn (*nudus*), sè hann hvorki blöðum, flækjum,  
eðr öðrum aukapörtum gæddr;

blaðlaus (*aphyllus*), vanti hann að eins blöðin;

næstum blaðlaus (*subaphyllus*), hafi hann mjög  
fá blöð;



- blöðótttr (*foliosus*), með mörgum blöðum;  
 blaðgengr (*perfoliatus*), gángi hann gegnum  
 blað eitt;  
 hreystraðr (*sqamosus*), hafi hann sem hreystr á  
 sèr;  
 vængjaðr (*alatus*), finnist á 2 eða fleiri síðum  
 staungulsins aflánger, upphækkaðar, niðravið-  
 gángandi himnur;  
 sprunginn (*rimosus*), sè hér og þar á berkinum  
 sprungur;  
 korkbarkaðr (*suberosus*), sè börkurinn mjúkr,  
 láti undan átaki, en taki sig þó aptr;  
 himnuklæddr (*tunicatus*), er þá börkurinn er  
 utan klæddr himnu, sem þó losar sig sjálf frá  
 hönum;  
 háll (*lævis*), sè ytra borð hans án randa, ráka  
 eðr annara ójafna;  
 slètttr (*glaber*), sè ei á hönum hár, bustar eða  
 broddar;  
 glansandi (*nitidus*), gljái á hann;  
 strikaðr (*striatus*), sèu á hönum rákir, er gángi  
 lángs staunglinum;  
 skurðótttr (*sulcatus*), sèu rákir þessar djúpar og  
 breiðar;  
 fylldr (*tomentosus*), sèu á hönum þèttvaxin, stutt  
 og mjóvaxin hár, sem þó ekki eru so fast sam-  
 flækt, að eigi verði aðskilin;  
 óslètttr (*scaber*), geti maðr þreifað en ei sèð smáa,  
 útstandandi brodda;

snarpr (*apser*), sèu broddar þessir mjög stíngandi og auðfínnanligir;  
 ullaðr (*lanatus*), sè hann klæddr laungum þètt-  
 vaxnum hárum, sem þó geta aðskilizt;  
 loðinn (*villosus*), er hann hefir laung og mjúk hár;  
 starhærðr (*hirsutus*), hefir þètt og óþýðlig hár;  
 stríhærðr (*hirtus*), hafi hann óþýðlig, meðalmáta  
 laung og ekki þètt hár;  
 hvasshærðr (*hispidus*), líkr þeim fyrri, en hárin  
 eru óþýðligri og ennú styttri;  
 flathærðr (*strigosus*), með stuttum, niðrbeygðum  
 óþèttum hárum;  
 hærðr (*pilosus*), með laungum hárum ei þèttum;  
 dúnhærðr (*pubescens*); hefir stutt, fín, þètt og  
 mjúk hár;  
 silkihærðr (*sericeus*), með fínum beygðum, silki-  
 líkum glansandi hárum;  
 broddaðr (*aculeatus*), sitji broddarnir aðeins fastir  
 í berkinum;  
 þyrnumbúinn (*spinosus*), sitji broddarnir fastir í  
 trènu sjálfu;  
 mjúkbrottaðr (*muricatus*), sèu broddarnir stuttir  
 og mjúkir;  
 límugr (*viscidus*), sè hann yfirklæddr með seigum  
 og límugum vessa;  
 laukberandi (*bulbiferus*), nær hann, þar sem grein-  
 irnar kljúfast, ber laukmyndaða líkam.

d. Í tilliti til skapnaðarins, og hvörnig hann stendr.  
 heill (*simplex*), sem engar greinir hefir;  
 greinóttir (*ramosus*), sem hefir greinir;

tvískiptr (*dichotomus*), skipti greinirnar sér í 2 staði;

þrískiptr (*trichotomus*), ef þær á sama hátt skiptast í 3 staði;

krossgreinótttr (*brachiatas*), nær greinir þær, er standa hvör á móti annari, eru so settar, að þær mynda kross með þeim, sem fyrir ofan og neðan eru;

hrísilíkr (*virgatus*), hafi hann margar lánar, skiptar og mjóar greinir.

e. Í tilliti til þess, hvörnig hann stendr.

uppréttr (*erectus*), þá hann stendr að segja beint upp, sem sjá má hjá flestum urtum;

rèttuppstandandi (*strictus*), standi hann beint upp;

skáhállr, sjá rótina;

uppstígandi (*ascendens*), liggi hann niðr við rótina fyrst flatr við jörðina, síðan reisi sig bögnn uppávið, en sè þó efst beinn upp;

niðráviðbeygðr (*declinatus*), þá hann gengr niðrávið, þvertámóti sem hinu fyrri;

lotinn (*nutans*), nær efri endi hans beygist mót jörðu;

margskiptr (*diffusus*), nær hann annaðhvort hefir margar óregluliga útdreifðar greinir eðr staungla;

svarðliggjandi (*procumbens*), þá hann aldeilis liggir flatr á jörðun;

niðrlagðr (*decumbens*), nær mestr hluti hans, að neðsta partinum undanteknum, liggir á jörðu,

skriðandi (*repens*), nær hann er liggjandi, og skýtr  
 rótum víða frá sèr;  
 rótumskjótandi (*radicans*), nær staungullinn er  
 vètttr, en skýtr rótum í aðra hluti;  
 hlykkjóttr (*flexuosus*), til og frá með bugðum;  
 snúinn (*volubilis*), nær hann er sem undinn utan  
 um annann hlut, annaðhvort til hægri hliðar eðr  
 móti sólu, eðr vinstri hliðar, sólennis;  
 klifrandi (*scandens*), nær hann heldr sèr á lopt,  
 við að festa sig við aðra hluti, en þó ekki með  
 rótum.

f. Í tilliti til hans innvortis ástands.

stinnar (*rigidus*), láti hann ei beygja sig;  
 linr (*laxus*), sè hægt að beygja hann;  
 keyrilíkr (*flagelliformis*), nær hann er þunnr, lángtr,  
 veikr og liggjandi;  
 kræklóttr (*sarmentosus*), þá hann er veikr upp-  
 stígandi, og styðst við aðra hluti;  
 þèttr (*solidus*), þá hann er harðr og þèttr;  
 mergjaðr (*farctus*), þá hann er mergfullr;  
 holóttr (*fistulosus*), þá hann í mergjar stað er  
 holr innan;  
 tangóttr (*fibrosus*), geti maðr rifð hann í smátangar;  
 trèlíkr (*lignosus*), sè hann af trè;  
 kjötilíkr (*carnosus*), sè hann mjúkr og kjötíkr;

g. Í tilliti til tímanis, sem hann varir í.

eins árs (*herbaceus*), standi hann aðeins eitt ár,  
 ævarandi (*perennis*), þá rót hans lifir, þó staung-  
 ullinn árlega falli;

trèlíkr (*arboreus*), nær á einum einasta stofni eru margar greinir ofantil;  
 hríslótttr (*fruticosus*), sem neðanfrá annaðhvort hefir fleiri greinir eðr staungla;  
 hálfuleíti hríslótttr (*subfruticosus*), þá stofninn viðvarir, þó greinirnar visni ár hvört.

### Greinirnar (*Rami*) eru:

mótstæðar (*oppositi*), standi þær rött á móti hvör annari, þó sín á hvörja síðu;  
 missettar (*alterni*), standi þær á víxl sín á hvörja síðu;  
 tvísettar (*distichi*), gjöri greinirnar eins og 2 raðir sína hvörju megin;  
 kransilíkar (*verticillati*), standi þær í krans um kring staungulinn;  
 dreifðar (*sparsi*), standi þær hingað og þangað án orðu;  
 þèttstandandi (*conferti*), standi þærmjög nærri hvör annari;  
 fjærstandandi (*remoti*), standi þær langt hvör frá annari;  
 einsháar (*fastigiati*), sèu þær jafnháar;  
 þyrnumlíkar (*spinescentes*), sè endinn á þeim óþýðr og hvass sem þyrnir;  
 opnar (*patentes*), standi næstum beint út frá staunglinum;  
 útspanaðar (*divaricati*), standi þær aldeilis beint út,  
 niðrbeygðar (*deflexi*), nær þær beygjast sem bogi niðrávið.

niðrhángaði (*reflexi*), húngi þær næstum niðr með staunglinum;

samanhnepptar (*coarctati*), þá endar þeirra eru beygðir innávið, og liggja næstum hvör á annari;

uppréttar (*erecti*), standi þær rættar upp;

ármerktar (*annolini*), fái þær lið fyrir hvört ár.

*Um stráíð heitir og, að það sè*

burstalíkt (*setaceus*), þá það líkist svinsbursta eðr hári;

slíðrað (*vaginatus*), sè það slíðrað í nedri enda blaðs;

kujábeygt (*geniculatus*), sè það við neðsta lið knébogið;

áun liða (*enodis*), sem hvorki hefir lið nè hnúta; skáhallt (*obliquus*), standi það skáhallt upp;

Öll þau orð, er brúkast um skaptið, stafinn og mosastaungulinn, eru áðr framfærð, einasta er þess að geta, að Blaðstaungullinn kallast

kirtlumbúinn (*glandulosus*), þá hann er útbúinn smáum líkömum, er líkjast kirtlum.

**Blómstrstaungullinn (*pedunculus*)**

ber alleina blómstr, og kallast

1—2—3 blómstr-berandi (*uni-bi-tri-florus*), sameiginligr (*communis*), sèu fleiri blómstr á þeim eina;

smástaungull (*pedicellus*), kallast smáleggir, er sameinaðir mynda þann stærri staungul;

rótstaungull (*radicalis*), komi einstakr blómstr-  
staungull frá sjálfri rótinni;

kögrlagður (*fimbriatus*), sè hann á röndunum  
sem lagður með kögri;

Allt annað, sem hér segjast kaun um blómstr-  
staungulinn, er áður ungetið við staungulinn.  
Máti sá, er blómstrstaungullinn skiptist á, og sá  
ýmisligi háttur, hvarmeð blómstrin festast á hann,  
kallast með einu orði

### Blómstrunarform (*Inflorescentia*),

hvaraf fylgjandi eru þau markverðustu:

#### Axið (*Spica*)

samaustendr af höfuð- eðr axlegg (*rachis*), hvará  
í röðum sitja blómstr, sem annaðhvort hafa eng-  
an eða mjög stuttan legg. Það er:  
einfalt (*simplex*), sè axleggriinn óskiptr;  
samansett (*composita*), beri höfuðleggriinn mörg  
smáox (*spiculas*).

Síðvanaligt er að kalla blómstrin, sem inui-  
lukt eru á grasategundunum í smáblöðrum, og svo  
öx, og kallast þau þá, eptir blómstranna tölu,  
1-2-3- blómstruð (*uni-bi-tri-flora*),

búkmikið (*ventricosa*), þá það er mikið þykk-  
vara í miðju enn til beggja enda;

huykilmyudað (*glomerata*), þá það samaustendr  
af mörgum samföstum smáöxum;

einuar síðu (*secunda*), sèu öll blómstrin á eina  
síðu;

millumbílað (*interrupta*), sèu berir staðir á millum blómstrauna;

kranslíkt (*verticillata*), þá blómstrin sitja í smáum kröusum;

2 til 6 sett, þakið, sívalt, rætt, eggilíkt, blöðótt og flatt, er áður fráskírt.

### Klasinn (*Racemus*)

er einu stór höfuðleggr, frá hvörjum á lengdina útsprínga smáir blómstrberandi og einslángir leggir. Hann er:

einu sýðu (*secunda*), þá öll blómstrin snúa á eina sýðu.

### Hálfskýla (*Corymbus*),

frá höfuðleggnum útsprínga aðrir miðni leggir með blómstrum á, hvaraf þeir neðstu eru lengstir, en ná allir nærri eins langt upp.

### Skýla (*Umbella*).

Þá aðskiljanligir nærstum einslángir blómstrleggir eðr geislar (*radii*) útsprínga frá einum stað:

Skýlan er annaðlívort.  
einföld (*simplex*), eðr og  
margföld (*composita*);

þá nefniliga, er tæðir blómstrleggir bera aðrar smáskýlur. Sú fyrsta kallast þá

Stórskýla (*umbella universalis*),  
og hin síðari



### Smáskýla (*umbellula v. umbella partialis*).

Hún er:

fáleggjúð (*depauperata*), þegar geislarar eru fáir, halfkúlu- og kúlulík (*semiglobosa* og *globosa*), sitjandi, leggjúð, þétt, ávöl, og flöt, (s. blöðin og rætrnar), geislablómstruð og jafublómstruð, (s. krónuna).

### Skûfr (*Cyma*).

Höfuðleggirnir standa nærri hvör öðrum við nedri endann, en skipta sér stöðan óregluliga í númeri leggi. Skûfrinu er 3 til 5 skiptr (*tri-, quinque-fida*), sjá undangangandi.

### Blómstrhöfuð (*Capitulum*).

Þá mörg smáblómstr, sem annaðhvort hafa enga leggi eðr og stutta, eru samtengd í eitt höfuð. Söu blómstrin mjög lítil og fá, en myndi þó sem eitt lítið höfuð, kallast það

### Hnoða (*glomerus*).

### Biadini (*fasciculus*)

er, þá margir stuttir, og nærri jafnlangir, blómstrleggir standa þétt saman á enda staungulsins.

### Krans (*verticillus*)

kallast, þá mörg smáblómstr sitja í hring um staungulinn; þvílíkir kransar eru oft margir á einum staungli, og er mislángt í milli þeirra, þeir fá auknöfn, eftir blómstranna fjölda. Kransinu kallast

hálfir (*dimidiatus*), þá kranslunn er umkríng hálf-  
an staungulinn;  
blómstrblöðumbúinn (*bracteatus*), hafi hann  
blómstr - blöð;  
nakiinn (*nudus*), þá hann hvorki hefir blómstr-  
blöð nè önnur blöð.

### Toppr (*Panicula*).

Nær á lánveginn frá höfuðleggnum útganga  
aðrir smærri leggir, hvörjum óregluliga er skipt.  
Han kallast

blaktandi (*flaccida*), þá hann hefir lángr greiur,  
sem blakta língað og þángað.

### Kögr (*Thyrusus*).

Líkist þeim undaugángandi, hvað leggjanna að-  
greining og afstöðu áhrærir, en hér eru blómstrin  
so þykkt samanpressuð, að leggirnir geta eigi sæt  
fyrir blómstruum.

### Strengir (*Amentum*).

Samanstendr af einum höfuðstauugli, er hefir  
á sér líkt sem smáhreystr, hvarundir blómstrið  
sjálft liggr, og kallast  
þunnir (*gracilis*), þá hann er smár og lángr.

### Blómstrblettir (*Sorus*).

Svo kallast smáir blettir, sem myndast af blómst-  
runum eðr fræhúsunum, og eru að sjá neðan til  
á burknablöðum (*polipodii*); þeir eru kríng-  
lóttir (*subrotundi*), og aflángir (*lineares*).

Blöðin (*Folia*).

## 1. einföld Blöð

## a. Í tilliti til Broddsins:

hvasst (*acutum*), nær það yzta af blaðinu er hvasst;  
 úthvesst (*acuminatum*), sè broddrinn sem útteygðr  
 væri;  
 sljóft (*obtusum*), þá endinn af blaðinu er snubb-  
 óttur;  
 stíngandi (*mucronatum*), þá broddrinn er so  
 hvass, að hann stíngur;  
 afkubbað (*truncatum*), þá broddrinn er sem af-  
 skorinn;  
 þrítennt (*tridentatum*), þá broddrinn er sem  
 kubbaðr, enn hefir þó 3 tenur;  
 afbitið (*præmorsum*), sjá rótina;  
 oddskorið (*emarginatum*), þá endinn af einu af-  
 kubbuðu blaði er sem innskorinn væri;  
 innþrykkt (*retusum*), sè sem lítil bugða í enda  
 blaðsins.

## b. Í tilliti til neðri enda blaðsins.

hjartalíkt (*cordatum*), nær blaðið líkist eggi, en  
 skiptist neðantil í 2 krínglóttar blöðkur;  
 nýrumlíkt (*reniforme*), þá það ofantil er aflángt,  
 krínglótt, breiðara enn lengdinni samsvari, og  
 skiptist neðantil í 2 hálfkrínglóttar blöðkur,  
 sem standa langt hvör frá annari;  
 ójafnt (*inæqvale*), þá það er lengra neðantil öð-  
 rumegin;  
 skeytilíkt (*sagittatum*), þá eitt ofantil hvasst

blað skiptist neðantil í 2 afláugar, hvassar blöðkur, sem þó hánaga niðr;  
 spjótilíkt (*hastatum*), líkt undangángandi, nema neðri blöðkurnar standa út;  
 sporalíkt (*calcaratum*), þá eitt blað hefir sem 2 spora á neðri enda sínum;  
 eyrt (*auriculatum*), hánagi á neðri enda blaðsins 2 blöðkur, sem líkjast eyrum.

c. Í tilliti til ummálsins.

krínglótt (*orbiculatum*), þá blaðsins þvermál allstaðar er jafnlángt;  
 nærþvíkrínglótt (*subrotundum*), nær það líkist því undangángandi, utan að þvermálið er ei allstaðar jafnt;  
 aflángt (*ovale*), þá báðir endarnir eru jafubreiddir, en breiddin hærumbil helfangi minni enu lengdin;  
 lánngleitt (*oblongum*), líkt hinu, utan breiddin er miklu minni enu lengdin;  
 eggmyndað (*ovatum*), nær lengd þess er meiri enu breiddin, og mjókkar til beggja enda, sem þó eru ávalir;  
 rekumyndað (*spatulatum*), þá það er hálfkrínglótt í efri endanu, en mjókkar allt í einu um miðjuna;  
 fleigmyndað (*cuneiforme*), líkt því næstundangángandi, utan að það smámsaman mjókkar, og er askubbað við neðri enda;  
 lensulíkt (*lanceolatum*), þá það verður hvassara til beggja enda;

- sverðlíkt (*ensiforme*), langt blað, sem frá neðri til efri enda smámsaman mjókkar;
- strikmyndað (*lineare*), þá blaðið er mjótt, en allstaðar eins breitt;
- smámjókkandi (*attenuatum*), þá blaðið ætíð mjókkar uppeftir;
- hárlíkt (*capillare*), þá blaðið er mjög mjótt líkt sem þráður;
- alilíkt (*subulatum*), nær blaðið við neðri endanu er strikmyndað, en tilhvesst við efri endanu;
- uálmyndað (*acerosum*), þá blaðið er óþýdt og strikmyndað;
- þrístrent (*triangulare*), þá blaðið myndar sem þríhyrning, og hvörs eins oddr er ogso bladsins oddr;
- múraraspaðalíkt (*deltoideum*), er að sönnu 4-strent, en þær efstu randir 2 eru lengstar, hinar neðri 2 koma þannig hvör saman við aðra, að þær mynda nær því beint strik;
- skakkferhyrnt (*rhombeum*), þá blaðið myndar lánглеitan ferhyrning, hvörs síðuhorn standa nær mitt á milli neðri og efri enda;
- flípað (*lobatum*), þá eitt nokkurnveginu krínglótt blað er útskorið í miðju í 2 eðr fleiri parta, hvarfyrir það og kallast
- tvíflípað (*bilobum*), þríflípað (*trilobum*);
- hendilíkt (*palmatum*), þá eitt krínglótt blað hefir 5 eða 7 jafnstóra flípa, milli hvörra skorur ganga dýpra enu mitt inn í blaðið;
- skipt (*partitum*), þá skorurnar á einu næstum krínglóttu blaði ná niðr til neðri endans;

- leppótt (*laciniatum*), þegar eitt lángleitt blað hefir aðskiljanliga flipa án tiltekinnar myndar;  
 bugðótt (*sinuatum*), nær það á síðunum hefir hálfkrínglóttta útskurði;  
 hálfuggað (*pinnatifidum*), nær það hefir aðskiljanligar skorur inn í síðurnar, sem ná næstum inn að miðju, og fliparnir standa beint út;  
 hörpumyndað (*lyratum*), líkt næst undangángandi, nema að endaflipinn á því er stór og nær því krínglótttr;  
 heflilíkt (*runcinatum*), hafi það stóra-síðuleppa, hvörra efri rönd er ávöl, en neðri röndin íbjúg;  
 óskipt (*integrum*), sè blaðið að öllu óskipt, og hafi engar skorur, það getr þarfyrir haft smá-nabba.

d. Í tilliti til randanna.

- heilrandað (*integerrimum*), sè röndin að öllu heil og óskert, blaðið getr þarfyrir verið 2-3- osfr. -skipt;  
 brjóskrandað (*cartilagineum*), sè röndin brjóski lík;  
 bylgjótt (*undulatum*), sè röndin á víxl beygð upp og niðr;  
 hríngnöbbótt (*crenatum*), sèu á röndinni margir hálfhríngmyndaðir nabbar, sem standa beint út;  
 tennt (*dentatum*), sèu randirnar með smátönnum, sem standa beint út, og ei allnærri hvör annari;

- randhært (*ciliatum*), sè röndin hærð eðr með hárum;
- nagað (*erosum*), sè röndin þannig ójafnt útskorin, sem nōguð væri;
- hríngbugðað (*repandum*), sèu í röndinni breiðir bugir, og milli þeirra breiðar hæðir;
- þyrnumvaxið (*spinosum*), sè röndin með smáþyrni-broddum;
- smátennt (*denticulatum*), sè blaðið tennt, en tennrnar smáar;
- Sagtennt (*serratum*), sèu tennr blaðsins þèttar og hvassar, og oddar þeirra snúi móti enda blaðsins;
- smásagartennt (*serrulatum*), sèu tennr þess mjög smáar og þèttar;
- tvítennt, tvínabbað og tvíhríngnabbað (*duplicato dentatum, serratum, crenatum*).

c. Í tilliti til flatvegsins.

- krúsað (*crispum*), þegar randir blaðsins eru meir útbeittar eða þynntar enn miðjan, hvaraf það þá fær óreglugligar bugtir eðr hlykki;
- flatt (*planum*), kallast almennt kjötligt blað, sem er jafnt á yfirborði sínu;
- íbjúgt (*concarum*), hafi það hvilft í miðju;
- rennótt (*canaliculatum*), hafi það rennu í miðju á lánginn með höfuðríflinu og hliðarnar sèu hærri;
- hrukkað (*rugosum*), hafi það margar æðar, er sèn djúpt liggjandi á efra yfirborðinu, en upphækk-aðar á neðra yfirborðinu;

rykkt (*plicatum*), þegar rykkingar blaðsins eru stórar og regnlugar, byrja við neðri enda, og eru þétt samrykktar;

æðamargt (*venosum*), sèu æðar blaðsins margkvíslaðar, og komi fram af miðrisinu;

sinótt (*nervosum*), gángi ofantèðar æðar frá neðri enda blaðsins, án þess að vera kvíslaðar;

æða- og sinalaust (*avenium enerve*), þvertámóti þeim nærstundangengnu;

þrísínótt (*trinerve*), gángi 3 æðar frá neðri enda blaðsins;

stúngið (*punctatum*), eins og það sè með smáum nálarföllum;

glansandi (*lucidum*), bregði af því glansa;

myrkleitt (*opacum*), sè það án glansa;

litað (*coloratum*), hafi það annan lit en græn-  
an;

hvelft (*convexum*), sè miðja blaðsins meir upp-  
hækkuð en röndin.

#### f. Í tilliti til staðarins.

rótblað (*folium radicale*), þegar það springr út frá rótinni;

fræblað (*f. seminale*), nær það springr út frá fræinni;

staungulblað (*f. caulinum*), nær blaðið sitr á höfuðstaunglinum;

greinablað (*f. rameum*), sem kemr út frá greinunum;

blaðhjáblómstri (*f. florale*), þegar blaðið stendr



nærri blómstrinu, þó áu þess að vera ólíkt öðrum blöðunum.

g. Í tilliti til hvörnig þau standa.

Mótstætt, missett, stráð, þéttstandandi, fjærstandandi, einsett, þakið, tvísett, kranslíkt, s. greinirnar.

3-4-5-6 o. s. fr. saman (*terna, qvina, sena, etc.*), nær 3 eða flejri blöð standa í hring um staungulinn;

stírt (*stellata*), þegar blöð af ótiltekiinni tölu standa í hring um staungulinn með nokkru millibili;

í bindinum (*fasciculata*), nær fjöldi blaða útspríngur frá einum vissum stað;

tví-þrí-fjór-fimm-sett (*bi-tri-quadri-quinque-faria*), nær blaðið er þrí o. s. fr. sett, og optast ásamt þakið.

h. Í tilliti til hvörnig þau eru fest.

leggjað (*petiolatum*), þá blaðið sitr á legg; sitjandi (*sessile*), þegar blaðið hefir engan legg, ávaxið-sitjandi (*basi-solutum*), þegar eitt kjötligt blað soleiðis er fest við staungulinn, að neðri endi þess er laus frá;

skjöldmyndað (*peltatum*), þegar legginn er festr þvínær við miðju á blaðsins flatveg;

niðrhlaupandi (*decurrens*), gáangi nokkuð af sitjandi blaði niður eptir leggnum;

umfaðmandi (*amplexicaule*), þá neðri endi blaðs-

ins umkrúgir, eðr sem umfangur staunguliun;  
 gegnumborað (*perfoliatum*, s. *perforatum*), þá staungullinn gengr í gegnum blaðsins flatveg; slíðrandi (*vaginans*), myndi blaðið sem slíðrar utanum staungulinn;  
 samvaxið (*connatum*), þá 2 mótstæð blöð eru samvaxin við neðri endann;  
 aðvaxið (*adnatum*), þá neðri endi blaðsins er fastvaxinn við staungulinn.

i. Í tilliti til þess, hvörnig það liggr.  
 aðþrykkt (*appressum*), þá blaðið er uppstandandi, og liggr á yfirborðið að staunglinum;  
 upprétt (*erectum*), þá blaðið stendr nærri upp með staunglinum;  
 skáhallt (*obliquum*), þegar neðri endi af blaðsins flatveg stendr beint út að, enn hinn efri beint upp að;  
 innbeygt (*inflexum*), nær efri broddr blaðsins beygist inn að staunglinum;  
 jafntliggjandi (*horizontale*), gáangi yfirflötur þess beint út;  
 ofanáviðundið (*revolutum*), sè rönd blaðsins niðrávið undin, móts við neðra yfirborð þess;  
 opið, niðrávið sveigt, niðrhángandi, rótumskjótandi, sveimandi, niðrsokkið. Sjá staungulina.

k. Í tillitt til efnisins.

Kjöttligt, ávalt, holótt, samanþrykkt, tvíeggjað, s. rótina og staungulinn.  
 himnulíkt (*membranaceum*), þegar blaðið er so

- þunnt, að það ekki samanstendr nema af 2 himnum, sem eru samfastar, eins og flest blöð eru;
- pípótt (*tubulosum*), þá eitt langt kjötligt blað innan til er holt;
- tvípípótt (*biloculare*), þá eitt pípótt blað innan til eptir lengdinni er skipt í 2 rúm;
- liðótt (*articulatum*), þegar eitt sívalt blað innvortis á þvervegin er skipt í fleiri rúm;
- búngótt (*gibbum*), þá bæði yfirborð blaðsins eru búngótt;
- túngumyndað (*lingueforme*), þá eitt samanþrykkt langt blað er ávalt í endann.

## 2. Samansett Blöð.

### a. einfalt samansett (*compositum*),

- þá mörg smáblöð (*foliola*), eru fest við einn blaðlegg;
- fingrað (*digitatum*), þá mörg blöð standa við neðri endann á einum sameiginligum legg;
- þrífest (*ternatum*), þá 3 blöð standa á einum legg;
- fímmfest (*quinatum*), þá 5 blöð standa á einum blaðlegg;
- uggað (*pinnatum*), þá mörg smáblöð standa á báðar síður, á einum sameiginligum blaðlegg;
- misjafnt uggð (*pinnatum cum impari*), þegar efst stendr einúngis eitt blað;
- paruggað (*pinn. c. pari*), þá efst á blaðinu eru 2 smáblöð saman;

mótsett uggað (*opposite pinnat.*), þá smáblöðin standa hvört á móti öðru;

á víxl uggað (*alternate pinnat.*), þá blöðin standa á víxl;

uggað með millibílum (*interrupte pinn.*), þá smáblöðin eru misstór;

mínkandi uggað (*pinn. foliis decrescentibus*), þegar smáblöðin mínka, eptir því sem uppeptir blaðinu kemr;

kambuggað (*pectinato pinn.*), þá smáblöðin eru þétt, og horfa öll eins;

tala smáblaðauna er óviss og aðskiljanlig.

b. tvöfalt samansett (*decompositum*),

Þegar blaðleggrinn skiptist í minni leggi, sem hvör fyrir sig ber mörg blöð:

tvisvarsinnnum þrífest (*biternatum*), þá blaðleggrinn skiptist í 3 parta, sem hvör fyrir sig ber blöð;

tvíuggað (*bipinnatum*), þá staunglarnir á blöðunum bera fleiri staungla, sem hvör fyrir sig er eitt uggað blað.

c. meir enn tvöfalt samansett,  
(*supradecompositum*).

Þrisvarsinnnum þrífest (*triternatum*), þá blaðleggrinn er tvisvar þriskiptr, og sérhvör partir þessara ber 3 blöð;

þríuggað (*tripinnatum*), þegar höfuðleggrinu á hliðunum ber minni leggi, þessir svo aptr enn minni leggi, sem hafa ugga;

Þegar útskíringin ekki er aldeilis fullkomin, en þó betri heldr enn önnur, tilleggst orðið næstum (*sub-*), t. d. næstum eggmyndað (*subovatum*). Þegar myndin snýr þvert á móti því, sem útskíringin, tilleggst orðið umsnúið (*ob-*), t. d. umsnúið hjartamyndað (*obcordatum*), þegar leggriinn er festr við hvassa endann á hjartamynduðu blaði.

Sè blaðið svo myndað, að það líkist tvönnu, líkist það við hvorttveggja, s. s. eggmyndað lensn-líkt (*ovato - lanceolatum*).

*Við einföld blöð skal maðr héraðauki merkja  
fylgjandi athugasemdir,*

Flipi (*lobus*), er ávöl upphækkun á einu inn-skornu blaði.

Leppr (*lacinia*), er hartuær það sama, að því undanteknu, að upphækkanirnar ei eru svo jafnar, og hvassari í oddinu.

Smáblað (*foliolum*), eru smáblöðin í samsettum blöðum;

uggi (*pinna*), eru smáblöðin á uggaðum blöðum; horn (*angulus*), er broddr einnar skoru, sem er inní blaðið.

Búgr (*sinus*), er útskorið íbjúgt millibil millum blaða-leppanna elliðar flípanna.

### Brumið (*Frons*)

eru blöðin á 1tu orðu 23ja hópsins;  
á þarramosunum (*lichenibus*) kallast blöðin  
ogsvo brum;

þan eru hlaupilík (*gelatinosa*), skinnlík (*coriacea*);  
 naflasett (*umbilicata*), sè eitt krínglótt brunn  
 við eina upphækkun á miðjunni fast við þann  
 líkama, sem það vex á;  
 hrúðrilík (*crustacea*), þá þeirra skapnaðr er  
 skorpulíkr;  
 duptilík (*pulverulenta*), þá þeirra skapnaðr er af  
 dupti.\*

### Aukapartar. (*Fulcra*).

eru frá undangángandi aðskildir partar, sem skýla,  
 verja og að nokkru leiti halda urtinni uppréttri;  
 þeir markverðustu þeirra eru:

### Axla eðr Aukablöð (*Stipulæ*).

eru smáblöð, sem opt eru mjög ólík að skapnaði  
 þeim eiginligu blöðum, og standa við nedri enda  
 blaðsins eðr leggsins; þau eru;

tvenn (*geminæ*), ein (*solitariæ*), síðusett (*laterales*);

undir- og yfir-blaðinu (*extra- & intra-folia-cæ*);

mótstæð (*oppositifoliæ*), affallandi (*deciduæ*),

þegar þau falla af skömmu áðr enn blaðið;

burtfallandi (*caduæ*), þegar þau falla af skömmu

eptir að blaðið springr út; og

---

\* Annars er alltitt í grasafræði, að kalla brunið á ofan-  
 töldum urtum allteins blöð, og á öðrum, enkum í  
 lýsingu plantanna.

ævarandi (*persistentes*), þegar þau visna ekki fyrir eun með edr eptir blaðið; brunablettótt (*sphacelatae*), þegar þau hafa mosa-litadan blett á miðjunni.

### Blómstrblöð (*Bracteæ*).

Þau eru annaðhvort hjá eða millum blómstranna, og eru mjög fráleitt þeim öðrum blöðum bæði að mynd og lit; eru mörg þessara samansöfnuð í hóp fyrir ofan blómstrin, þá kallast þau Blaðskúfr (*coma*).

### Slíðrið (*vagina*)

kallast neðri endinn af því blaði, sem er í hring um staungulinn sem slíðr.

### Blaðra (*ampulla*)

kallast lítill huöttóttir, holr líkami, sem er við rótina á nokkrum vatnaurtum.

### Slíðrhimna (*ligula*)

er lítið himnufíkt blað, sem vex á rönd slíðrsins á strágrösunum.

### Bindþráður (*cirrhus*)

er þráðmyndaðr líkami, sem optast er framhald blaðleggsins, og heldr þeim klifrandi urtum föstum, hann er optast sem snúinn væri, og kallast eptir staðnum, sem hann vex á; hann er:

einfaldr (*simplex*) elligar tví-þrí-skiptr (*bi-trifidus*), og 2-4 blöðum setttr (*di-tetraphyllus*)

o. s. fr., eptir því sem blaðið, er hann vex á, hefir 2, 4 eðr fleiri smáblöð.

### Auga (*gemma*)

er lítill nabbi, samanstandandi af skellíkum smáblöðum, og sem hefir inni að halda fyrstu byriun til blaðanna og blómstranna. Blöðin eru með ýmsu móti hère innilökuð; t. d. innundin (*involuta*), ofanáviðundin (*revoluta*), samanundin (*obvoluta*), samanlögð (*conduplicata*), rykkt (*plicata*), kúfúngsmynduð (*circinata*).

### Kyrtlar (*glandulæ*)

eru smáir krínglóttir líkamir, sem optast eru á blöðunum, elligar á staunglinum, sem verka útdömpun og saftanna aðskilnað.

### Þyrnirinn (*spina*), og Broddrinn (*aculeus*),

sjá staungulinn.

### Strí (*arista*)

er svínshári líkr líkami, sem sitr ofaná grasstráa-blómstrunum; það er:

snúðið (*tortilis*), þegar það snýst sem skrúfugánger;

knébogið (*geniculata*), og sitr í broddi (*terminalis*), eðr á hrygg (*dorsalis*) blómstrsins.



Hár (*pili*),

eru klofin (*furcati*), bindinumlík (*fasciculati*), krókmynduð (*uncinati*). Adrar tegundir hárauna eru útskírðar við staungulinn.

Á Sveppunum heitir héraðauki Hattr (*pileus*), sem er kjöttligr líkami, sem ofantil er ávalr, en neðantil íbjúgr, og líkr hatti, sitr a efri enda stafsins, og er að finna með bladsveppunum.

Seglhimnan (*velum cortina*)

er þunn himna, sem nær frá rönd hattsiuns og að stafnum; opt verður nokkuð eptir af himnu þessari við stafinn, þá hattrinn útspríngur, eðr útbreiðir sig, og myndar þá hólk, sem kallast Hríngur (*annulus*). Áðr enn sumir sveppanna útsprínga eðr útbreiða sig, eru þeir inniluktir í himnu einni, er kallast Ábreiða (*volva*).

Blómstrið (*Flos*)

kallast sá partr urtauna, er sem optast hefir annan lit enn þær, og sem sýnir sig nokkrum tíma áðr enn ávöxtur urtarinnar framkemur. Þessi partr urtarinnar innibýrgir eðr skýlir hennar getnaðarlimum, eðr æxlunarverkfærum, hvör verkfæri, eius þó ber senn, eðr án blómstra, sjálf kallast blómstr. Þeir markverðustu partar blómstrsins eru:

Blómstrskýlan (*calix*), Krónan (*corolla*), Hunángshirzlan (*nectarium*), Duptberarnir (*stamina*), Dupthirzlan (*pistillum*). Blómstrið

er einfalt (*simplex*) eðr samansett (*compositus*).

Blómstrið kallast svo, þá margar krónur, sem engan bikar hafa, og hvörra dupthnappar eru sem inngrónir, sitja allir í einum bikar. Hópsett (*aggregatus*) kallast blómstrin, þá margar krónur, hvaraf hvör hefir sinn eigin bikar, sitja fastar á einum sameiginligum bikar, án þess að dupthnapparnir sæu samangrónir. Blómstrið kallast nakíð (*nudus*), hafi það hvorki krónu eðr bikar; en blaðlaust (*apetalus*), þá það einúngis vantar krónuna; bikarlaust (*corollaceus v. aphyllus*), hafi það engan bikar; hannblómstr (*masculinus*), sæu á blómstrinn einúngis dupthberar; húnblómstr (*femininus*), hafi blómstrið einúngis dupthirzlurnar, og tvíkynjað (*hermaphroditus*), hafi það hvoru-veggju verkfærin. Þau samansettu blómstr kallast túngublómstrandi (*semi-flosculosus*), hafi blómstrið einúngis túngumyndaðar krónur; skerborðs-blómstrandi (*discoideus*), sæ blómstrið samsett af pípumynduðum krónum; og geislablómstrandi (*radiatus*), sæ blómstrið samsett af pípumynduðum krónum í miðju, sem kallast Skerborð (*discus*), og á röndunum af túngumynduðum krónum, er kallast Geislar (*radii*).

### Blómstrskýlan (*calix*).

Með nafni þessu nefnast þau eðr það blað, sem umgirda krónuna, þau eru sem optast af þöttara og harðara efni gjörð, og ólítuð, eðr hafa sama lit og urtin.

Blómstrskýlan hefir fylgjaudi tegundir, sem eru bikarinn (*perianthium*), belgrinn (*gluma*), sameiginligi bikarinn (*anthodium*), hreystrið (*squama*), þelið (*pappus*), mosabikarinn (*perichæcium*), hulstr (*spatha*), reifar (*involucrum*).

### Bikarinn (*perianthium*)

umgírðir beinlínis eitt einasta blómstr, og er með 1-2-3-4 og fleiri blöðum (*mono- di- polyphylum*), sèrhvört einstakt blað kallast ogsvo *Fo-liolum*;

einfaldr (*simplex*) og tvöfaldr (*duplex*), þegar eitt blómstr er umkríngt af 2 blómstrbikurum;

visnaði (*marcescens*), sem visnar sköminu eptir að urtin hefir blómstrað;

affallandi (*deciduum*), sem visnar strax eptir blómstrunina;

burtfallandi (*caducum*), sem fellr af, áðr enn urtin hefir blómstrað;

óskiptr, heill á röndum, skiptr, klofinu, sjá blöðin;

tvívaraðr (*bilabiatum*), þá hann skiptist í 2 parta;

gapandi (*hians*), þá bikarblöðin gapa sundr hvört frá öðru;

aptrlokaðr (*clausum*), þegar blöðin hengja sig fast um krónuna;

pípumyndaðr (*tubulosum*), þá bikarinn myndar sem pípu;

útflattr (*patens*), þá blöðin, eðr hinn útskorui  
 partir hanss, stendr rétt út;  
 uppblásinn (*inflatum*), þá hann er gíldr og  
 holr;  
 tilbakabeygðr (*reflexum*), þegar blöðin eðr lepp-  
 arnir eru beygð á bak apr;  
 brjóskilíkr (*cartilagineum*), þá efni hans er  
 brjóski líkt;  
 litaðr (*coloratum*), þá hann hefir annan lit enn  
 grænan;  
 kórónaðr (*corolliferum*), þá krónan vex á bikar-  
 num;  
 nálberandi (*staminiferum*), þá duchtberarnir eru  
 fastir á hönum;  
 styttr (*abbreviatum*), þegar hann er styttri enn  
 krónunnar pípa;  
 sívalr, sjá blöðin;  
 fyrir ofan sitjandi (*superum*), þá hann sitr  
 ofaná ávextinum;  
 fyrir neðan sitjandi (*inferum*), þá hann sitr  
 undir avextinum;  
 trektmyndaðr og flatkragaðr, sjá krónuna;  
 strendr og sem hefir fleiri hliðar (*angula-  
 tum, prismaticum*), þá hann hefir margar strendr  
 og hliðar.

Þeir adskildu partar bikaranna kallast, eins og  
 við blöðin: tennr, leppar o. s. fr.

### Belgrinn (*Gluma*).

Þannig kallast bikarinn á grasstránum, sem  
 optast innilykr hann fleiri enn eina krónu. Blöð þau,

er hann samanstendr af, kallast Blöðkur (*valvulæ*), og eptir tölu þessara og blómstrauna fer og nafn belgsins, hann kallast: einblaðkaðr (*univalvis*), tvíblaðkaðr (*bivalvis*), þrífblaðkaðr (*trivalvis*), hópsettr (*aggregata*).

Sameiginligi Bikarinn (*Anthodium, calix communis*).

Svo kallast bikarinn, er hann innilykr mörg smá blómstr, hvör eð þessvegna eru að útliti sem eitt blómstr væri, hann er einblaðaðr, margblaðaðr, einfaldr, sjá bikarinn;

jafn (*æqvale*), þá blöð hans eru jafnlaung;

þaktr (*imbricatum*), þá hans blöð liggja hvört ofaná öðru;

útþaninn (*sqvarrosum*), þá oddar smáblaðanna beygjast útávið;

toppmyndaðr (*turbinatum*), sè hann mjórri í annan endann enn í hinn, og þaraðauk sívalr;

tvöfaldr (*caliculatum*), nær utan yfir einum bikar standa niðr við neðri enda hanss styttri blöð í hring, sem umgirda hann sem annan bikar.

Þurhimnaðr (*scariosum*), sèu blöðin vessalítill og óþýð;

brendr (*sphacelatum*), sinnist á blöðunum helzt við broddinn, svartleitir blettir, sem brendir væri.

Á þeim hópsettu urtum, sem fyrir utan þann almenna bikar, eumú hafa bikar fyrir hvört eitt

blómstr, kallast þetta hinn eiginlegi bikar (*perianthium proprium*).

### Hreystrið (*squama*).

Með nafni þessu nefnast smáblöð þau, sem hylja blómstrin á Strengnum (*amento*).

### Þelið (*pappus*)

er ein tegund af bikar við þau samansettu blómstr, samanstandandi af hárum, eðr þunnri himnu, það útskrifist greiniligar við Fræið.

### Mosabikarinn (*perichæcium*).

Svo kallast smá þökt blöð, sem eru við nedri enda ávaxtar-staungulsins eðr burstans\*, og eru minni en hin önnur blöð.

### Reifarnar (*Involucrum*)

samanstanda af nokkrum smáblöðum, er mismuna frá öðrum blöðum urtanna, og standa nokkuð dreift í hring krúgum staungulinn, sem blómstrin spretta á, svo að blómstrin eru innilukt, áðr enn þau sprúga út, þær eru einkum að finna við skýlu-urtirnar, og teljast meðal aukapartanna; þær eru: sameiginligar (*universale*), þá þær innilykja stóra skýlu;

minni (*partiale v. involucellum*), þá smáskýlur eru í þeim innibyrðar;

---

\*bursti (*setaecum*) kallast í grásafræðinni eitt óþýdt uppstandandi hár, er líkist svínshárum eðr svínbursta.

hálfar (*dimidiatum*), þá þær umkríngja hálfa eðr aðra hlið skýlunnar; marghærðar (*multisetosum*), samanstandi þær af mörgum smáum óþýðum hárum, er kallast hurstar.

### Hulstrið (*Spatha*)

er lángeitt blað, sem innilykr blómstrið, áðr enn það spríngur út, og umkríngir staungulinn með nedri endanum. Það er himnufkt, og á heima hjá nokkrum tegundum liljugrasanna, líka nokkrum öðrum urtum. Það opnar sig sem optast lángs eptir annari hliðinni, og kallast þá einblaðað (*univalvis, monophylla*); stundum líka á báðum hliðum, og kallast þá tvíblaðað (*diphylla v. bivalvis*); hálfskýlandi (*dimidiata*), þá þáð einungis innilykr eðr skýlir blómstrinu á aðra hliðina; einublómstrisett, 2-blómstrumsett, visnandi, viðvarandi, (s. bikarinn).

### Krónan (*Corolla*)

hún er að finna fyrir innan blómstrskýluna, og umkríngir æxlunar-verkfærin, hún er sem optast af fínara efni gjörð, og varir skemur enn urtin, hefir optast annan enn grænan lit. Krónunnar blöð kallast: krónublöð (*petala*), hún er annaðhvort einblöðuð (*monopetala*) eðr og margblöðuð (*polypetala*), sú fyrri kallast svo, þó skorur sèu á henni, sem ná nærri niðr úr gegu.

Þegar nedri endinn er sívalr og þynnri enn hinn partrinn, kallast hún pípa (*tubus*). Þessa er

að finna við allar einblaðaðar krónur, að þeim undanteknum, sem eru klukku- og hjólmyndaðar. Krónunnar útflatta op kallast Kragi (*limbus*), og pípumunninn kallast Giñ (*faux*), hvarum fylgjandi útskíring brúkast:

krónað giñ (*f. coronata*), þá það er sett með nokkrum nöbbum, sem kallast með einu orði Ginkransinn (*corona*);

aptrlokað (*clausa*), er það hefir ávalt smáhreyst, sem kallast Hetta (*fornix*);

opið (*pervia*), finnist þar ekki aðgreindir líkamir; skeggjað (*barbata*), sjá hunángshirzlurnar.

Krónurnar kallast jafnar (*æquales*), þá þeirra aðskiljanligu partar eru jafnstórir, og ójafnar (*inæquales*), þá partar þeirra eru mistórir;

óreglulig króna (*c. irregularis*) heitir, þá partar hennar eigi eru allir jafnstórir eðr skiptir.

Tegundir enna jöfnu einblöðudu króna eru fylgjandi:

hjólmynduð (*rotata*), sem hefir flatan kraga en enga pípu;

pípumynduð (*tubulosa*), þá pípan hefir engan kraga; þetta nafn tilleggst enkum skerborðs-krónum við samsettu blómstrin;

flatkrögótt (*hypocrateriformis*), er hún hefir flatan kraga og lánga pípu;

ábakbrotin (*refracta*), þá kraginn er sem brotinn og beygðr á bak aptr;

trektmynduð (*infundibuliformis*), þá pípan smám-



saman þykkunar uppeptir, og efsta rönd hennar er útlött;

kúlumynduð (*globosa*), þá hún er eins til beggja enda, en við um miðjuna, svo hún að myndinni líkist kúlu;

eggmynduð (*ovata*), eins og sú næstnefnda, en lengri og þykkvari í neðri endann;

klukkumynduð (*campanulata*), sè hún við nokkuð í neðri endann, vanti pípurar, og útlött í efri endann.

Þær ójöfnu einblöðudu krónur eru fylgjandi:

túngumynduð (*ligulata*), er hefir mjög stutta pípu, sem að endingu myndar eitt lánngleitt blað.

tvívöruð (*bilabiata*), þá munni hennar skiptist í 2 andsænar varir, sem eru hvor móti annari; þvílík króna kallast umhverf, vegna þess hún stendr þvert á móti því, sem vanaligt er;

einvöruð (*unilabiata*), lík þeirri næst undangangi, utan aðra vörina vantar;

gapandi (*ringens*), er tvívöruð króna, sem efri vörin er ávöl á, og útspennit frá enni neðri; grímuð (*personata*), þá varir tvívaraðrar krónu læsast saman, við að hin ávala neðri vör gengr svo langt uppeptir;

Þegar efri vörin á þessari og þeirri næstundangangi krónu er ávöl, kallast hún Hjálmr (*galea*). Þar á móti kallast sá framstandandi hluti neðri vararinnar Gómr (*palatum*), en Op (*rictus*) er munnurinn (opid) millum beggja varanna á þeirri gapandi krónu.

*Margblaðaðar jafnar krónur eru*

krossmyndaðar (*cruciatae*), hafi þær 4 blöð, sem eru niðrteygð við neðri endann og standa hvört á móti öðru;

rósarblöðduð (*rosaceae*), hafi þær 5 krínglött flöt, og við neðri endann ekki niðrteygð eðr samhangandi blöð;

Kattostblöðduð (*malvaceae*), eru 5 krónublöð við neðri endann mjög lítið niðrteygð og samvaxin;

nellikblöðduð (*cariophyllaceae*), sem samanstanda af 5 blöðum, er í neðri endann eru mjög niðrteygð, og hafa einn einasta einblaðaðan bikar;

liljubláðmynduð (*liliaceae*), sem hafa 3 eðr jafnvel 6 klukkumynduð blöð, sem enginn bikar fylgir.

Við þessar undangangandi merkist: nöglin (*ungvis*), eðr sá niðrteygði partur blaðsins; og platan (*lamina*), sem er hinn annar flati partur blaðsins, og sem er miklu minni enn nöglin.

*Ojafnar margblaðaðar krónur.*

Baunablómstr (*cor. papilionacea*) samanstendr af 4 blöðum, af hvörjum 2 hliðarblöðin eru lík hvort öðru, og kallast Vængir (*alae*). Merkið (*vexillum*) kallast það efsta og stærsta blað, sem snýr flatvegnum móti röndum hinna blaðanna. Kjölurinn (*carina*), sem stundum samanstendr af 2 blöðum, er neðsta blaðið, það er holt, sem optast tvískipt, og stendr í líring kríngum æxlunarverkfærin beinlínis á móti merkinu. Gauka-blómstr (*cor. orchidea*) samanstendr af 5 blöðum,

hvörra 2 þau efstu beygjast hvort móti öðru, og 2 á hliðarnar, öll þessi blöð eru umgirt af einu varamynduðu blaði, er almennt kallast

Hunángshirzlunnar vör (*labium nectarii*).

Hunángshirzlan (*Nectarium*).

Með nafni þessu nefndi náttúru - spekingrinn Linné þá blómstrarta, sem ekki tilheyra þeim æðr fráskírðu eðr og ekki æxlunar-verkfærunum; jafnvel þó öll þau hafi eigi hunáng í sér, eru þau þó öll nokkuð lík, og útskírast þessvegna öll í einu máli Hunángshulstrin, sem eru:

Hunángskirtlarnir (*glandulae nectariferae*), sem eru að finna við neðri enda dýpt-þráðanna, á þeim stað, sem ávöxturinn liggir undir.

Hunángshreystrið (*squamæ nectariferae*) eru litlir hreystri-líkir líkamir, sem optast eru við neðri enda krónublaðanna.

Hunángsholurnar (*pori nectariferi*) eru smáar holur úr hvörjum útsvitar hunáng.

Þeir partar blómstranna, sem ekki gefa hunáng af sér, en eru heldr tilætlaðir að taka við því, hafa ýmis-  
ligar myndir; eptirfylgjandi eru þeir markverðustu.

Gröf (*fovea*) eru lægðir eðr holur, sem eru að finna á blómstrblaðanna innri síðu.

Rykkíng (*plica*) eru lægðir eðr holur, sem eru lengri.

Sporinn (*calcar*) kallast, þá krónan vex niðr í stilkmyndaðan líkama.

Húfau (*cucullus*) kallast holóttir, sekkmyndaðr líkami, sem opt hefir staungul, og er fráskilinn öðrum þörtum blómstrsins.

Þeir partar, hvörjir að nefnast hunángshirzlar, en þó hvorki gefa frá sér né geyma hunáng, kallast sem eptirfylgir: Hetta (*fornix*), sjá ginið.

Skegg (*barba*), samanstendr af stuttum hár-um, sem optast vaxa við munnað á bikarnum eðr krónunni. Krans (*corona*), sjá ginið.

Æxlunarverkfæri (*partes fructificationis*), sem eru trækynja, og annaðhvort samansöfnuð í eitt eðr fleiri aðgreind blómstr einnar urtar, eðr ein urt útaf fyrir sig hefir kall- og önnur kvenn-kynjað blómstr. Verkfærið, hvaraf þær fyrri þekkjast, kallast: Duptberi (*Stamen*), er fyrir innan krónublöðin, og skiptist í duptþráðinn, dupthnappinn og duptið. Duptþráðurinn (*filamentum*) er langleitr líkami, á hvörjum dupthnapparnir vaxa. Hann er: hárumlíkr, þræðilíkr, sporjárulíkr, fleigmyndaðr, klofinn, samanþrykktr (s. blöðin), frí (*liberum*), þegar hann ekki hángir við aðra þræði; samvaxinn (*connatum*), þá margir þræðir vaxa saman; liðótttr, samanlagðr, út- og innbeygðr, hárivaxinn, jafulángur, misjafn er áðr fráskirt.

Dupthnappinn (*anthera*), er líkami, sem sitr efst á duptþræðinum, og hefir í sér mikið dupt. Hann er langleitr, strikmyndaðr, kúluhnöttótttr, nýralíkr, skeytilíkr, klofinn, hárumsettr, strendr (s. blöðin), tvírúmaðr (sjá fræhusið), síðuopnaðr (*latere dehiscent*), sem er algengast, og broddopnaðr (*apice dehiscent*), frí, samvaxinn, fyrir utan duptþráð o. s. fr., sitjandi við hlið duptþráðarins, sem sumpart áðr er fráskirt, og sumpart er sjálfskilið;

stríðhærðr (*aristata*), er hefir 2 svínshárum líka brodda við neðri endann;

kambsettr (*cristata*), hafi hann 2 brjóskilíka tönnótta líkami á hliðinni eðr við neðri endann;

tvöfaldr (*didyma*), sè hann líkasem tvísettr saman.

Duþtið (*pollen*), er mjög finn líkami, sem sýnist eins og væri duþt, og sitr í elliðgar efst á duþthnappinum.

Hafi blómstrið einúngis duþtþera, en enga duþthirzlu, kallast það Karlblómstr (*flos masculinus*), og hafi urtin einúngis karlblómstr, kallast hún: maðr (*mas*).

Sá partr, hvaraf hið annað kyn þekkist, kallast Duþthirzla (*pistillum*), er optast í miðju blómetrinni, og samanstendr af avaxtarhúsinu, stílnum og örinu.

Ávaxtarhúsið (*germen*) er neðsti partrinn, sem geymir efni urtarinnar, það nefnist ýmsum nöfnum, sem áðr útskírð eru. Við ávaxtarhúsið er sérílagi athugavert, hvort það er fyrir ofan eðr nðan blómstrið; á þessu vex Stíllinn (*Stylus*), sem líkist litlum stíl, hönum gefast næstum sömu aukanöfn sem duþtþræðinum; og er hann:

skrúfumyndaðr (*spiralis*), þá hann er sem snúinn í skrúfugáng.

Örið (*Stigma*), kallast yzti endi stílsins; það er: óskipt, hvasst, snubbótt, kúlumyndað, kylfumyndað, skjöldmyndað, þríflípað, strent, tönnótt, krossmyndað, málaraþursta-

líkt (*penciliforme*), samanstandi það af mörgum stuttum þéttum og kjötligum þráðum; holótt, blaðlíkt (*petaloideum*), líkist það krónublaði; fjaðrað, sitjandi (*sessile*), vanti það stölinn.

### Ávöxtur (*fructus*).

Þegar ávaxtarhúsið, sem hefir inni að halda sæði þeirrar tilkomandi urtar, er fullþroskað, kallast það ávöxtur. Þessi er nú annaðhvort innilokaðr (*tectus*) eðr ber (*nudus*); allar skýlur fræsins kallast almennt

Ávaxtarhírzla (*pericarpium*).

Þessi hefir aðskiljanligar tegundir, svo sem himnuávöxtur, vængjaávöxtur, fræbelgr, fræhús, nyt, steinaávöxtur, ber, epli, grasker, skálpr, beli, botjel, skjöldr, merki, varta.

Himnuávöxturinn (*utriculus*), er einúngis eitt fræ, sem hefir utanum sig þunna himnu, hvöreð auðveldliga flýsast utanaf.

Vængjaávöxturinn (*samara*), er eitt eðr 2 fræ, sem hafa utanum sig þunna, skygna útflatta himnu, sem slær sér út, eðr teygist út á hliðunum; þessi útteygði partr hennar kallast vængr, hann opnast ekki af sjálfs dáðum.

Fræbelgr (*folliculus*), er lángléitr ávöxtur, sem opnast á annarri hliðinni, og er fullr af fræi.

Fræhúsið (*capsula*), hefir harða húð, sem innibýrgir opt mörg fræ, og opnar sig regluliga í marga parta. Partar þess eru:

Milligirðingin (*dissepimentum*), himna, sem skiptir fræhúsina í aðskiljaulig rúm.

Rúmin (*loculamenta*) eru þau rúm, sem eru millum milligirðinganna.

Styttan (*columella*), er líkami sá, er stendr í miðju fræhúsinu, sem milligirðingarnar eru áfastar við.

Blöðkurnar (*valvulae*) eru þeir útvertis partar, sem fræhúsið skiptist í

Saumrinn (*Sutura*) kallast strík það, er sæst utaná fræhúsinu, þar sem blöðkurnar opnast sundr. Eptir mynd og byggingu gefast fræhúsinu ýmislig aukuöfn. Það kallast

ein-tví-þrí og marg-rúmað (*uni-bi-tri-multi-ocularis*);

tví-þrí-marg-blaðkað (*bi-tri-multi-valvis*);

tví-þrí-marg-fræsett (*bi-tri-poly-sperma*);

fjöðrkraptað (*elastice desiliens*), opni það sig með fjöðrkrapti, eðr spretti í sundr.

Þríkornótt (*tricocca*) kallast þrírúmað fræhús, sem sýnist að vera samsett af 3 fræhúsum;

tvöfalt (*didyma*), þá það sýnist að vera 2 fræhús.

berjumlíkt (*baccata*), þá húðin er kjöttlig og mjúk.

Eptir því, hvörnig það opnast, kallast það:

yfirþvertskorið (*circumscissa*), þá það er yfirskorið;

broddopnað (*apice dehiscens*), eins og flest fræhús, og

opni það sig með loki (*operculata*).

Nytin (*nux*), er fræ það, sem innibýrgist í harðri skál eðr skel, sem opnar sig ekki.

Skelin (*putamen*), er misjafnt hörð og mjúk.

Fræið, sem í henni er, kallast Kjarni (*nucleus*), Auknefni hennar eru áðr fráskírð.

Steinávöxturinn (*drupa*), samanstendr af harðri skel, sem nytin, en þaraðauki er hann umkríngdr þykku vessafullu kjöti eðr skinnlísku tægi. Hann kallast

berjumlíkr (*baccata*), þá það yzta tægi utanum hann er kjötlígt og vessafullt;

hálfþurr (*exsucca*), þá þetta sama líkist meir skinni enn kjöti;

með 1, 2, 3 kjörnum (*mono-di-tri-pyrena*).

Berið (*bacca*), samanstendr af vessafullu efni, sem inniheldr fleiri fræ, og ei opnar sig regluliga; því gefast auknefni eptir ásigkomulagi þess og frækornanna fjölda, t. d.

með einu, tveimr, þremr og mörgum frækornum (*mono-di-tri-poly-sperma*), ogsvo eptir myndinni o. s. f.

samansett ber (*bacca composita*), á heima hjá þeim urtum, sem hafa margar dupthirzlur, við hvörjar að verða eins mörg ber (*acinus*), og fræhirzlurnar voru.

Epli (*pomum*) er kjötilíkr líkami, sem umkrúgir eitt himnulíkt fræhús, sem almennu máli kallast kjarnahúsið. Það opnar sig ekki með blöðkum.

Graskerið (*pepo*) er einn kjötilíkr vessafullr ávöxtur, á hvörs innra yfirflöt fræin eru fest.



Skálprinnu (*siliqua*) er þurr, slövanaliga lángleitr ávöxtur, er samanstendr af 2 blöðkum, sem festar eru saman með einum saum á báðum síðum.

Fræln eru fest innantil á rönd milligirðingarrinnar, bæði ofan og neðan til við saumana. Sè ávöxtur þessi miklu lengri enn breiðr til, kallast hann Stórskálpr (*siliqua*); sè hann þarámót eins, eðr nær því svo, lángr sem breiðr, kallast hann Smáskálpr (*silicula*): þó er ei þetta nóg til fullrar aðgreiðingar þeim, heldr hlýtr að aðgætast að sá fyrri hefir sitjandi ör, en hinn síðari stuttan stíl. Skálparnir aðgreinast eptir því sem milligirðingin gengr. Gángi hún nefniliga láugs innaní blöðkunum, kallast: (*valvulæ dissepimento parallelæ*). Gángi hún þarámóti þvert yfirum kallast það *valvulæ dissepimento contrariæ*.

Stundum er milligirðingin lengri enn blöðkurnar, og kallast þá *Dessepimentum prominens*. Hnýtttr skálpr (*siliqua torosa*) er skálpr með hnútum eðr smágörðum á; héraðauki er skálprinn blöðkulans (*evalvis*), þá hann engar blöðkur hefir, og berilíkr (*baccata*); s. fræhúsið.

Belinn (*legumen*) líkist mjög skálpnum, eiðungis er mismunurinn sá, að fræið sitr á neðri rönd milligirðingarinnar. Hann er:

uppblásinn (*turgidum*), sèu blöðkurnar báðar uppblásnar sem blaðra;  
sigðmyndadr (*falcatum*), sè hann boginn sem sigð;

kúfúngsmyndaðr (*cochleatum*), sè hann snúinn  
eðr undinn sém kúfúngstoppr;

einrúmaðr (*uniloculare*), eðr

tvírúmaðr (*biloculare*), elligar

hálf-tvírúmaðr (*semibiloculare*), sè milligirðingin  
ei nema í helfingi hans;

hnúskótttr (*gibbum*), sè hann ávalr á þá einu  
hlíð;

bogalíkr (*arcuatum*), sè hann líringbeygðr sém  
bogi;

líðótttr (*articulatum*), sè hann samsettr af merk-  
janligum líðum. Annars kallast þessi tegund  
belans

Líðabeli (*lomentum*).

Botjelið (*theca*), er ávaxtarhírsla mosanna.  
Það er gagnþurr ávöxtur, sém ofantil opnar sig  
með loki. Þess partar eru:

Hettan (*calyptra*), er þunn himna, sém byrgir  
efri enda botjelsins.

Lokið (*operculum*), sém byrgir botjelsins op, en  
lykst upp af sjálfs dæðum, þá fræið er full-  
þroskað.

Lokið er kringlótt, topplíkt, hvasst, upp-  
mjótt, flatt o. s. fr.

Munnrinn (*peristoma*), so kallast rönd ein, er  
umkringir op botjelsins; hann er:

tönnótttr, nakinn o. s. fr.

Viðbætirinn (*apophysis*) er meiri eðr minni út-  
vökun neðri enda botjelsins.

Innilykji aðrir partar blómstrsins emu ávaxtar-  
húsið Fræið, kallast það óekta ávöxtur (*fructus*

*spurius*), og öðlast þá annaðvegga sérlegt nafu, eðr og kallast eptir ávexti þeim, sem hann mest líkist. Þeir helztu eru:

Trèstrengr (*strobilus*), sem ei er annað enn strengr (*amentum*), hvörs hreystr er orðið trènað.

Oekta fræhús (*capsula spuria*) er uær fræið er innibyrgt í þeim tviunnaða bikar, líkt og í öðru fræhúsi.

Oekta steinávöxtur (*drupa spuria*), sè nytiú sjálf byrgð í þeim kjötilíka ávaxtarbotni.

Oekta ber (*bacca spuria*), ef strengsins kjötilíka hreystr innibyrgir fræið, eðr og ef fræið sitr á þeim kjötilíka ávaxtarbotni.

Fræið samanstendr af 2 jafumynduðum pörtum, sem auðveldliga aðskiljast, og sem að sett í jörðu verða að blöðum, er kallast Fræiblöð (*cotyledones*), millum hliða þessara parta liggir æxlunarhjartað (*corculum*), þetta skiptist í 2 parta: Blaðfjöðrina (*plumula*) og Ranaunn (*rostellum*); af því fyrri frámkenir sá partur urtarinnar, sem ofanjarðar er, af því síðara rótin. Útvortis er fræið klædt 2 himnum, hvaraf hin ytri og þykkari kallast Fræhúðin (*tunica exterior*), hin innri og þynnri kallast Fræhimna (*membrana interna*).

Fræin kallast:

holsíðuð (*scrobiculata*), sèu íbjúgar síður þeirra útvortis;

styttnumynduð (*columnaria*), sèu þau laung og jafudigr;

krónuð (*coronata*), sè ofantil á þelm upphækkuð rönd;

kúfúngsmynduð (*cochleata*), sèu þau lítið eitt snúln;

svarfilík (*scobiculata*), sèu þau lángleit og ærið mjó;

þykkhimnuð (*corticata*), sè þeirra húð föst og þykk; útvortis á fræinu finnst lítill blettr, er kallast

naflinn (*hilum*), frá hönum gengr sín tang eðr þráður, er festir við fræið ávöxtinn. Þessi þráður kallast

naflastrengur (*funiculus umbilicalis*).

Ilðraðauki koma til yfirvegunar ýmislegir hlutir, sem á fræinu finnast, sem eru:

Fræskýlan (*arillus*) er ein viðlaus húð, sem innibýrgir fræið. Fræ þau, sem í broddinn hafa utan um sig þvíflka húð, kallast Hettufræ (*semina calyptrata*).

Þelið (*pappus*) er bikar þeirrar einstöku krónu á þeim samsettu blómstrum; áðr enn blómstrið springr út, er það mjög lítið, og sèst ei greinilega, fyrr enn eptir blómstrunina. Það er sitjandi, með staunglum, strihært (*aristatus*) þá það líkist strfi;

bikarmyndað (*caliculatus*), þá það hefir himnu-  
lika rönd á broddi fræsins;

smálhreysstrótt (*paleaceus*), þá það samanstendr af smáum hreystrum,

hært, elligar óskipt,

fjaðrað (*plumosus*), þá lengri háriu hafa styttri hár.

Fræullin (*coma*) er ullarkendr líkami, sem sitr á broddi ýmissra frætegnada.

Halinn (*cauda*) er þráðmyndaðr líkami, sem er elst á broddi ýmsra fræa.

Fræraninn (*rostrum*) er dupthirzla, sem vex ásamt með fræinn.

Væugrinn (*ala*) er himna á efri enda eðr utanum allt fræið.

Rifið (*costa*), eru útbúngandi strik, sem sjá má á nokkrum fræum skýluurtanna.

Döggin (*pruina*) er mjög fínt hvítt dupr, sem er að finna við nokkrar urtir.

Ávaxtarbotninn (*receptaculum*) er sá staðr urtarinnar, sem blómstrið eðr ávöxturinn vex á, neðsta yfirborð hans er fast við staungulinn; hafi hann margar kronur, kallast hann

almennr ávaxtarbotn (*rec. comune*), hafi hann einungis eina, kallast hann einfaldr (*proprium*), hann er flatr, ávalr, hærðr, ullusettr, toppmyndaðr;

smáhreystraðr (*paleaceum*), sè hann, settir lángeitum, snubbóttum, þurum smáblöðum, er kallast Smáhreystr (*paleæ*); og á þetta heima hjá þeim almenna ávaxtarbotni. Hann er

kjötilíkr (*carnosum*);

styttnmyndaðr (*columnare*);

sveppilíkr (*spongiosum*);

smáholótt (*favosum*).

Ávaxtarfletið (*thalamus*). Með þessu nafni nefnist einn stærri eðr minni líkami, er hefir inni

að halda fræin í sínu eigin efni, og á hvörs yfirborði þau opna sig. Það á heima hjá urtum af 23ja hópnum, eðr þeim sem hafa hulin blómstr.

Þess helztu tegundir eru:

Skjöldurinn (*scutellum*), sem er einn flatr krínglóttur, röndum settur líkami, er inniheldur ávöxtinn.

Flatskjöldurinn (*pelta*) er þynuri og án randa.

Vartan (*tuberolum*) er einn lítill og avarr nabbi.

### Um Systemið.

Áður er talað um orðu þá, er af náttúruspek-ingum kallast system. Urta-systemið er sett til þess að maðr geti, eftir vissum og óbrygðulum reglum, þekkt hvörja og eina urt af hennar sérlegu kennimerkjum.

Náttúruspekingrinn Linné var hinn fyrsti, er á kynferði urtanna eukum grundaði sitt system, hvörju til hjálpar hann ogsvo hafði tillit til þeirra útvortis meiri eðr minni líkingar.

Nær ein urt af sér gefr aðra, þá kallast þær báðar sama tegund (*species*), líkist nú margar tegundir hvör annari, er það kallað kynferði (*genus*). Sèu nú þessi hvört öðru í nokkru lík, kallast þau orða (*ordo*), og loksins, líkist orðurnar hvör annari á nokkru, þá framkoma Hópar eðr Flokkar (*classes*).

Hópaanna aðgreinsing í því linnéíska systemi er grundvölluð á dupthrunum, og eptir þess reglum niðræðast allar nú þekktar urtir í fylgjandi tuttugu og þrjá hópa.

1. Hópr hefir 1 dupthra, (*monandria*). ein mannaðar.
2. — — 2 — (*Diandria*), tví-mannaðar,
3. — — 3 — (*Triandria*), þrítí-mannaðar.
4. — — 4 — (*Tetrandria*), fjórmannaðar.
5. — — 5 — (*Pentandria*), fimm-mannaðar.
6. — — 6 — (*Hexandria*), sex-mannaðar.
7. — — 7 — (*Heptandria*), sjö-mannaðar.
8. — — 8 — (*Octandria*), átt-mannaðar.
9. — — 9 — (*Enneandria*), níu-mannaðar.
10. — — 10 — (*Decandria*), tíu-mannaðar.
11. — — 12 — (*Dodecandria*), tólf-mannaðar.
12. — með fleiri enn 12 dupthrum, sem festir eru á innri rönd bikarsins, (*Icosandria*), bikarmannaðar.
13. — með yfir 20 dupthrum, er allir sitja

á ávaxtarbotninum, (*Polyandria*), margmannaðar.

14. hópr með 2 laungum og 2 stuttum dupthberum, (*Didynamia*), tvímektugar.
15. — með 4 laungum og 2 styttri dupthberum, (*Tetradynamia*), fjórmektugar.
16. — hefir alla dupthþræðina samannvaxna í eitt bindi, (*Monadelphia*), samannvaxnar.
17. — með dupthþráðum samannvöxnum í 2 bindini, (*Diadelphia*), tvískiptar.
18. — með dupthþráðum í mörgum bindinum, (*Polyadelphia*), margskiptar.
19. — dupthnapparnir samangrónir, (*Syngenesia*), pípumannaðar.
20. — dupthberarnir vaxa á dupthlirzlunnui, (*Gynandria*), kvennbú.
21. — með aðskildum kall- og kvenn-blómstrum á sömu urt, (*Monœcia*), einbýli.
22. — með kall- og kvenn-blómstrum, sínu á hvörri urt, (*Diœcia*), tvíbýli.
23. — með ómerkiligum blómstrum, (*Cryptogamia*), huldubýli.

Orður þær, er hóparnir optar skiptast í, ákvarðast sumpart eptir tölu dupthirzlanna, sem í þeim 13 fyrstu hópum; sumpart eptir fræskýlunni, sem 14. og 15. hóprinu; sumpart eptir náttúrligri líkingu, svo sem í 19. hópnun, sem hefir iuni að halda þau samansettu blómstr, og skiptist í 4 orður: hin fyrsta hefir krónur með báðum kyujum, jöfn Sambúð (*Polygamia æqualis*); 2r. hefir á röndunum frjófsamar húnkrónur, enn í miðju frjófsamar krónur



með báðum kynjum, og kallast ójöfn sambúð (*Polyg. superflua*); 3ja hefir ófrjófsamar krónur á röndinni, og frjófsamar krónur með báðum kynjum í miðju, ónýtsambúð (*Polyg. frustranea*); hin 4ða hefir frjófsamar húnkrónur á röndinni, eun ófrjófsamar krónur með báðum kynjum í miðju, nauðsynligsambúð (*Polygamia necessaria*); og sunnpart aðgreinast orðurnar eptir tölu duptberanna, sem í 16da, 17da, 18da, 20ta, 21ta og 22m hópuum; orður 23ja hópsins fara að náttúrligri líkingu, og eru Breknur, Mosar, Þarrar, og Sveppar.

Vilji maðr ákvarða einnar urtar stað, hlýtr maðr til eptirsjónar sèr að taka eina, sem stendr í fullu blómstri, og er að öllu leiti ósködduð. Maðr aðgætir nú hvort æxlunarverkfærin eru augsjáanlig eðr ekki, og sèu þau auðþekkjanlig, þá hvort krónurnar hafa bæði kyn eðr ekki, hvort duptberarnir og dupthírzlurnar eru samgrónar, hvort duptþræðirnir og dupthuapparnir eru sundrlausir, eðr hvort duptberarnir eru jafustórir, og að endingu þeirra tal.

Látum oss t. d. ega að ákveða Sortulýngið. Vèr sínuum þá að það hefir auðþekkjanlig blómstr, að krónurnar hafa bæði kyn, að duptberarnir og dupthírzlan eru aðskilin, að hvorki duptþræðirnir eðr dupthuapparnir eru samgrónir, að duptberauna tala er 10: orðurnar í þessum (10da) hóp fara að tali dupthírzlauna, og þar dupthírzlan einungis er ein, heyrir það til 1tu orðu.

Sortulýngið hefir uggmyndaða krónu, sem neðan til er gagsær; og þess ávöxtur er Strúmaðber, það heyrir því til kyninu (*Arbutus* eðr) Myln-

ínga-urt. Það hefir framáviðliggjandi staungul, og blöð keil á röndum, og það er því tegundin Sortulýng (*Arbutus uva ursi*).

### Almennar Reglur,

hvörjum fylgja ber, þá urtum er safnað, til læknis- og annarar nauðsynligrar brúkunar.

1. Skulu urtir allar, hvör fyrir sig, safnast á þeim tíma árs, er þær eptir reynslunni og lærðómi urtaþekkjara eru kraptfyllstar á.

2. Þareð kraptr urtanna opt fer eptir aldri þeirra, það erað skilja: þareð nokkrar urtir eru krapta- mestar nýsprottuar, aðrar undir það blómstriu sprínga út, og aptr aðrar, þá þær eru fullblómst- raðar o. s. fr.; svo hlýtr þetta nákvæmlega að að- gætast.

3. Í hreinviðri og þerrir um miðjan dag, þá ekkert náttfall á jörðu kann að vera, er hentugast urtum að safna, enkum þeim pörtum þeirra, sem ofanjarðar eru.

4. Fleiri munu urtir þær, er í fjall-lendis brekkum, eðr hraugjótum vaxa, krapta- meiri hinum er í túnum eðr nærri bygðum finna- st; þó gefast urtir þær hér á landi, er til nokkurrar hlítar eðr krapta vaxa í ræktaðri jörðu, svo- sem Heimlis- njóli, Vallhumall og Smári.

5. Flestar urtir, er á þurrlendi vaxa, munu kröptugri hinum sama kyns, er vaxa í votlendi.

6. Einnig ber að gæta þess, að urtir, sem njóta sólar, eru krapta- meiri enn þær, sem í forsælu

spretta; þó eru urtir þær til, er einkum spretta í skugga og hlè, þartil nefni eg Burknann.

7. Nær urtum er safnað, skulu þær, áðr enn þurkast eðr til brúkunar takast, vandliga hreinsast frá öllum óhreiniendum, moldu, ryki, kóngur-ófar- og orma-vefum, samt öllu því, er eigi til þeirra heyrir; sömuleidis skulu þeir skemdu partar urtarinnar, svo sem visuð og rotin blöð, fúnar og klofnar rætr o. s. fr., burttakast.

8. Skulu þær svoléiðis hreinsuðu urtir, svo fljótt sem verðr, þurkast; skeðr það á ýmsan hátt, t. d. á vindsvölum loftum, annaðhvort svoléiðis að urtirnar sæu þunnt breiddar á því líkt lopt; eðr, sem eg held betra, og samkvæmara vorum efnum, að hafa mjög smáriðin net eðr lèreptsdúka þunna á böndum upp við sperrur eðr lopt, og á þau þannig útþanin að breiða urtirnar; binda má og stórar urtir, eina og eina fyrir sig, á stög, og þannig þurka. Á líkan hátt þurkast rætr, með því móti að gegnum þær sæ stúngið mjóum þræði, hvörja eptir aðra með rúmu þumlúngs millibili, og þræðir þessir útspenutir á góðu þerriplázi, og mun litlu saka þó í sóln sæu. Ágætt er að þurka urtir, einkum blöð og blómstr, nærri kakalofnum, eðr yfir þeim, líka kynnu þeir partar urtanna hentugliga þurkast í stórum potti yfir glæðum, með því móti að breiddr sæ á botn hans hreinu dúkr eðr pappír, og urtirnar þar á látnar. Þá er hiti pottsins mátliga sterkr, er fullorðinn maðr, ei allt offin- hentr, þolir að halda hendi sinni eðr lófa um stund á botni pottsins. Höfnðreglan, hvör mátiinn

sem brúkaðr er, skal þessi, að ætíð sèu urtirnar þuunt breiddar, og enda sè þeim opt snúið, að sem fljótast nái að þorna.

9. Ere i minni vandi að geyma þær þurkuðu urtir, skeðr það ei til nokkurs gagns í lèrepts eðr ullarpökum, heldr útheimtast hèrtil Flöskur, Krökkur, eðr önnur held ílát, sem gjörð eru af eik, hvör áðr sèu vandliga þurkuð. Fullvel má hèrtil brúka eikar - stokka, eðr kassa með draglökum yfir, sem sèu vazheldir, og sè pappír líndr innan í þá. Betra er að taka, í stadium tóms vatns á lín þetta til jukks, seyði af horblöðku, þar hún með remmu sinni ver mól og öðrum skriðkvikindum að komast til urtanna. Öll þau blómstr - blöð og rætr, er hafa sterka eðr kryddaða lykt, ættu fyrst smátt að skerast, síðan látast á flöskur með góðum tappa í, og þannig til brúkunar að geymast.

Fyrir utan þær heilu urtir eru fylgjandi partar þeirra helzt til brúkunar teknir, svo sem Rætr, Blöð, Börkur, Blómstr, Ber, Fræ, Mosar og þáng, hvört af þessu fyrir sig útheimtir fylgjandi

### Sèrligar Athugasemdir:

1. Rætrnar. Þegar þeim skal safna, hlýtr maðr nákvæmlega að vita tíma þann, á hvörjum þær kröptugastar eru, fer það eptir varanligleika þeirra; þannig gefast eins árs rætr (*annua*), sem deya hvört haust, hèrtil heyrir þrenningargras (*Viola tricolor*) o. s. fr., tveggja

ára (*biennes*), svo sem *Ætíhvönn* (*Angelica archangelica*).

Margra ára (*perennes*), svo sem, *Ætífífill* (*Leonthodon taraxacum*.)

Eins árs rætr skulu snemma sumars uppgrafast. Tveggja ára snemma sumars annað árið.

Fleiri ára safnast einnig snemma á vori, áðr blöð þeirra eðr staungull taka til að vaxa.

Þegar nú grafa skal rætrnar upp, og völ er á, skal maðr helst velja þær, sem flest rótarblöð eru sprottin á, þá uppgröfnu rót hreinsar maðr frá moldu og sandi, með því móti að skola þær í vatni fáein augnablik, og þareptir þurka þær vandliga með þerrirklæði eðr dúk, síðan sker maðr alla smá ánga í burtu, og allt það af rótinni, er skemt, fúíð eðr ormetið mætti reynast. Þareptir festir maðr þær á band, sem áðr er sagt, og þurkar á góðu þerrirplázi eðr nærri kakalofni; sèu rætrnar stórar, þykkar eðr vökvamiklar, mega þær í fleiri parta skerast þvers um. — Eptir þurkinn geymast þær vandliga, sem áðr segir.

2. Blöðin takast í þurru veðri, sem áðr segir, af eins árs og margra ára urtum skömmu áðr enn þær blómstra, eðr nær blöðin fullvaxin eru. Af 2ja ára urtum þarámóti svo fljótt sem verðr. — Blöð af trjám og lýngi þarámót skömmu eptir að þau bera blómstr. Blöðin þurkast og geymast sem áðr segir.

3. Berkirnir safnast bezt á vorin, þegar fyrst ber á hnöppum trjáanna, eðr á haust, þá blöð eru afallið. Bökurið tekst í þurru veðri af úngum

afhöggnum kvistum og smáviði; hann skerist í aflángar leingjur. Utvortis hreinsist hann vel frá ryki og mosa, er á hann kynni hafa sett sig, og innantil frá hinnum og taugum öllum, er þar finnast mættu.

Berkir þurkast og geymast á líkan hátt og áðr er tjáð.

4. Blómstrin. Þá blómstrum skal safna, skal það ske um miðjan dag, og bezt, hafi þurkr og hlèviðri geingid í 2 eðr 3 daga fyrirfarandi. Þá maðr safnar blómstrum, má hinn fíni leggr, er þau ástanda, fylgja með. Blómstr öll skulu fljótt og vandliga þurkuð, annaðhvort á lèrepti, þunnt útbreidd, eðr á pappír. Sè eigi þurkr góðr og heitt veðr, skulu þau annaðhvort á ofni eðr í potti þurkast, sem áðr segir. Þareptir látist þau í flöskur, krúkkur, kúta, eðr kistla af eik, vandliga lokuð, og setjist á mátuliga heitan stað til geymslu.

5. Berin. Hèr í landi finnast eígnaliga tvönnslags ber:

- a, sem hafa nægð af vessa, svo sem bláber, krækiber, hrútaber, jarðarber.
- b, sem eigi hafa neinn særligan vessa, svo sem eini-ber og mulníngrar.

Hin fyrri geta bæði þurkazt, og svo líka geymzt, lögð í edik (máske og í sýru) og hunáangi; söltuð með hvíta-sykri. Af öllum þeim getr þvíngrazt vessi, og með sykri eðr hunáangi ýmist gefið vínveru eðr sýróp, hvað seinna skal greint við hvörja tegund þeirra. Hin síðari geta auðveldliga þurkazt. Berin yfirhöfuð þurkast með ýmsu móti, þó bezt

annaðhvort þunnt útbreidd á pappír eðr lèrept, á vindsvölum stað, eðr, sem betra er, við ofnshita eðr í potti; þeim skal, hvör helzt máti sem brúkast, opt snúið og velt við, og þareptir geymast þau í heldu íláti, helzt krúkkum, sem vandliga lokast. Mikið riðr á, áð þau, áðr geymast, sèn vandliga þurkuð.

6. Fræin. Fátt er af fræum í landi voru, er til þeirrar fullkomunnar geti komizt, að safnandi sèn, þó gefast nokkur, og vil eg geta mátaus, að safna þeim rættiliga.

Það er þá fyrst aðgætaði, að eigi má fræum safna, fyrr enn þau fullgjörð eru. Þekkist þetta ei af öðru enn því að fræpúngarnir, eðr lýði það sem fræin eru í, fara að opnast, eðr af því að af yztu greinunum er farið af falla einstaka frækorn. Fræum skal í þurrviðri safna, og eptir þerridaga 2 eðr 3, bezt er að taka allan staungulinn, sem ber fræpúngana, þurka hann vandliga, sem áðr er sagt, til þess skrælpurr er orðinu; enn til að ná fræi úr fræpúngnum, eðr fræi af staunglum urta þeirra er fræ hafa áu lýðis, kunna 2 mátar að brúkast:

a, Fræstaunglarnir leggjast á lèreptsdúk stór-an, breiddan á slétt gólf, og sè hvör við hliðina á öðrum, og hvör ofan á öðrum, síðan sè tekinn lètr stafr eðr kefli, og slegið yfirum ofan á fræpúngana lægliga. Opnast þá þeir skrælnuðu fræpúngar, og fræið fellr niðr á dúkinu.

b, Maðr tektr einbyttu tunnu, stíngtr nokk-  
rum fræstaunglum þarí á endann efri niðr, hvör-  
jum við síðuna á öðrum, að lausliga fylli út í

báðar hlíðar. Síðan skal tunnan með kefli eðr staf utan lamið; við hristing þennan fellr fræið út og af staunginni, og finnst svá á botni tunnunnar. Auðskilið er að vandliga skulu staunglarnir þurkaðir áðr, hvör máttinn sem brúkaðr er, því sè í þeim minnsta deigja, opna ei fræpúngarnir sig, sízt allir; hljóta þeir þá að þurkast betr, eðr fræið að plockast út með fingrunum. Að svo búnu hreinsast fræið frá öllum óhreimindum, með því móti að maðr vinsar það í trogi eðr skál. Þareptir þurkast það vandliga í sólarhita, eðr nærri ofnhita. Þvínæst geymist það í lèreptspokum, en að endingu látist í velluktur krukkur eðr trèslát.

7. Mosarnir. Þeir takast helzt eptir þerrir; þó gefast nokkrir þeirra, er betr safnast í vætn. Þeir hreinsast vandliga frá moldu og moski, samt öðrum urtum, sumpart með því að vinsa þá vandliga, sumpart með því að bregða þeim í vatn og skola í skyndingu. Þeir þurkast sem urtir, og geymast í góðum slátum.

8. Þángartir nokkrar notast ogsvo, og mun þess getið við hvörja eina, hvörnig hún safnast og hagnýtist.

### Um Urtanna Nytsemi.

Þrennt er helzt gagn það, er af urtum má hafa: 1. til Lækninga; 2. til Nautnar fyrir menn og skepnur; 3. til ýmissra Hagræða í búskap manna, t. d. litunar-hæginga, vörunnar foksandi o. s. fr. Um hið fyrsta vildi eg hère koma máli mínu, og eptir efnum útlista lækningagagu nokk-



urra almennustu urta lands vors, og þarhjá líka minnst á nokkurra þeirra aðra nytsemi.

Urtir megna að þena til lækninga

a. *útvortis*, b. *innvortis*.

A. Til útvortis Lækninga brúkast urtirnar nýar og þurkaðar, eðr og þurkaðar, annaðhvort einsamla, eðr í samblaundi við aðra hluti, eðr aðrar urtir. Þær brúkast í:

Böð (*fomenta*), Urtapoka (*sacculos*), mýkjandi Grauta (*cataplasmata*), Salvi (*unguenta*), Plástra (*emplastra*), blöðrudragandi Meðöl (*vesicantia*); þar fyrir utan auka þau, tekin í nef og munn, vessarás af vítum o. s. fr.

1. Böð af urtum eru eiginliga þrenuslags, eðr brúkast uppá þrenuslags máta:

- Maðr seyðir urtir í vatni, mjólk eðr mysu, vætir þarí rúu eðr lepp, og leggur umkríng hinn sjúka lim, annaðhvort kalt eðr volgt.
- Maðr heldr þeim sjúka lim í urtaseyðinu um stund, eðr hellir því yfir hann hvað eptir annað.
- Heldr maðr þeim sjúka lim yfir gufumi alleina.

2. Urtapokar gjörast af smáskornum urtum, er innsaumast í þunnt lèrept eðr þunna einskeptu, og leggjast þannveg þurrar yfir þann sjúka lim.

3. Mýkjandi Grautar gjörast af smáskornum urtum, er sjóðast í vatni, mysu eðr mjólk, álíka og þykkvasti grautr; þeir látast í lèreptsklút eðr rúu, og leggjast þannveg á hinn sjúka

lim. Elgi skulu grautar þessir heitari enn svo, að maðr með handar-baki þoli þeirra viðkomu, þeir ítrekast yðugliga, og í hvört sinn sè tekinn úyr, en þeim sem við lá kastað í burtu.

4. Salvi kallast það meðal, sem vanaliga tilbúið er af feiti, olíu eðr smjöri, þarvið bætist dult af urtum, harpix og öðrum fleiri hlutum, þartil þetta meðal verðr sem kramt flot. Salvi eru margslags, samanblönduð, samanbrædd og saman-söðin.

5. Plástrar samanstanda af sömu pörtum, en eru hardari en salvið, og því hlýtr í þeim að vera meira af urtaðrupti, harpix og öðru því er hörkuna gjörir.

6. Blöðrudragandi Meðöl eru þau sem, lögð útvortis á húðina, draga undir sig stórar blöðrur, líkt og þá maðr brennir sig, hvarfyrir þau vel mættu heita brennandi meðöl.

B. Innvortis brúkast urtirnar með mörgu móti í Grautum (*pulmentis*), Seyðum (*decoctis*), Söftum (*extractis*), Duptum (*pulveribus*), Dropum (*essentiis*), Teum (*Infusionibus*).

1. Grauta þekkja allir, og er ei annað vandhæfi við þá, enn að urtirnar til þeirra skerist smátt, og sjóðist síðan í jukki af vatni, mjólk eðr mysu. Urta-grautar margir eru til heilsubætirs, sem síðar mun sagt verða.

2. Seyði ern þannig tilbúin. Maðr tekr urtirnar smáskornar, og sýðr með vatni í luktum katli niðr til þriðjunga. Þareptir síst hið þunna

frá, og allr vökví kreystist úr urtunum, og síðan lætr maðr seyði þessi á flösku með góðum tappa í, og geymir til brúkunar; það er athugavert við seyði þessi, að ei skulu gömul verða áðr brúkast, því annars fúlna þau, og missa sinn krapt. Mátuligt er við flestar urtir að taka 2 lóð af þeim þurrum til hálfs annars pela af vatni, og seyða niðr til pela.

3. Saftir tilbúast með tvennu móti:

- a. pressar maðr saft útaf ferskri urtinni, og seyðir, þartil þykkt verðr sem sýróp.
- b. tekr maðr urtaseyði tilbúið á ofanskráðan hátt, og sýðr það niðr til sýrópsþykktar.

I tilbúningi saftanna hlýtr að aðgætast, að þær bezt seyðast í leir- enn ekki málmpottum. Að seyðslan verðr að ske með lægum og jöfnum hita, og án þess að sjóði í eðr brenni við, sem ónýtir allt verk-ið. Saftir geymast bezt í krukkum með yfirborði af líknabelg og pappír, og þannig geymast þær, án þess að missa krapta, heilt ár eðr leingr.

4. Púlver eðr Dupt eru þannig tilbúin: að skraufurr urtablöð, berkir eðr rætr steytast vandliga í svokölluðum morterum. Það smáa sigtast gegnum fínt sigti tilbúið af öskjusviga, yfir hvöru þanið sè slitið og þunnt lèrept, eðr og þunnt, blautt skinn, á hvört, þegar orðið er hart, pikkast mjög fín göt, og gegnum þvílík sigti sigtast duptið.

5. Dropar tilbúast þannig: á smáskorin urtablöð og rætr, og stórmulinn börk, sè helt sterkasta brennuvíni eða rommi. Þetta allt látið á stóra flösku, með þunnu skinni eðr blöðru ofan-


yfir opinu en eingum tappa. Flaskan sè sett við yl, hvar hún standi hërum viku, síðan síast hið þunna frá, og úr urtunum kreystist vandliga. Dropar þessir þannig tilbúnir látist á hreinar flöskur, og geymist vandliga. Sem optast er mátuligt, að taka 4 lóð af urtinni til 16 lóða af brennivíni. Til eru og dropar af vatni og urtum alleina, helst rótum þeirra, og tilbúast þannig: maðr tekr rótardupt, hellir þar á sjóðandi vatni, hrærir vel í, og lætr standa til kólnar, þá það þunna síast frá og geymist. Til þessara dropa er mátuligt að taka 4 lóð af dupti til  $4\frac{1}{2}$  þela vatns. Annmarki er á dropum þessum, að þeir mega ei leingi geymast.

Te búist þannig til: smáskorin urtablómstr eðr blöð látast í tepott, þar á hellir maðr sjóðandi vatni, hrærir vel í, og lætr standa um hríð, til hálfkalt er orðið, þá vatn þetta þannig tilbúið brúkast. Sem optast er mátuligt að taka 1 lóð af urtinni til 1 þela sjóðandi vatns.

---

SÚ EIGINLIGA

**G R A S A F R Æ Ð I.**



---

## 1sti Hópr.

(*Monandria*) einmannaðar.

1sta Orða (*Monogynia*) einkvæntar.

1. **H**esthali (*Hippuris*). Bikarinn tvívaraðr í röndina; eingin króna; eitt nakið fræ, innilukt í einni nyt.

2. Hálmr (*Zostera*). Æxlunarverkfærin á þeirri einu síðu blaðsins, dýptþrapparnir sitjandi; fræin einsömul.

1sti Hópr (*Monandria*) einmannaðar.

1sta Orða (*Monogynia*) einkvæntar.

1. Hesthali (*Hippuris*).

a. Almennr Hesthali (*H. vulgaris*) með strikmynduðum mörgum hvössum kransilíkum blöðum; ísl. Marhálmr.

Rótin liðótt, með lanngum kransilíkum þráðum við liðina; stauugullinu heill, röttuppstandandi, sívalr, liðóttir, hálfr niðr - sokkinn, hálfr blöðóttir, liðirnir þèttara saman efst; blöðin kransilík, 10 saman, strikmynduð, án blaðstaunguls, opin, hvöss,

þau efstu og neðstu eru stýfð; blómstrin einföld, utanstaunguls, vaxa í blaðhornunum. Fræin eggmynduð.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

## 2. Hálmr (*Zostera*).

- a. Marhálmr (*Zostera marina*) með strikmynduðum, lítið þrisinóttum blöðum; staungullinn sívalr; ísl. Marhálmr.

Rótin aungótt; staungullinn sveimandi, sívalr ávið flatr, stuttur, fágreinótt, neðst skriðandi. Blöðin missett slíðrandi, mikið laung, snubbótt, heil á röndum, glansandi slètt. Dupthnapparnir og ávaxtarhúsið langleitt; tvö ör.

Margra ára urt; blómstrar í ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Urtin nýslegin er gott fóðr, einkum fyrir nautpening.

## 2ar Hópr.

(*Diandria*) tvímannaðar.

1sta Orða (*Monogynia*) einkvæntar.

1. Æruprís (*Veronica*). Krónunnar kragi 4skiptr, neðsti lepprinn mjóstr; fræhúsið 2rúmað.

2. Lifjagras (*Pinguicula*). Krónan gapandi, með einum spora; fræhúsið einrúmað; bikarinn tvívaraðr, 5klofinn.



2ur Orða (*Digynia*) tvíkvæntar.

3. Gulax (*Anthoxantum*). Bikarsius hreystur einblómstrað. Krónunnar hreystur tvíblaðkað með strú.

2ar Hópr (*Diandria*) tvímannaðar.

1sta Orða (*Monogynia*) einkvæntar.

1. Æruprís (*Veronica*).

a. Læknis æruprís (*V. officinalis*): blöðin aflaung, loðin; staungullinn svarðliggjandi loðinn; blómstrin fjærstandandi; ísl. Æruprís.

Rótin augótt skriðandi; stannglarnir sívalir, lítið greinóttir, skriðandi. Blöðin ljósgræn, nöbbótt, æða- og sina-mörg, snörp, við neðri endann mjórri, stuttleggjuð.

Klasaleggirnir lángir, missettir. Klasarnir axmyndaðir með mörgum blómstrum. Blómstrblöðin strikmynduð, jafnlaung blómstrleggnum. Bikarinn loðinn. Krónan ljósblá.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Urtin er styrkjandi, barkandi, og læknað sár; hún er því góð móti lífsýki, matarólyst, óstyrk líkamans, hún örfar svita, og læknað uppdráttar- og megrunar-sótt. Te af urtinni drekkist svo te-bollum nemi 3svar dagliga. Með seyði af urtinni er gott að þvo illaluktandi sár. Duft af rótinni stráð í sár stillir blóðrás.

b. Þykkblaðaðr Æruprís (*V. beccabunga*): blöðin aflaung, hríngnökkótt, flöt. Staungullinn skriðandi; ísl. Vazarfi.

Rótin aungótt; staungullinn greinótt, slètt, sívalr, svarðliggjandi, neðstskrifandi, þykkliðótt þar sem blöðin og klasarnir eru. Blöðin stuttleggjuð snubbótt, þykk, móttæð. Klasarnir móttæðir, 3svar leingri enn blöðin, og eru fastir í blaðhornunum. Blómstrleggirnir litlir, þræðilskir. Blomstrblöðin strikmynduð. Bikarinn 4skiptr. Krónan myrkblá. Fræhúsið aflángt.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi er styrkjandi, blóðhreinsandi, ormdrepandi og uppleysandi. Hún er því góð móti skyrbjúgi, niðrfalls-sótt, ormum, matarólyst og hráa magans. Te af urtinni drekkist, svo tebollum nemi, 3svar dagliga.

Seyði af urtinni hreinsar gömul ill sár, og tekr ský af augum. Dupt af rótinni er gott að blanda með tóbaki, og taka í nef, það styrkir höfuð og sjón.

- c. Slèttir Ærnpris (*V. serpyllifolia*): blöðin aflaung, hrágnöbbótt, eins og bikararnir, slètt. Klasarnir lágir. Blómstrin fjærstandandi.

Rótin aungótt. Staunglarnir 3 til 6 þumlunga lágir neðstskrifandi, uppstígandi, optast einsamlir slèttir. Blöðin, utan þau neðstu, sitjandi stráð, stundum heil á röndum, sem optast nöbbótt, oskírt 3sinótt,  $\frac{1}{2}$  þumlungs laung. Klasarnir lágir. Blómstrleggirnir missettir, og hefir hvör um sig eitt slètt lensulíkt blómstrblað. Bikarsins 4 leppar eru aflángir, ójafnt skiptir. Krónurnar ljósbláar, litlar.

Fræhúsið umsnúið nggmyndað, styttra enn stíllinn. Margra ára urt.

Blómstrar frá júní til september.

*Nytsemi og verkun:*

Lík sem undangangandi. Góð fóðr-urt.

- d. Fjall-æruprís (*V. alpina*): blöðin aflaung, heil á röndum eðr smánöbbótt. Bikararnir randhærðir; staunglarnir einfaldir uppstígandi. Klasarnir með fáum þéttstandandi blómstrum.

Rótin með þræðilíkum aungum. Staunglarnir uppreistir eðr uppstígandi; ógreiniliga 4strendir, neðan sléttir, ofan dúnhærðir. Blöðin fjærstandandi, mótstæð, þau efstu smánöbbótt, sitjandi, hvöss, þau neðstu aflaung, heil á röndum. Bikarinn snöbbóttur, jafuskiptr, randhærðr. Krónurnar litlar, bláar. Fræhúsið aflángt, hætt.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* góð fóðr-urt.

- e. Lensublaðaðr Æruprís (*V. anagallis*): blöðin lensulík, nöbbótt. Staungullinn uppreistr.

Staungullinn, sem urtín öll, slétt, einúngis á neðri enda lítið hærðr, sívalr, greinótt, og við neðri endann rótum skjótandi. Blöðin hálfumfaðm- andi, mótstæð, opin, 2 til 3 þumlunga laung. Nabbararnir smáir, fjærstandandi. Klasarnir mótstæðir, lengri enn blöðin. Blómstrleggirnir uppreistir, óregluligir, þræðilíkir. Blómstrblöðin stríkmyndað, lensulík.

Bikarinn 4skiptir með strikmynduðum leppum. Krónurnar hvítbláar. Fræhúsið umsnúið eggmyndað.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* sem næst undangangandi.

f. Mjóblaðaðr Ærupris (*V. scutellata*):

Blöðin strikmynduð, lensulík, næstum heil á röndum; legginir niðrhángandi.

Rótin skrifandi. Staungullinn uppréttr, einungis neðst skrifandi, greinótt, veigalítil; blöðin sitjandi, slétt, mótstæð, 1 þumlúngs laung, þau neðstu styttri en þau efstu. Klasaleggirnir þræðilíkir, ásamt klasanum, helffangi lengri en blöðin. 4 til 5 hárumlíkir blómstrleggir. Bikararnir hángandi eptir blómstrunina, með 4 aslaungum næstum jafnstórum leppum.

Blómstrblöðin strikmynduð, styttri en blómstrleggirnir. Krónurnar myrkbláleitar. Krónunnar efsti flípi hefir 3 rauðar æðar. Fræhúsið umsnúið eggmyndað.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

*Nytsemi og verkun:* góð fóðr-urt.

g. Bjarg-ærupris (*V. saxatilis*): Blöðin eggmynduð, aslaung, næstum heil á röndum; staunglarnir margskiptir. Klasarnir fáblómstraðir.

Staungullinn niðrlagðr, með uppstígandi, dúnhærðum, þéttblöðnuðum greinum. Blöðin mótstæð, lítil, þykk, dökkgræn, neðst smámjókkandi í einn blaðlegg, þéttstandandi, minnst við neðri enda greinanna, þau efstu hær og þar nöbbótt, snubb-

ótt, randhærð. Blómstrleggirnir í greinaendunum hafa 4 til 6 blómstr, sem eru lengri en blómstr-blöðin. Bikarsins leppar lensulíkir, snubbóttir. Krónurnar myrkbláar, í miðjunni rauðar.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

## 2. Lifjagras (*Pinguicula*).

- a. Almennu Lifjagras. (*P. vulgaris*):  
Hunángssporinn sívalr, röttur, jafnlánger krónunni, efsta vörin klofin, neðsta vörin 3-skípt. Skaptið slétt; ísl. Lifjagras. Kæsirs-gras. Hleypis-gras. Jónsmessu-gras.

Skaptið sem optast uppreið, sívalt, einfalt. Blöðin eggmyndað, snubbótt, öll við rótina. Röndin innáviðbeygð, vörtum sett, þvöl, á flatveginn ljósgræn. Krónan dökkblá, 5klofin. Ginið hvíthært. Örið blaðmyndað, breitt, innáviðbeygt, með hármýnduðu hreystri á bakinu. Fræluðið eggmyndað.

blómstrar í júní og júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Urtin er mýkjandi, græðandi, og hreinsandi, hún brúkast því móti útbrotum hörundsins, við bólgu og sprungum.

Af urtarinnar blöðum, smásöxuðum, og sodnum með smjöri, og litlu einu af tölgu má smýrsl tilbúa; t. d. tak af smáskornum blöðunum 6 lóð, nýtt ósaltað smjör 8 lóð, nýja tölgu 4 lóð, sjóð saman um stund, síá hið þunna frá og geym. — Smýrsl þessi græða vel gömul sár, og önnur út-

brot hörundsins. Seyði af urtninni hreinsar höfuð barua frá skurfum, drepr lýs, eykr hárvöxt.

Urtin soðin í mjólk bleypir hana, en illa fer að landar mínir, hvar nægð hennar vex, eigi fara að dæmum Norðmanna, Svía og Fiunlappa, er með urt þessari búa sèr til þetta eðr mauk (*lac hyperboreum*), er þeim þykir til drýginda horfa, og skeðr það á þennan hátt. Marin Lifjaurtar blöð leggjast á sfil, og þarígeguum síast mjólkkin, þareptir er hún látin í grunn slát, og sett frá, á afvikinu stað, þartil þykknar í 1, 2 til 3 daga, eptir sem hlýindi eru í veðri, þá þykknar mjólkkin og skilr sig þó eigi. Af þetta þessum takist á málum og blandist í mjólk, sem maðr ætlar sèr til nautuar, hvarvið hún þykknar, sem og verðr munn-tamari, og stendr betr undir.

- b. Fjall-lifjagras (*P. alpina*). Hunáangs-sporinn uppstígaði, styttri enn króuan, efsta vörin randskorin, neðsti flipinu afkubbaðr.

Rótin anngótt. Staungullinn einfaldr. Blöðin mjó, eggmyndað. Krónan gulleit. Fræhúsið eggmyndað, eudast með einum krók.

Margra ára urt; blómstrar í júl.

*Nytsemi og verkun*: óþekkt.

## 2. Orða (*Digynia*) tvíkvæntar.

### 3. Gulax (*Anthoxantum*).

- a. Velluktandi Gulax (*A. odoratum*) Axið eggmyndað, aflángt; blómstrin stuttleggjuð, lengri enn stríð; ísl. Reyrgras.

Rótta augótt, smádúnhærd; stráid uppreist, slétt, renuótt, neðst hujábeygt. Blöðin flest við rótina, stutt, strikmynduð, reimótt, úthvest, ljósgæu, 1 til 2 á staunglinum, mikið stutt, opin, á neðri enda hærd.

Slíðrið lánghært, skurðótt. Slíðrhimnan lensulík, hvít, þurr. Axið, áðr enu urtin blómstrar eggilíkt; eptir blómstrunina lensulíkt eðr strik myndað, einsett, uppreist, hvast, margblómstrað. Bikarsins hreystr sem optast smáhærd, hvöss, hörð, himuótt, snörp, með grænum hrygg. Það ytra hreystr styttra en það innra. Króauunnar hreystr jafulaung, ryðlituð, hærd, styttri enu bikarinn, í efri enda klofin, við neðri enda strísett. Stríin ójöfn, það lengra hujábeygt.

Dupthnapparnir strikmyndaðir gulir. Dupthirzurnar láugar, úthángandi, hvítar. Örin þræðilik, loðin. Eptir að urtin hefir blómstrað, er axið gult. Urtin gefr sterka lukt.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

#### *Nytsemi og verkun:*

Urtin lögð í tóbaksbanka og millum fata, gefr góða lukt, hún er og bezta fóðr-urt fyrir öll grasetandi dýr.

## 3ji Hópr.

(Triandria) þrímaunaðar.

Ista Orða (*Monogynia*) einkvæntar.

1. Velantsurt (*Valeriana*). Krónan 5klofin við neðri enda, hnúskótt eða sporótt; eitt fræ innibyrgt í bikarnum, krónað, með þeli eður tönnum.

2. Skæni (*Schænus*). Bikarbelgirnir smáhreystróttir, hópsettir, þeir yztu ófrjófir; engin króna; fræið lángleitt.

3. Skúfgras (*Scirpus*). Bikarbelgirnir smáhreystróttir, 2raðaðir, allstaðar þaktir; engin króna; fræið nakið.

4. Síkis-ull (*Eriophorum*). Bikarbelgirnir smáhreystróttir, allstaðar þaktir; engin króna. Fræið sett með lángrí ullu.

5. Finnúngr (*Nardus*). Enginn bikar; krónubelgrinn tvíblaðkaður.

2. Orða (*Digynia*) tvíkvæntar.

b. Rottuhali (*Phleum*). Bikarsins belgr tvíblaðkaður, afkubbaður, með 2 broddum.

7. Refshali (*Alopecurus*). Bikarbelgrinn tvíblöðkótt. Krónubelgrinn einblaðkaður, með einsettum oddi.



8. Milíngras (*Milium*). Bikarbelgrinn tvíblöðkóttur, keistr, stærri enn krónubelgrinn; örin ullhærð.

9. Hvingras (*Agrostis*). Bikarbelgsins 2 blöðkur hvassar, styttri enn krónubelgirnir; örin fjöðruð.

10. Punthali (*Aira*). Bikarbelgrinn 2blaðkaður, 1 til 2-blómstraður.

11. Sveifgras (*Poa*). Bikarbelgrinn 2blöðkóttur; krónubelgsins blöðkur eggilíkar, hvassar, án brodds.

12. Vinguill (*Festuca*). Bikarbelgrinn 2blaðkaður; smá-axin aflaung, sívöl, fyrir utan strí.

13. Hegri (*Bromus*). Bikarbelgrinn 2blöðkóttur; krónubelgrinn 2blöðkóttur, sú innri blaðka randhærð, sú ytri með stríi fyrir neðan broddinn. Smáöxin aflaung.

14. Reyri (*Arundo*). Bikarbelgrinn 2blöðkóttur; krónubelgrinn 2blaðkaður við neðri endann, kríngumvaxinn með ullu.

15. Melgras (*Elymus*). Bikarbelgirnir 2blaðkaðir, margir saman með mörgum blómstrum.

16. Hveiti (*Triticum*). Bikarbelg-

irnir 2bláðkaðir, einfaldir, með mörgum blómstrum; axlegggrinn tennt.

17. Hestaurt (*Holcus*). Bikarbelgrinn 2blöðkótt; krónubelgrinn ber strí, er 2-blómstraðr, annar þeirra karlkyns, blöðkulaus.

3. Orða (*Trigynia*) þríkvæntar.

18. Montía (*Montia*). Bikarinn 2-blöðótt; krónan einblöðuð. Fræhúsið 3-blöðkótt með 3 fræum.

19. Königsjurt (*Königia*). Bikarinn 3-blöðótt; engin króna; nakið fræ.

3. Hópr (*Triandria*) þrímannaðar.

1sta Orða (*Monogynia*) einkvæntar.

1. Velantsurt (*Valeriana*).

a. Læknis - velantsurt (*V. officinalis*).

Blöðin öll uggðu. Uggarnir lensulíkir, nöbbóttir; ísl. Vèlantsurt.

Rótin augótt; staungullinn uppreistr, slètt röndótt, greinótt, sívalr. Greinirnar móttæðar. Blöðin leggjúð með ójöfnum nöbbum; endaugginn næstum því eins stór og hinir aðrir, þeir eru allir sitjandi, hinir neðstu lensulíkir, hinir efri stríkmyndaðir, með fjærskildari nöbbum; bládeggrinn ullhærðr. Blómstrblöðin stríkmyndað, lensulík, með himnúttum röndum. Hálfskýlan mörgum sinnum 3skipt. Krónurnar ljósrauðar.

Margra ára urt; blómstrar í júl.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi er styrkjandi, svita og þvagdrífandi, uppleysandi, ver niðrfallssýki, og móttendr forrotun. Hún er því góð móti matarólyst, óstyrk magans, afleysi, niðrfallssýki, hjartslætti, skyrbjúgi og slæmum vessum. Te af urtarinnar blöðum drekkist svo tebollum skipti 4sinnum dagliga. Seyði af rót urtarinnar takist, 2 matspæinir í senn, hvört dagsmark.

Duþ af rótinni takist inn teskeið full 3svar dagliga í spæni fullum af vatni. Af rótinni má dropa tilbúa þannig: tak af rótinni smáskorinni 2 lóð, bezta brennivíns 10 lóð, lát standa við il í 4 daga, sía síðan hið þunna frá. Af dropum þessum takist 80 í senn 3svar dagliga.

Móti Sjóndepru er gott að taka duþ rötariunar í nefið, og þvo augun optliga úr seyði rötariunar.

## 2. Skæni (*Schænus*).

- a. Flat-skæni (*Sch. compressus*). Stráid ávið sívalt, blaðlaust. Axið tvísett, styttra enn þær einblöðuðu reifar. Smáöxin margblómstruð. Blöðin flöt.

Rótin skríðandi, liðótt, með mörgum smáaungum. Stráid slíðrað við nedri endann af nokkrum fáum blöðum, lítið bogið, uppreist, slètt, röndótt, 3strent, nakið. Blöðin við rótina missett, styttri enn stráid, slíðrandi, þau efstu jafnhá stráinu, randhvöss, reunnótt. Axið í enda strásins, samstand-

andi af 5 til 10 rauðleitum, missettum smáöxum, mótstæðum eðr svoléiðis settum, að öxin snúa sér-hvört til mótsettrar síðu, hvarfyrir þau líta saman-þrykkt út. Reifarnar undir bladinu einblaðaðar, efst 3strendar, á röndum snarpar, umfaðmandi þau neðstu smáöx. Örið 3skipt, dúnhætt, fræið 3-hornótt.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

### 3. Skúfgras (*Scirpus*).

- a. Mýra-skúfgras (*Sc. palustris*). Stráið slíðrað neðantil, sívalt. Axið eggmyndað. Bikarbelgirnir hvassir.

Rótin skríðandi, liðótt, hreystrótt, vazflöt. Stráin mörg saman, uppreist, blaðlaus, óskipt, sí-völ, stutt, neðst slíðruð af sívölum heilrönduðum afkubbuðum skeiðum; engin blöð, en opt blöðum lík ófrjóf strá. Axið margblómstrað. Bikarbelgs-ins blöðkur jarpar, á röndum stríðhimnaðar, hvít-leitar. Dupthuapparnir gulir. Fræið neðantil hárum sett.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

- b. Mosa-skúfgras (*Sc. caespitosus*). Stráið sívalt, röndótt, neðst slíðrað, þètt-hreystrað. Bikarbelgsins yztu blöðkur nokkuð stórar.

Rótin með þèttum augum; stráin þètt, uppreist, óskipt, sívöl, slètt, röndótt. Slíðrið yítt, blaðilíkt, neðan stakt með stuttum, snubbóttum broddi, umkríngt mörgum himnulíkum, gráhvít-leitum, röndóttum, holum og slíðrandi þöktum, ævar-

andi, utantil stærri hreystrum. Axið lítið dökkleitt. Bikarbelgsins 2 yztu blöðkur eru jafnlángar axinu, og endast með snubbóttum, blaðlíkum broddi. Fræið neðst sett smáum burstum.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Menu segja almennt að, þar sem gras þetta vaxi, sé móturf undir. Góð fóðr-urt, einkum fyrir saufð.

- c. Tjarna-skúfgras (*Sc. lacustris*). Stráíð blaðlanst með litlum skúf, samansettum af smáöxum í efri enda.

Rótin þykk, vaxflöt, skriðandi; stráin lá, sívöl, slétt, uppstandandi, með hvítum mergi innan, við neðri enda slíðruð af mörgum missettum skeiðum. Skúfsins eður klasans greinir samansettar, mislángar, samanþrykktar, ávið sívalar, í efri endanu með smáu kögri. 2 yztu blómstrblöðin stór, mislaung, lensulík, hulstriík, þau innstu minni og fleiri. Smáöxin þétt, næstum legglau, eggmynduð, glansandi, ryðlituð. Bikarbelgirnir holir, broddóttir, á röndum kögrlagðir. Fræin á aðra síðu flöt, við neðri endanu burstasett.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Af strái þessa grass mætti einsvel og af mel, tilbúa lénur á hesta. Það brúkast líka af beykirum, til að þétta með tunnur og önnur flát.

- d. Nálmýndað Skúfgras (*Sc. acicularis*). Stráíð 4strent, neðst slíðruð af broddlaus-

um skeiðum. Axið eggmyndað hvast; þær ytri bikarblöðkur stærri.

Rótin með þöttum aungum, stráin þunn, óskipt, uppreist, 4strend. Hliðarnar sléttar, stráin þunn, broddlaus, í efri enda innþrykkt. Blöðin fá, lík staunglinum að lögun, en þó minni. Axið lítið hvast eggmyndað, 5 til 6blómstrað. Bikarbelgirnir þaktir, hvassir, hryggjóttir, á röndum himnóttir, þeir efstu ófrjófir.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* sæmilig fóðr-urt.

- c. *Bursta-skúfgras (Sc. setaceus)*. Stráin blaðlaust, burstalíkt, með 2 sitjandi öxum á hliðinni fyrir utan blómstrblöð.

Rótin með þöttum litlum aungum. Stráin þött saman, smá og mjó, röndótt, slétt. Blöðin líkjast stráinu, en eru styttri, og hafa við nedri endann röndótt og sívalt slétt. Nær því við nedri enda strásins spretta 2, stundum 1, skjaldan 3 öx fyrir utan blómstrblöð, þan eru eggmyndað, slétt. Bikarbelgirnir jafastórir, dökkleitir, með grænni, hvassri og hryggmyndaðri sin á bakinu. Fræin háralaus.

Eins árs urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

#### 4. Síkis-ull (*Eriophorum*).

- a. Slíðruð Síkis-ull (*E. vaginatum*). Stráin slíðruð, sívöl; axið einfalt. Bikarblöðkur-nar þurhinnóttar.

Rótin með þöttum aungum; stráin ávið þristrend, uppreist, slétt, með 2 slíðrum, hvaraf það eina

gengr niðr á miðja strásins, það annað við neðri enda þess fyrra. Blöðin sitja við rótina, hafa 3 síður, strikmynduð, beygð á bak aptr, röndótt, neðri endi þeirra himnulíkr, slíðrandi. Axið eggilíkt, á efri enda strásins; um blómstrunartímann að lit sem blý, eptir blómstrunina sett hvítri, langri ullu, og er studd af blómstrblöðum.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

b. Flatblöðnuð Síkis-ull (*E. polystachion*).

Stráð sívalt, blöðin flöt. Öxin leggjuð; ísl. Fífa.

Rótin auggótt; stráð sívalt, blöðótt, röndótt, slétt; blöðin strikmynduð, styttri enn stráð, við efri endann með snörpum hrygg, í neðri endann slíðrandi, á röndum snörp. Blöðin við blómstrin 2 eðr 3, við neðri endann himnótt, útteygð. Axleggirnir mislángir, áviðflatir; öxin svartleitt, fyrir blómstrunina stuttleggjuð, eptir blómstrunina lánleggjuð og háugandi. Belgjablöðkurnar strikmyndaðar, lensulíkar, óþýðar, himnóttar. Fræullin laung, hvít.

Margra ára urt; blómstrar í ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Fífunnar fræull kann að brúkast til margra hluta, t. d. velþurkuð í rúmföt og hægiudi, kveiki, svoel í kerti sem lampu. Ullin skorin og hnoðuð saman við smjör eðr út gót á meinsemdum. Þar- aðauki má spinna hana saman við aðra ull í fót.

c. Litla Síkis-ull (*E. alpinum*). Stráin blaðlaus, strend. Axið einsett, uppreist, styttra enn fræullin.

Rótin aungótt, skriðandi, með mörgum uppreistum, þræðilíkum, 3 til 4 strendum stráum. Blöðin sitja við neðri enda strásins, og eru strikmynduð, hryggjótt, snubbótt, slíðrandi, styttri en stráið, á röndum snörp, umföðmuð af pípumynduðu, afkubbuðu slíðri. Axið lítið, eggilíkt, fáblómstrað, á efri enda strásins.

Bikarblöðkurnar eggmyndaðar, hryggjóttar, ryðlitaðar, á röndum himuóttar, hin yzta umfaðmandi, og endast með einum snubbóttum, grænum broddi. Fræin 3strend. Ullin gisin, velhvít, laung í tilliti til axins.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

### 5. Finnúngr (*Nardus*).

- a. Öþýðr Finnúngr (*N. stricta*). Axið burstalíkt, beint, einnar síðu; ísl. Töðu-finnúngr.

Rótin samanstendr af þykkum, dúnhærðum aungum. Stráið slètt, lítið strent, öþýtt, lítið beygt, rótarblöðin mynda svörð niðr við rótina, eru burstalík, röndótt, hvít, grá-glansandi, og endast með uppblásnum skeiðum, sett stuttum, snubbóttum hreystrum; efri blöðin minni, hvöss, 3hyrnd dúnhærð, gráleit. Axið lítið einsett, á enda strásins. Blómstrin bláleit. Krónunnar belgblöðkúr strikmyndaðar með stríi, snarpar.

Margra ára urt.

*Nytsemi og verkun:*

Urtin skýlir foksandi; er eigi góð fóðr-urt.



2. Orða (*Digynia*) tvíkvæntar.6. Rottuhali (*Phleum*).

- a. Mark-rottuhali (*Ph. pratense*). Axið sívalt, mikið langt; bikarbelgirnir á hryggnum hærðir, lengri enn strúð.

Rótin augótt; stráin uppreist, röndótt, blöðótt, en þó blaðlaus efst. Blöðin snörp, einkum á efri síðu. Slóðrin laung, röndótt, sívöl. Slóðrhimnan stutt, snubbótt, gagnsær. Axið uppreist, þéttblómstrað allstaðar sívalt, snubbótt, og með því bikarbelgirnir eru hærðir, sýnist það loðið. Bikarbelgirnir grænir, með hvítum sinum og röndum. Dupthnapparnir dökkrauðir.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Bezta fóðr-urt fyrir hesta.

- b. Hnöllótt Rottuhali (*Ph. nodosum*) er eiginliga sama urt, sem næst undangángandi, henni að öllu lík, utan að hún hefir laukmyndaða eðr eggilíka rót, styttri og neðst niðrlögð strá.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* sama sem undangángandi.

- c. Fjall-rottuhali (*Ph. alpinum*). Axið eggilíkt, sívalt; strúð jafnlángt belginum; ísl. Foxgras, tóugras, refshali, puntr.

Rótin næstum hnöllótt, lítið skriðandi; stráíð einsett, uppstigandi, neðst hært, ofantil slétt, slóðrað af blöðunum, einkum við neðri endann. Bláðanna slóðr laung, þó stytzt niðr við rótina. Blöðin styttri enn stráíð, strikmynduð, hvöss, ljósgræn,

röndum snörp. Slíðrhimnan mikið stutt. Axið eggmyndað, aflángt eðr sívalt, dökkleitt.

Bikarbelgirnir randhærðir. Stráin bein, dökk-rauð. Krónubelgirnir strílausir, snubbóttir eggmyndaðir, misjafnir að stærð.

Margra ára urt; blómstrar í ágúst.

#### 7. Refshali (*Alopecurus*).

- a. Hnjábeygðr Refshali (*A. geniculatus*). Stráid uppstígandi hnjábeygt. Axið nær því flípótt, sívalt; blómstrbelgirnir innþrykkir, á röndum hærðir.

Rótin með laungum óskiptum aungum. Stráid mikið bogið, uppstígandi, blöðótt, greinótt, slétt, við neðstu hringina rótum skjótandi. Blöðin stutt, slétt. Slíðrið samauþrykkt. Slíðrhimnan þunn, hvít. Axið lítið rauðleitt. Blómstrbelgsins blöðkur misstórar, snubbóttar. Bikarbelgirnir hærðir. Krónubelgirnir sléttir.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

#### *Nytsemi og verkun:*

Er bezta fóðr-urt handa hestum og nautum, en ei svo góð fyrir sauðfænað.

#### 8. Milíugras (*Milium*).

- a. Utbreiddt Milíugras (*M. effusum*). Með toppmynduðum, útbreiddum, strílausum blómstrum.

Rótin aungótt; stráin mörg frá sömu rót, uppreið, sívöl, slétt, blöðótt röndótt. Blöðin breið, slétt, á röndum snörp. Slíðrhimnan eggmyndað,

trosnuð, blómstrtopprinn stór á enda strásins. Greinarnar hárfékar, snarpar, margskiptar, standa rétt út, endar þeirra fram og tilbakabeygðir með mörgum blómstrum. Blómstrbelgirnir eggmyndaðir. Bikarbelgirnir þynnri, þrísuóttir. Krónubelgirnir mótsettir, glansandi, og umfæðma hvör annan. Dúptberarnir lengri enn blómstrin. Öxin fjöðurlík. Fræin ávöl.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Fyrir utan að urtin er bezta fóðr fyrir öll grasetandi dýr, má og af fræi hennar mjöl tilbúa, og vel til matar hafa. Urtin er velluktandi, og ver maur.

#### 9. Hvíngras (*Agrostis*).

- a. Rauða Hvíngras (*A. rubra*). Sá blómstrandi þatr toppsins útbreiddr. Krónubelgsins ytri blaðka slétt, með þunnu tilbakabeygðu strfi á endanum.

Rótin augótt, mörg uppreist strá, blöðin snörp á röndum, og á neðra yfirborði þurr vinna þau sig saman. Slóðrhimnan flípótt, slóðruð, röndótt. Toppgreinirnar í krönsum, um blómstrstímann vatnsflatar; fyrir blómstrunina axmyndaðar, samanþrykktar, eftir blómstrunina rauðleitar, ennneir samanþrykktar.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:* bezta fóðr-urt.

- b. Skríðandi Hvíngras (*A. Stolonifera*).

Blómstrtopprinn samanhnepptr. Stráð grein-

ótt, skriðandi. Blómstrin þètt. Bikarblöðkurnar jafnstórar, lensulíkar, dúnhærðar; ísl.

Rótin laung, skriðandi, með mörgum greinóttum dúnhærðum aungum. Stráin niðrlögð, greinótt, slètt, blöðótt, með samanhnepptum dökk-rauðum hujám, þau neðstu rótum skjótaudi. Blöðin breið, snörp, sínótt. Slíðrhimnan margskipt. Blómstrtopprinn uppreistr. Greinirnar missettar, hálfkransmyndaðar, nær því allar á eina síðu, þèttblómstraðar, margskiptar, út- og innbeygðar; þær efstu samanbeygðar, enar neðstu opnar. Blómstrin strikmynduð, lensulík. Krónnbelgirnir misjafnir að stærð, styttri enn bikarbelgirnir, stuttleggjaðir við neðri endann. Bikarbelgirnir hryggjóttir, rauðleitir.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Urtin er en bezta fóðr-urt, bæði á sumrum af jörðunni, sem og slegin og þurkuð í heyum. Af henni mjólka kýr afbragðsvel, og hafa snjörmikla mjólk. Eftir að urtin er slegin, vex hún, og fölnar traudliga eða brennr.

c. Lítið Hvíngras (*A pumila*). Blómstrtopprinn einnrar síðu. Stráin uppreist í bindinum; ísl.

Rótin með mörgum aungum. Stráin mörg saman í bindinum, uppreist; neðst lítið innávið beygð, blöðótt. Rótar- og staungulblöðin jöfn, stutt, hvöss; hnèin rauðleit; slíðrin röndótt, þau efstu laung. Slíðrhimnan stutt, snubbótt, skörðótt. Topprinn opinn með jöfnum greinum, er allar snúa á eina hlið. Smá öxin eggilík, hvöss, græn, rauðleit,

glansandi. Blómstrblöðkurnar jafnstórar, utan hára. Fræin ávið sívöl, lítið hvesst.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og Verkun:* sæmilig fóðr-urt.

- d. Hunda Hvíngras (*A. Canina*). Bikarbelgirnir eggmyndaðir, hærðir: Krónubelgrinnu ber, með innáviðbeygðu strfi á hryggnum.

Stráin svarðliggjandi, lítið greinótt; ísl.

Stráin svarðliggjandi í efri endann, uppreist, blöðótt. Blöðin snörp, þau neðri mjórri enn hin. Topprinn rætt, hálfkransmyndaðr. Blómstrin eggilík, glansandi; við neðri endann dökkrauð um blómstritímann, en bleik á lit, þá urtin fer að frævast. Bikarbelgsins blöðkur ójafnar, sú ytri suörp á hryggnum. Krónan styttri enn bikarinn. Strfið 2faldt lengra enn krónan. Dupthnapparnir bláleitir.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* sem undangangiandi.

- e. Almenut Hvíngras (*A. vulgaris*). Blómstrtopprinn opinn, án strfis, með úþöndum hárilíkum greinum. Bikarbelgsins blöðkur jafnstórar. Krónubelgsins innri blaðka 2föld, styttri, innþrykkt í broddinn.

Rótin með mörgum smáum augum, opt skrifandi. Stráin uppreist, hlöðótt, slétt, röndótt. Blöðin mjó, hvöss, snörp, með langu jöfnum slðri. Slðrhimnan stutt, nögnuð, niðráviðhlaupandi. Topprinn uppreistr, þokkuð lágr; fyrir hlómstruunina dökkrauðr, en ljósrauðblár eptir blómstruunina, með missettum, hálfkransmyndudum, út- og inn-

beygðum, margskiptum greinum. Blómstrin eggmynduð, lensulík. Bikarblöðkurnar lensulíkar, opnar á röndum með óþýðum himnum, við neðri endann rauðleitar. Krónublöðkurnar hvítleitar, þunnar; sú ytri nærstum eins stór og bikarinn; sú innri mikið minni.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* bezta fóðr-urt.

- f. Hvítt Hvingras (*A. alba*). Blómstritoppurinn slykjaðr. Stráid skrifandi. Bikarblöðkurnar jafnstórar, lensulíkar; glansandi, með snörpum kjöl; ísl.

Rótin sett laungum augum, sem aptr hafa minni ánga. Stráid niðrliggjandi, rótum skjótandi við neðstu línè og blöðótt, að ofanverðu uppreist, blaðlaust, ójafnt. Blöðin snörp; blaðslíðrin jöfn. Slíðrhimnan snubbótt, klofin cöð trosnuð. Blómstritoppurinn greinótt, útbreiddr, margblómstraðr, hvítleitr. Krónublöðkurnar misstórar, önnur snubbótt, hin hvöss, styttri en bikarinn, stundum en þó sjaldnar með stríi við neðri endann.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* notandi fóðr-urt.

- g. Reyrrmyndað Hvingras (*A. arundinacea*.) Topprinn allágr; yzta krónublaðkan við neðri endann hærð með stríi. Stríid er inn-snúið, lengra en bikarinn; ísl.

Rótin augótt, lítið skrifandi. Stráid uppreist langt, slétt, röndótt, líðótt, blöðótt. Blöðin strikmynduð, laung, samanundin í broddinn, snörp ef strokin eru niðreptir. Blómstritoppurinn lítið sam-

anhnepptr, ljósleitr. Bikarbelgsins hlöðkur hvassar, misstórar. Krónubelgrinn minni en bikarinn, hærðr við neðri enda.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst

#### 10. Punthali (*Aira*).

- a. Éngja Punthali (*A. caespitosa*). Blöðin flöt. Topprinn opinn. Krónublöðkurnar ullhærðar við neðri endann. Stríð beint, stutt.

Rótin með þéttum aungum. Stráin uppreist, jöfn, stinn, blöðótt, tvíliðótt. Blöðin mjó, á neðra yfirborði jöfn, á röndunum og sinunum snörp. Rót-arblöðin útbreidd, við neðri endann slíðrandi. Slíðrhimnan laung, hvöss, klofin. Slíðrin jöfn, röndótt. Topprinn stór, silfrglansandi. Greinirnar margskiptar, hálfkransmyndaðar, hárumlíkar, snarpar. Bikarblöðkurnar jafulángar, á hryggnum ójafnar. Sá eini krónubelgr leggjaðr, hinn næstum sitjandi; leggrinn loðinn. Önnur blaðkan breiðari í broddinn, lítið nögud, og hefir á hryggnum stutt innávið beygt strí.

*Nytsemi og verkun:* góð fóðr-urt fyrir kýr og fè.

- b. Bugðóttir Punthali (*A. flexuosa*). Blöðin burstalík. Stráid nærri blaðlást. Blómstrleggirnir bugðóttir. Stríin hájbeygd.

Rótin aungótt. Stráid uppreist, sívalt, slétt, raundleitt. Þau fína blöð, sem eru þétt samanvið rótina, eru snörp á röndum, í miðju reunnótt, við neðri endann útvíðkuð, slíðrandi. Slíðrhimnan stutt, snubbótt, klofin. Toppgreinarnar 3skiptar, bugðóttar, skáhallar. Smáleggirnir missettir. Blómstrin upp-

reist, silfrglansandi. Blómstrblöðkurnar nærri jafnstórar, nagaðar í broddinn, hærðar við neðri endann. Þær innri krónublöðkur mjórri. Stríðið lítið lengra eun blaðkan.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* sæmilig fóðr-urt.

- c. Bjarg-Punthali (*A. montana*). Blöðin burstalík. Topprinn mjór. Blómstrin við neðri endann hærð með strí. Stríðið lengra enn smáaxinin.

Rótin sett laungum auugum, og vaxa uppaf henni fá uppreist strá. Blöðin þètt samanvið rótina, óþýð, skurðótt, snörp á röndum. Á staunglinum vaxa 2 blöð einslit, aunað undir blómstrtoppinum. Blómstrin líkjast bugðótta punthalanum. Smáaxinin eru aðþrykkt staunglinum og meir glansandi. Stríðið dökkleitt.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* sama sem undangángandi.

- d. Fjall-Punthali (*A. alpina*). Blöðin alílk. Topprinn þètt. Blómstrin hærð með stuttum stríum við neðri endann.

Rótinskriðandi, aungótt, ogframskýtr ýmisligum framáviðliggjandi renglum, sem og fáum uppstígandi sívölum slèttum stráum, sem hafa 1 lið við neðri enda á því efsta blaði. Blöðin mjög mjó, hvöss, slètt; á röndum snörp, röndótt; þau efstu stutt, með laungu röndóttu slðri neðanundir blómstrunum. Topprinn er, þá urtin fyrst fer að blómstra, samanlnepptr, þareptir oplun, með mjög finum, smálbærdum, í broddinn lítið þykkari grein-



um. Bikarblöðkurnar stærri enn krónurnar, leusulíkar, hvassar, utan rauðbláar. Milli þeirra og krónanna eru bindini af smáum hárum. Krónublöðkurnar misstórar; sú stærsta nöbbótt í efri endann, og hefir við neðri endann lítið snúið strí, sem er styttra en blaðkan; sú minni blaðka er hvassari; krónan önnur sitjandi, hin með leggundir.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

betri fóðr-urt enn 2 undaungáugandi.

- e. Vatns-Punthali (*A. aquatica*). Blómstr-topprinn opinn. Krónublöðkurnar jafnar, snubbóttar, lengri enn bikarsins. Blöðin flöt.

Róti sett laugum augum, skriðandi, hvít. Stráið sveimandi, í broddinn uppreist, við neðri rótumskjótandi, blöðótt. Blöðin slött, þunn, sveimandi, slíðrandi. Slíðrhimnan óskipt, hvít, þunn, himnulík. Topprinn uppreistr. Greinirnar hálfkrausmyndaðar, mislángar, slöttar, margblómstraðar, rauðleitar; sú efsta við neðri enda sínótt. Krónublöðkurnar mikið lengri enn bikarsins, jafuláugar, 3sínóttar, rykktar, í broddinn himnulíkar, iunþrykktar.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Besta fóðr-urt fyrir mjólkandi kýr og sandfè.

- f. Ax-Punthali (*A. subspicata*). Blöðin flöt. Topprinn axmyndaðr. Miðblómstrið hefir strí ábakaptr beygt. Strúð lítið, slýkjað.

Rótin samanstendr af laungum sínóttum auugum, sem framskjóta fjölda af blöðum og stráum. Stráin hærð við toppinn, og liðótt við neðri endann. Blöðin strikmynduð, slétt, umfaðma helfing strásins, og eru þètt tilsamans við neðri endaun. Slíðrið hært, jafnlángt blaðinu. Blómstrtopprinn svo þètt, að sýnist sem axin væri. Smáaxinin ljósgrágul að lit, standa á stuttum greinóttum leggjum. Bikarblöðkurnar stuttar, glansandi. Krónublöðkurnar sléttar. Sú yzta hefir strí ofaná hryggnum, sem við neðri endanu er út- og innbeygt, 2faldt lengra enn blaðkan; strí þessi láta blómstrtoppinn sýnast sem loðinn væri.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- g. Snemmvaxinn Punth. (*A. præcox*). Blöðin burstalík. Slíðrin strend. Blómstrtopprinn axillíkr. Blómstrin sitjandi með strí á hryggnum.

Rótin smáauugótt. Stráin uppreist, blöðótt, bleik, sem öll urtin er, jöfn. Blöðin við rótina visnandi. Stauugulblöðin lángs slíðrandi. Slíðrin uppblásin, sínótt. Slíðrhimnan snubbótt. Topprinn samþrykktr, uppreistr, fáblómstraðr. Blómstrin ljósgreen, glansandi. Bikarblöðkurnar jafnláugar, snarpar á hryggnum. Báðr krónurnar legglausar; þær yztu blöðkur hafa strí, sem er hnèbeygt, en 2faldt á lengd við bikarinn. Eins árs urt; blómstrar í júlí.

## 11. Sveifgras (*Poa*).

- a. Almennt Sveifgras (*P. trivialis*). Topprinn útbreiddr. Smáaxinin 3blómstruð.

Krónublöðkurnar lensulíkar, 5 sinóttar, neðst samflæktar með þófgrónum hárum. Slíðrhimnan laung.

Rótin auggótt. Stráin niðrávið beygd og opt neðst rótum skjótandi, ofan uppreist, óskipt, röndótt, blöðótt, snörp. Blöðin lín, uppreist, á neðra yfirborði og á röndum snörp, hvöss, hryggjótt, samanþrykkt. Slíðrhimnan lensulík, hvöss. Topprinn lágr, marggreinótt, uppreistr, með snörpum, margskiptum, og um blómstrítímann útteygðum greinum. Smáaxinin eggmynduð, rauðgræn. Bikarblöðkurnar jafnlángar, á hryggnum snarpar; sú innuri mjóðduð, sú ytri eggmynduð, 5sinótt. Krónublöðkurnar snubbóttar.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

b. Engja Sveifgras (*P. pratensis*). Topprinn útbreiddr. Smáaxinin 4blómstruð. Krónublöðkurnar lensulíkar, 5sinóttar, samflæktar, með þófgrónum hárum. Slíðrhimnan slött, snubbótt.

Rótin auggótt með skriðandi vatnsgreinum, uppaf henni vaxa mörguppreist, á neðri enda lítið innáviðbeygd, óskipt, blöðótt, jöfn og sívöl strá. Blöðin slött, nema á hryggnum, blágræn að lit þá urtin er vaxin. Slíðrið slött, röndótt, jafnlángt blaðinu. Toppgreinarnar slöttar. Smáaxinin eggmynduð. Bikarblöðkurnar hvassar, lítið misstórar, 3sinóttar, á hryggnum snarpar. Krónubelgirnir snubbóttir, 5sinóttir, á hryggnum snarpir.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun*: bezta fóðr-urt.

- c. Flatleggjað Sveifgras (*P. compressa*).  
 Topprinn einnar síðu samanþrykkt. Krónu-  
 belgirnir strendir, við neðri endann sam-  
 flæktir með þólfgrónum hárum.

Rótin skrifðandi. Stráin niðrleggjandi við neðri  
 endann, þareptir uppstígandi, flöt ofan, blöðótt,  
 stinnu, við efri endann blaðlaus. Blöðin mjó, hvöss  
 í efri endann, snörp, blágrá. Slíðrið tvíeggjað, slètt,  
 jafnlángt blaðinu. Slíðrhimnan stutt, snubbótt.  
 Greinirnar samanþrykktar, strendar, lítið bugðóttar,  
 snarpar, fyrir blómstrunina opnar, þareptir upp-  
 reistar. Smáaxinin strikmynduð, lensulík. Bikar-  
 blöðkurnar nær því eins stórar, lvesstar, egg-  
 myndaðar, sinóttar, með 4 til 6 blómstrum. Krónu-  
 belgirnir þéttir saman, snubbóttir, eins langir og  
 bikarinn.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

- d. Eins árs Sveifgras (*P. annua*). Toppr-  
 inn útþaninn. Smáaxinin eggmynduð. Krónu-  
 urnar strjálar, 5sinóttar, sundrlausar. Stráid  
 skáhallt, samanþrykkt.

Rótin með fínum aungum. Af henni spretta  
 mörg uppstígandi, niðráviðleggjandi, samanþrykkt,  
 slètt, blöðótt, við neðri endann opt rötumskjótandi  
 og greinótt strá. Blaðslíðrið jafnlángt blaðinu,  
 slètt, samanþrykkt, hryggjað. Blöðin flöt, strikmynd-  
 uð, snubbótt, fín, stundum þversum hrukkótt. Slíðr-  
 himnan slètt, lítið nōguð. Topprinn uppreistr, einnar-  
 síðu stuttr, með tvisvar samfestum, beint útstand-  
 andi, fáum greinum. Smáaxinin glansandi, snubbótt,  
 samanþrykkt, græn og hvítflekkótt. Bikarblöðkurnar

misstórar, hryggjaðar. Krónublöðkurnar hárlausar við neðri enda, á röndum himnulíkar. Vex snemma, fólmar síðla sumars. Eins árs urt.

- e. Fjalla Sveifgras (*P. alpina*). Topprinn útbreiddur. Smáöxin með 4 blómstrum, hjartalík. Krónublöðkurnar eggmyndaðar, sigðlíkar, fráskildar við neðri endanu; neðstu slíðrhimnurnar stuttar.

Rótin lángr og stutt- augótt, hvaraf vaxa fá uppreist, opt uppstígandi, þykk, slétt, sívöl, rauð, 2hnúskótt, ofan nakin strá. Blöðin þétt saman við rótina, breið, strikmyndað, sínótt, snubbótt, á neðra borðið gráblá, á röndum snörp með stuttu slíðri, að undanteknum 2, sem sitja á stráinu. Topprinn eggmyndaður, marggreinóttur. Axstaunglarnir út- og inn- beygðir. Smáöxin flöt, samþrykkt, rauðleit, snubbótt, glansandi. Krónurnar hafa bursta, en ei þófgróin hér við neðri endann.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- f. Stranda Sveifgras (*P. Maritima*). Topprinn greinóttur, lítið samanhnepptr. Smáaxinin með 5 blómstrum. Krónurnar óglöggst 5sínóttar.

Rótin skrífandi. Stráin uppstígandi, vaxa fá af einni rót, slétt, sívöl, blöðótt. Blöðin laung, slétt, hvöss, með innáviðbeygðri rönd, slíðrandi, grá. Greinirnar á blómstrtoppinum útbreiddar eður opnar um blómstrtímann, en sjaldan beygðar á bak apr, síðan standa þær beint upp. Smáaxinin strikmyndað, slétt, með 5 blómstrum, rauðleit. Bikar-

blöðkurnar misstórar, eggmyndaðar, hvassar, hriggjaðar; sú yzta 3sinótt. Krónurnar strjálar, nærri sívalar, snubbóttar.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* góð fóðr-urt.

## 12. Vínugull (*Festuca*).

- a. Sanda Vínugull (*F. ovina*). Topprinn 1stðu samanhneppt. Krónubelgirnir sívalir, við neðri endann sléttir. Stráið 4strendt. Blöðin burstalík, snörp.

Rótin með mjóum svörtum aungum. Stráið uppreist, á fjöllum niðrleggjandi, fínt, stutt, óskipt, við neðri endann 4strendt, neðan slètt. Rótarblöðin þètt, fín, strend, hvöss, gráleit. Slóðrin röndótt, slètt; slóðrhimnan mikið stutt. Topprinn og greinirnar lítið bugðóttar, snarpar. Smáaxinin 3 til 4 blómstruð, uppreist, slètt, lensulík. Bikarblöðkurnar mjóar, hvassar, stendar, hryggjóttar, misstórar. Krónublöðkurnar samanþrykktar, við neðri endann slèttar, í broddinn snarpar; sú yzta hefir strí.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Góð fóðr-urt, einkum fyrir sauðfè.

- b. Rauður Vínugull (*F. rubra*). Topprinn einnarsíðu. Krónurnar sívalar með strí. Blöðin á yfirborðinu dúnlærð.

Rótin aungótt, í sandjörð skrífandi. Stráin niðrleggjandi, við neðri endann samanþrykkt. Blöðin strikmyndað, innáviðbeygð á röndunum, hvarfyrir þau sýnast burstalík, hvöss, stíngandi. Rótarblöðin

mjórrí eun þau fáu er sitja á stráinu. Slöðrin djúprénnótt á stráinu, laug, við rótina styttri, víðari, fínlærðari. Slöðrhinnan slött. Topprinn hefir strenda, snarpa, opna leggi. Smáaxinin eggmynduð, lensulík, rauðleit. Bikarblöðkurnar lensulíkar, hvassar, misstórar, með 5 til 6 blómstrum, á röndum og hryggnum lærðar. Krónublöðkurnar lensulíkar, samanþrykktað með stuttu strí.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* sem undangángandi.

- c. háí Víngrull (*F. elatior*). Topprinn útbreiddur, greinóttur, líur. Smáaxinin eggmynduð, lensulík, hvöss. Krónurnar sívalar, smásínóttar.

Rótin með laugum aungum, þá líu er í vatni skriðandi. Stráin uppreist, slött, röndótt, blöðótt. Blöðin breið, opin, á röndum innáviðbeygð, snörp, sínótt. Topprinn stór. Greinirnar tvísamfestar, þær efstu einfaldar með mörgum blómstrum. Bikarblöðkurnar misstórar, hryggjóttar, slöttar, sú eina 3sínótt, 6 til 8 krónur á hvörjum bikar.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Urtin er góð og mjög vel smakkandi, fyrir allan pening, utan saudfè.

- d. Stinnblaðaðr Víngrull (*F. duriuscula*)  
Topprinn lsfðu, útbreiddur. Blómstrin með strái. Stráid sívalt. Stráblöðin flöt.

Rótin hefir lánga, lítið lærða ánga. Af henni vaxa fá, uppstígrandi, við rótina slött, röndótt strá. Rótarblöðin burstalík. Stráblöðin mjó, strikmynduð,

laung. Topprinn þétt saman, stærri enn á Sauða-vínglinum. Smáaxinin flöt. Blómstrin eptir blómstrunina útspennt. Bikarblöðkurnar með 6 blómstrum, snarpar; yzta blaðkan stærst. Krónublöðkurnar snarpar á hryggnum, með stuttu strfi á broddinum.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:*

Afbragðsgóð fóðr-urt, einkum fyrir sauðfè.

- e. Manna Víngull (*F. fluitans*). Topprinn greinótt, útspennur. Smáaxinin aðþrykkt, sívöl, með mörgum blómstrum. Krónurnar snubbóttar, 7sinóttar, við neðri endann 2 sinóttar.

Rótin með laungum aungum skrífandi. Stráin skáhöll, uppstígjandi, við neðri endann rótum skjótandi, sívöl, röndótt, greinótt, slétt, blöðótt. Blöðin uppreist, jöfn á neðra, snörp á efra yfirborðið, flöt, röndótt, lángslíðrandi, þau neðstu sveimandi. Slíðrið samanþrykkt, slétt. Slíðrhimuan stutt, af-laung. Topprinn lágr. Greinirnar missettar; fyrir blómstrunina útstandandi. Smágreinirnar ogso mis-settar, þrykktar upp að greinunum, sitjandi, snubbóttar, strikmyndaðar. Bikarblöðkurnar misstórar, hvítar, himnulíkar, með grænum hrygg, snubbóttar; sú yzta blaðka randskorin.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Þessi urt er allra grasa ágætasta fóðr fyrir allslags pening. Þaraðanki er fræ hennar einhvör hin dýrmætasta grjónategund, er kallast mannagrjón;



en þar lítið vex af urt þessari á voru landi, mun nytsemi hennar ogsvo lítil.

f. Toppmyndaðr Vínugull (*F. vivipara*).

Toppriinn lsiðu, samauhuepptir. Krónubelgirnir samauhuepptir, hryggjaðir, fyrir utau strí, dúnhærðir einsog bikarinn. Stráid 4strendt. Blöðiu bnrstalík, jöfn.

Urt þessi líkist mjög Sauðavínglinum, en þekkist frá honum af bognum, óstinnum, vessameiri, slöttum, ljósgrænum blöðum, sem og af styttri og fágreinóttari toppi, breiðari bikarblöðkum, og þéttari lodnari krónubelgjum, af hvörjum þeir yztu verða að blöðum; þær innri blöðkur eru á röndum dúnhærðar.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

Nytsemi og verkun: bezta fóðr-urt.

13. Hegri (*Bromus*).

- a. Kambmyndaðr Hegri (*B. cristatus*). Smáaxiniu beggja hliða þökt, sitjandi, niðráviðþrykkt.

Rótin með hvítum aungum. Stráid uppreist við rótina, lítið lujábogið, sívalt með rauðu hnè. Blöðiu lángslíðrandi, hvöss, innklipin við slíðrið, hvaraf þau sýnast að vera eyrumlík. Slíðrhimnan stutt, afkubbuð. Axinið flatt, lensulíkt. Smáaxiniu snúin til tveggja mótsetlra hliða, og sitja þétt saman. Bikarblöðkurnar mjóar, stuttar, ljósgrænar, með fínu strí, einslángar. Krónublöðkurnar jafn stórar; sú ytri keist, með strí, sú innri himnulík.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

14. Reir (*Arundo*).

- a. Fjalla Reir (*A. epigeios*). Bikararnir með 1 blómstri, lengri enn krónan. Topprinn uppreistr. Krónurnar þaktar, þètt saman ísfðn. Blöðin lensulík.

Rótin skriðandi, laung. Stráid uppreist, við neðri endann opt greinótt, blöðótt, sívalt, slètt, undir toppinum snarpt. Blöðin breið, sínótt, á röndum snörp, á neðra borð blágræn. Slíðrið röndótt. Slíðrhimnan laung, leppótt. Topprinn útbreiddr, snarpr, dökkraudleitr. Bikarblöðkurnar mikið stærri enn krónan. Krónan hvítleit á hryggnum með stuttu strfi, sem þó stundum vantar; ytri krónublaðkan trosnuð í efri endann. Ullin á ávaxtarbotninum lengri enn blöðkurnar.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

- b. Þakreir (*A. phragmites*). Bikararnir með 5blómstrum. Topprinn linr.

Rótin skriðandi, aungótt, þètt. Stráin uppreist, rètt, óskipt, sívöl, jöfn, blöðótt, neðan liðótt, lítið hnèbogin, innanvert hvít. Blöðin lensulík, hvesst, röndótt, stinn, snörp á röndum. Slíðrið röndótt, slètt. Slíðrhimnan stutt, hærð. Topprinn útbreiddr, þètt, smágreinótt. Smáaxinin uppreist. Bikarblöðkurnar misstórar, lensulíkar, hvesstar slètthryggjaðar. Við neðri enda krónanna sitr á ávaxtarbotninum hnèppi af glansandi ullu, sem hángir við fræið. Innri blaðkan mikið minni, raudhærð.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

*Nytsemi og verkun:*

I dýrtíð hefir rót urtarinnar brúkuð verið til brauðgjörðar.

- c. Sandreir (*A. arenaria*). Bikararnir með 1 blómstri, lengri en krónan. Topprinu áxmyndaðr. Krónurnar uppreistar án strífs. Blöðin á röndum innundin, í broddinn stíngandi.

Rótin laung, útbreidd, liðótt, skrifandi. Stráid uppstígandi, með finnum röndum, stínt, sívalt slètt, blöðótt, liðótt. Blöðin stinn, slètt, næstum sívöl, bláleit, einkum á efra borðinu, hvar þau og eru með djúpum röndum; þau efstu eru hærri en stráid. Slöðrið slètt, sínótt. Slöðrhymnan laung, 3skipt, hvöss. Toppgreinarnar stuttar, aðþrykktar. Blómstrin gráleit. Bikarblöðkurnar nær því jafnstórar, hryggjaðar, samanþrykktar, hvassar; sú innvi 3sínótt. Krónublöðkurnar eins stórar, sú eina utanum hina. Fræullin stutt.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

15. Melgras (*Elymus*).

- a. Sandmelgras (*E. arenarias*). Axið uppreist, þètt. Bikararnir lensulíkir, jafulángir smáaxinimum. Blöðin með stíngandi broddi.

Rótin skrifandi, mikið útbreidd. Stráid þykkt, uppreist, sívalt, blöðótt við rótina, slètt, liðótt. Blöðin stinn, strikmyuduð, næstum eins laung og stráid, með stínum broddi, innundin á röndum og þri-renuótt á yfirborðið, ljósblágrá, hvítröndótt á

yfirborðið, sínótt á undirborðið og slètt. Slíðrið röndótt, slètt. Slíðrhymnan stutt, hrínguöbbótt, dökkleitt. Axið kvartilslángt, samanstendr af þèttum, bláleitum, samanþryktum smáaxinum, sem sitja í þörum saman. Axleggriinn hefir hærðar strendr. Bikarblöðkurnar næstum jafnlágar, einsog krónublöðkurnar, dúnhærðar, sú inari randskorin, fín-hærð á röndum. Fræð aflángt, strikmyudað.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Fræ þessarar urtar brúkast almennt í Skaptafells sýslu til brauðgerðar. Af róta tægjunum tilbúast línur og þófar. Blöðin eru hit kröptugasta föðr. Staunglarnir brúkast ogsvo, þá fræið er aftek-ið, til að þekja hús með.

#### 16. Hveiti (*Triticum*).

- a. Villihveiti (*T. repens*). Bikararnir allíkir, margsinóttir með 5 blómstrum. Krónurnar framyddar, blöðin flöt; ísl. Húsa-puntr.

Rótiin skrifðandi, liðótt; þeir fínu ágar dúnhærðir. Stráð uppreist, blöðótt, sívalt, röndótt, slètt. Blöðin opin, hvöss, frammjó, snúa meir til einuar síðu. Röndin og eins yfirborðið snörp. Slíðrið slètt, röndótt. Slíðrhymnan stutt. Axinið fjærstandandi, missett, hvört til sinnar síðu. Axleggriinn bugðótt. Bikarblöðkurnar innibýrgja 3 til 8 krónur; sú ytri krónublaðka rauðhærð.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Rót þessarar urtar er eittlvört hit ágætasta uppleysandi og þvagdrifandi meðal. Hún er því góð í landfarsóttum, lifrarveiki, gulu, vatnsýki, þvagstemmu, og harðlífi. Seyði af rótinni drekkist, svo tebollum skipti, 4sinnum dagliga. Saft tilbúin af rótinni takist 1 teskeið full 3svar dagliga. Hæraðauki er urtin sjálf allgott peningsfóðr. Svo og hefir rót urtarinnar möluð verið brúkuð í hállærum í mjölsstað.

- b. Hundahveiti (*T. Caninum*). Bikararnir uppyddir, 5sinóttir með 4 blómstrum. Krónurnar með strúm. Blöðin flöt.

Rótin auggótt, ekki skriðandi; af hennar spretta mörg uppreist, stinn, blöðótt, sívöl, slètt strá. Blöðin opin, mjó, hvöss, græn, snörp, sinótt. Slíðrið slètt. Axinið lútandi í broddinn. Bikarblöðkurnar jafnstórar með stuttu stríi, lensulíkar. Krónurnar með stríi. Stríð 2faldt lengra enn blöðkurnar.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* sæmilig fóðr-urt.

17. Hestaurt (*Holcus*).

- a. Velluktandi Hesta-urt (*H. odoratus*). Bikarbelgirnir 3blómstraðir, strílausir, livassir, 2kyujaðir. Krónubelgrinn tvímannaðr; ísl. Reisgresi.

Rótin auggótt, skríðandi. Stráið uppreist, fáblöðótt, slètt. Blöðin nærri jafnlaung stráinu, slètt. Blómstrin áviðsívöl, flöt. Bikarblöðkurnar

búkmyndaðar, innilykja opt 3 krónubelgi, hvorra  
sá í miðið er, er kveinn-eðr tvíkyns, hinir kallkyns.

*Nytsemi og verkun:*

Þessi grastegund er hjartastýrkjandi, blóð-  
hreinsandi, og þvagdrífandi. Hún er því góð fyrir  
vatnssjúka, og aðra er hafa vessafullan líkama.  
Seyði af urtiinni dreckist, svo tebollum skipti, 3svar  
dagliga.

### 3ja Orða (*Trigynia*) þríkvæntar.

#### 18. *Montia* (*Montia*).

Lækjamontia (*M. fontana*). Blöðin aflaug,  
eggmynduð, kjöttlig. Blómstrstaungullinn með 1  
blómstri. Avaxtarleggrinn niðrávið beygðr.

Rótin með sínum og laungum aungum. Staung-  
ullinn framávið liggjandi, með 2skiptum greinum,  
neðst rótum skjótandi, sívalr, stuttr, blöðótt,  
rauðleitr. Blöðin mótsett, sitjandi. Krónurnar  
hvítar, sjaldan útbreiddar. Avöxtrinn uppreistr.  
Fræin eyrumlík. Urtin öll kjöttlig, slött.

Eins árs urt, blómstrar í júlí, ágúst og september.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi getr brúkast sem portulakk.

#### 19. Königsurt (*Koenigia*).

Islenzk königsurt (*K. islandica*). Blöðin  
umsnúin, eggmynduð. Axlablöðin hymnulík, um-  
faðmandi; ísl. Nablagras.

Rótin aungótt. Staunglaruir tvískiptir, ávið-  
flatir, liðóttir, slöttir, rauðleitir. Blöðin þykk,  
snubbótt, slött, heil á röndum, næstum sitjandi.

Rótar blöðin mótsett. Staungulblöðin missett, efst þar sem staunglarnir skipta sér kransmynduð, hvar og axlablöðin sitja. Blómstrin smá, mörg saman í efri enda greinanna. Bikarinn einbladaðr, 3skiptr. Smálepparuir eggmyndaðir, lensulíkir. Fræin nakin, sitja á botni bikarsins. Örin 3, stundum líka 2.

Eins árs urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

#### 4. H ó p r.

(*Tetrandria*) fjórmannaðar.

1sta Orða (*Monogynia*) einkvæntar.

1. Hróðr-urt (*Scabiosa*). Sameiginligi bikarinn með mörgum blöðum; sjálfr bikarinn fyrir ofan sitjandi 2-faldr. Avaxtarbotninn ávalr.

2. Blóðdrekkur (*Sanguisorba*). Bikarinn undirsitjandi, ber eina yfirsitjandi krónu.

3. Maðra (*Galium*). Krónan flöt. Avöxtrinn kúlumyndaðr, þurr.

4. Götubrá (*Plantago*). Krónan sem brotin á bak aptr. Fræhúsið tvírúmað, opnar sig þversum.

5. Maríulumma (*Alchemilla*). Bikarinn áttklofinn. Fræið nakið.

6. Kornelviðr (*Cornus*). Bikarinn 4tenntr, viðvarandi, yfirsitjandi. Steinávöxtrinn 2 rúmaðr.

2. Orða (*Tetragynia*) fjórkvæntar.

7. Vatnsax (*Potamogeton*). 4 krónublöð. Enginn bikar. 4 nakin fræ.

8. Sagina (*Sagina*). 4 krónublöð. Fræhúsið einrúmað.

9. Tillie (*Tillæa*). 3 til 5 krónublöð. Mörg fræhús.

4. Hópr (*Tetrandria*) fjórmannaðar.

1sta Orða (*Monogynia*) einkvæntar.

1. Hróðrurt (*Scabiosa*).

a. Afbitin Hróðrurt (*S. succisa*). Krónurnar jafnt 4-klofnar. Staungulblöðin teunt. Blómstrhöfuðin kúlumynduð; ísl. Púkabit, Stúfa.

Rótin afbitin með hliðaraungum dökkleit. Staungullinn upprètt, sívalr, neðantil slètt, óskiptr, ofantil dúnhærðr, greinuótt. Greinarnar lángr með einu blómstri. Rótarblöðin eggmynduð, stuttleggjuð, heil á röndum, snubbótt. Staungulblöðin mótsett, umfaðmandi, fátennt, stundum heil á röndum, fínhærð, hvöss; þau efstu strikmynduð, heil á röndum. Almennuligi bikarinn hefir mjó eggmynduð blöð. Krónurnar bláleitar sýnast til samaus kúlumyndaðar. Dúpt-þræðirnir



mikið lengri en krónurnar. Fræið afláugt, renuótt, hætt í broddinum, krýnt 5 dökkleituðum burstum.

Margra ára urt; blómstrar í ágúst og septbr.

*Nytsemi og verkun:*

Blöð þessarar urtar sodin með álúni gefa grænau lit, en með þeim sodnum samanvið járn viktril má svart lita.

2. Blóðdrekkr (*Sangvisorba*).

a. Almennr Blóðdrekkr (*S. officinalis*).

Með eggmynduðu axi.

Rótin skáhöll. Staungullið uppréttr, við rótina uppstígandi, blöðótt, í broddinn sívalr, sléttr, röndótt. Greinarnar missettar. Blöðin með ójöfnum uggum lángleggjuð. Smáblöðin eggmynduð, hjartalík með svörtum nöbbum, stuttleggjuð; þau neðstu minni. Blómstrin í þéttri axi á enda greinanna, dökkrauð; efstu blómstrin opua sig fyrst. Bikarblöðkurur leusulíkar. Krónan útvortis við neðri endaun hærð, með eggmynduðum leppum.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi hefir barkandi og styrkjandi krapt. Dupt af rótinni inntekið 1 teskeið í senn, 3svar dagliga, stillir lífsýki og blóðgáng. Það stráð í skurði stillir blóðrás. Seyði af rótinni inntekið 2 matspæni í senn, 6sinnum dagliga, gjörir sömu verkun.

Með rótinni má og skinnu barka.

Urtin er héraðauki bezta peningsfóðr.

3. Maðra (*Galium*).

- a. Gula Maðra (*G. verum*). Blöðin 8 sett, strikmynduð, reunnótt, heil á röndum, snörp. Blómstrin í þöttum toppi; ísl. Gulmaðra.

Rótin aungótt, uppreist, greinótt, skrifðandi, gul; upp af henni vaxa margir stauuglar, sem eru við rótina liggjandi, síðan uppreistir, 4strendir, líðóttir millum strendanna, sívalir, flatir. Blöðin strikmynduð, lensulík, lítið á bak aptr beygð, á yfirborðið snörp. Topprinn greinóttir. Greinarnar samanhnepptar. Krónurnar gular. Duptinapparnir sem mist hafa blómstrin dökkvir. Avöxtrinn sléttr.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Þessi urt er svitadrífandi. Niðrfallssýki, og aðrar sinatægjur lækandi; hún er og barkandi og samandragandi. Te af blómstrum urtarinnar er gott svitadrífandi meðal, það sè heitt drukkið að kvöldi dags, lítil spilkoma í senn. Sama er ogsvo gott móti niðrfallssýki og öðrum sinatægjum. Urtin smá-söxuð og soðin með nýu sanda smjöri, 2 lóð af urtiuni móti 4 lóðum af smjöriinu, er bezti áburðr á bilaðar og krepptar sínar. Dupt af urtarinnar blöðum og rót er ágætt meðal til að stemma með blóð úr sárum. Rót urtarinnar litar rautt, en einkum verðr litriun falligr, sè það er lita skal áðr gult. Aðferðin er þessi: rótin tekin á vori eða hausti, malast eðr steytist til að duppti verðr, þarvið blandast síðan eins miklu af möluðu malti, og af því leggist fyrst eitt lag, andað lagið svo af ullu, eðr því er lita skal, svo aptr lag af rótar

blandinu, síðan ullarlag og s. frv.; á þetta sè hellt ánægjanligu af vatni, og litrinu sjóðist til þess að vel þykir tekið. Með blómstrum urtarinnar má gult lita, sè það, er lita skal, áðr soðið í álúns vatni.

- b. Hvíta Maðra (*G. boreale*). Blöðin lensulík, 3sinótt, slètt. Staungullinn upprètt; ísl. krossmaðra.

Rótin greinótt, skriðandi, dökkleit. Staungullinn rètt, næstum óskiptr, snarpr, 4 strendr. Blöðin snubbótt; misstór, heil á röndum, á röndinni lítið á bak aptr beygð, snörp. Blöðin við blómstrin tvímótsett, eggmyndað. Topprinn 3-skiptr, greinótt. Blómstrin hvít. Avöxtrinn með stuttum, stinnum, hvítum hárum.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:* sama sem vudangángandi.

- c. Litla Maðra (*G. palustre*). Blöðin 4 sett, umsnúið eggmyndað, misstór, snubbótt. Staunglarnir útbreiddir, í efri endann greinóttir.

Rótin aungótt, lítið skriðandi. Staunglarnir framávíðliggjandi, marggreinóttir, 4strendir, snarpir. Blöðin suörp á röndum, eru stundum 5 í neðsta krausinum. Á enda greinanna sitja 3 skýlumyndadir staunglar, sem hvör fyrir sig bera 3 lítil hvít blómstur. Duptþræðirnir gulir. Stundum hefir urtin 3 klofnar, 3 mannaðar, eðr 5 klofnar, 5 mannaðar krónur.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

3. Götubrá (*Plantago*).

- a. Slætta Götubrá (*P. major*). Blöðin eggmynduð, slétt, styttri en staunglarnir. Skaptið sívalt. Axið þétt, þakt. Mörg fræ; ísl. Græðisúra.

Rótin þykk með mörgum aungum. Blöðin heil á röndum, stundum þó lítið tenut, slétt, 7 til 9-sinótt, við rótina þétt saman, og niðr á jörðu liggjandi. Skaptið sívalt, fínhært. Axinið langt, sívalt. Dupthnapparnir purpurarauðir. Dupthyrslurnar hærðar.

Margra ára urt; blómstrar í júl og ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi er styrkjandi og samandragandi, hún brúkast því móti lífsýki, köldu, máttleysi. Seyði af blöðunum takist 2 matspænin fullir hvörn tíma. Af dupti rötariunnar takist 1 teskeið hvörn 3ja tíma. Blöð af urtiinni ný græða og þerra vel sár. Í sama máta er gott að strá dupti af rötinni á gömul og illaluktandi sár. Sagt er og að lögr blaðanna drepi orma og lækni kvefþýngslí.

Af dupti urtarinnar má tilbúa græðisálviþannig: tak nýa tólg, 2 lóð, ósaltað vel hnoðað sauðasmjör, 3 lóð, og hráa tjöru, 1 lóð; þetta bræðist saman við hægán elð, og þarí látist smátt og smátt af dupti rötariunnar, og blandist vandlaga saman; verði offþykkt má bæta í meiru smjöri.

- b. Lensublöðnuð Götubrá (*P. lanceolata*). Blöðin lensulík, odd-dregin í báða enda. Axið eggmyndað. Skaptið strendt; ísl. Selgresi, Fuglatúngur.

Rótin djúpt í jörðu, með aungum á hlíðunum. Skaptið uppreist, strendt, slétt. Blöðin rött, laung, 3-4sinótt, lítið hærð, samanhlanpandi í einu staungul, hvöss, dökkgræn. Axið eggmyndað, stutt, dökkleitt. Krónan myrkleit, hymuótt. Fræhúsið 2rúmað, hefir 2 fræ.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi hefir styrkjandi, græðandi, barkandi, mýkjandi, ormdrepandi krapt. Hún er því góð móti matar ólyst, lífsýki, blóðsótt, kvefi og ornum. Seyði af rótinni takist 2 matspænis í senn, hvörn 2an klukkutíma. Te af blöðunum drekkist 1 tebolli í senn, 4sinnum dagliga. Aðr gras þetta blómstrar, er það eitt hið hollasta kálmeti til fæðis.

c. Stranda Götubrá (*P. maritima*). Blöðin strikmynduð, næstum heil á röndum, röndótt, við neðri enda ulluð. Axið sívalt. Skaptið ogsvo sívalt; ísl. Kattartúnga.

Rótin með þykkum aungum, stundum-hreistruð. Af henni vaxa mörg fínhærð, neðan lítið bogin sköpt. Blöðin kjötlig, á neðri síðuna ávöl, á hina efri íbjúg, opt heil á röndum, stundum líka lítið tennt. Bikarinn hærðr við neðri endaun. Krónublöðin flengri enn bikarsins, íbjúg.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

*Nytsemi og verkun:* líkist þeirri undangángandi.

d. Leppblöðótt Götubrá (*P. coronopus*). Blöðin strikmynduð, uggótt, tönnótt. Skaptið sívalt.

Rótin aungótt með 1 eðr og fleirum liggjandi eðr og uppstígandi hærðum sköptum. Blöðin liggja þétt saman í stjörnumynd, niðr við jörðin hálfugguð, hærð, stundum einungis tennt. Axinið stutt með hærri blómstrum enn á undaugángandi. Blómstr-blöðin hafa brodd á efri endanum.

Eins árs urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

### 5. Maríulumma (*Alchemilla*).

#### a. Almenn Maríulumma (*A. vulgaris*).

Blöðin slipótt, ríótt, nöbbótt; ísl Maríu-stakkr.

Rótin þykk, greinótt, með laungum aungum á hliðunum. Leggriinn útbreiddr eðr uppstígandi greinótt, blöðótt, hærðr. Blöðin nærstum krínglótt, hríngslipótt með 5 stærri og 2 minni slipum, nöbbótt, fínhærð. Staungulblöðin minni, missétt, stuttleggjuð. Axblöðin innskorin, stór. Blómstrin þétt saman, gulleit. Bikarinn stundum 8, stundum 9 skiptr, annarhvor leppr stærri. Dupthuapparnir gulir.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi er styrkjandi og barkandi. Hún er því góð móti allslags blóðlátum, lífsýki og blóðsótt. Te af blöðunum dreckist, svo tebollum skipti, 4-sinnum dagliga. Blöðin smá-skorin og soðin með smjöri eru hið bezta sinasmyrsli: takist 2 lóð af urtinni móti 4 lóðum af smjörinu. Blöð urtarinnar seydd í vatni og skinn þar í lögð barka vel.

- b. Fjalla marfulumma (*A. alpina*). Blöðin flúgrótt, nöbbótt, á neðra yfirborð silkihærð; isl. Ljónsfótr, Ljónsklé, Ljónslappi, Kverkagras.

Rótin þykk, laung, með mörgum aungum. Staungullinn greinótt, þykk; stundum upprétt eður uppstigandi. Blöðin lánleggjuð, djúpt 5skipt. Flíparnir á broddinum nöbbóttir, á efri síðu dökk-grænir, á neðri hlið fagr-silfrglansandi. Blómstrleggirnir hvítgljáandi. Blómstrin minni og hvítari enn á undangangandi.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi er barkandi, styrkjandi og græðandi. Hún er því góð móti lífsýki, blóðsótt og blóðlátum; hún græðir sár og skurði. Dúpt af blöðunum, 1 teskeið 3svar dagliga inutekið, lækna lífsýki og blóðsótt á börnum. Seyði af urtinni drekkist hálf tebolli í senn, 4sinnum dagliga. Seyði þetta volgt er gott að skola hálsinn með móti kverkameinum.

6. Kornelviðr (*Cornus*).

- a. Hænsa kornelviðr (*C. Svecica*). Staungullinn 2skipt. Skýlan leggjuð. Blöðin sinótt.

Rótin greinótt, aungótt, trélik; af henni spretta 2 við neðri endann mjög nánir staunglar, uppréttir, sléttir, 4 strendir, blöðóttir, efst greinóttir, þó stundum einstakir. Blöðin mótsett, breið, eggmynduð, sitjandi, hvöss, heil á röndum, slétt, glöggt

5sinótt. Millum greinanna framkembr fínhærðr staungull, sem ber margblómstraða einfalda skýlu.

Reifarnar eru 4 hvít blöð, 2faldt stærri enn skýlan, þau eru breið og snubbótt. Blómstrin smá, 10 eður fleiri saman. Krónurnar svartrauðar. Bikarinn 4skiptr, affallandi. Avöxtrinn er eiginliga margir stein ávextir mjög návaxnir saman, er líkjast rauðum berjum, er hafa sætan smekk.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

A Færeyum eta menn berin, og munu þau ei að öllu holl, þar hjá nokkrum verka þau uppsölu.

## 2ur Orða (*Tetragynia*) fjórkvæntar.

### 7. Vatnsax (*Potamogeton*).

- a. Fljótandi Vatnsax (*P. natans*). Þau efstu blöð aflángt eggmynduð, með staunglum sveimandi.

Rótin með laungum aungum. Staunglarnir bæði niðrsokknir og fljótandi, sívalir, sléttir, greinóttir, blöðóttir, eptir því lágir sem djúpt er vatnið sem þeir vaxa í. Þau neðstu niðrsokkun blöð strikmynduð, þau efstu missett, sinótt, heil á röndum, glansandi, slétt, flöt, lánleggjuð. Blaðleggirnir flatir á efri, og ávalir á neðri síðu. Milli blaðanna og staunglanna eru strikmynduð hvöss axblöð, mislaung eður ístyttri enn blaðstaungullinn. Axleggirnir einfaldir, sívalir, þykkir, sléttir. Axið eins



og á flestum þesskyns urtum fyrir ofan vatnið. Blómstrin dökkgræn. Fræin krókótt.

Margra ára urt; blomstrar í júní og júlí.

- b. Glansandi Vatnsax (*P. lucens*). Blöðin eggmynduð, lensulík, niðrhlaupandi á blaðstaungulinn. Axinið með mörgum blómstrum samanhneppt.

Staunglarnir niðrsokknir, sívalir. Blöðin heil á röndum, bylgjótt, missett, með æðum, eru gagnsær; glansandi, þau efstu nær því mótsett, sitjandi.

Axblöðin stór, lensulík, umfangandi, hynnulík. Axið uppreist, dökkgrænt.

Margra ára urt; blomstrar í júlí.

- c. Sjáfar Vatnsax (*P. marinum*). Blöðin hárlík. Blaðstaungullinn lángur, niðrsokkinn, áviðsívalr, greinóttir. Blöðin laung, burstalík, hærð, missett, fjærstandandi.

Margra ára urt; blomstrar í júlí.

- d. Hrukkótt Vatnsax (*P. crispum*). Blöðin lensulík, missett, bylgjótt, nöbbótt.

Staungullinn slèttir, strendr, blöðóttir, strikadr, efst fljótandi. Blöðin glansandi, gagnsær, hálfumfaðmandi, snubbótt, með þykkri sín á miðjunni; opt með skorpu. Axið með fáum blómstrum. Blómstrin 4 til 8, rauðleit, strjál. Fræin flöt, hafa 1 tönn við nedri endann.

Margra ára urt; blomstrar í júlí.

- e. Hjartmyndað Vatnsax (*P. perfoliatum*).

Blöðin hjartalík, umfangandi, öll í vatni.

Staunglarnir niðrsokknir, langir, sívalir, strikadr, slèttir, missett greinóttir, þèttblöðóttir. Blöðin

missett, glansandi, gagnsær, þéttsitjandi, meyr, sinótt. Axíð uppreist, stutt, dökkt, sitr á greinum sem eru lengri enn blöðin, og þykkvari enn staungullinn, sitja á blaðhornunum. Krónublöðin strjál, iunnávið beygd; hefir alleina axblöð á efri enda staungulsins.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

- f. Litla Vatnsax (*P. pusillum*). Blöðin strikmynduð, mótsetl og missett, mjórri enn axlablöðin, opin við neðri enda. Staungullinn sívalr. Axleggirnir í blaðhornunum.

Staungullinn niðrsokkiinn með fínum rendum, missettr, greinótt. Blöðin mjó, lensulík, missett, bylgjótt, nöbbótt; þau sem undir axinu sitja eru mótsett axlablaðinu, umfaðmandi, ljósleit, mikið breiðari enn hin önnur blöðin. Axleggirnir lengri enn axíð, sem er eggmyndað með fáum blómstrum, þétt.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

- g. Flatleggjað Vatnsax (*P. compressum*). Blöðin strikmynduð, snubbótt. Staungullinn áviðflatr. Axinin með fáum blómstrum.

Staungullinn niðrsokkiinn, bugdótt, eins breiðr og blöðin, sem eru missett, snubbótt, heil á röndum, mjó, slétt, hálfumfaðmandi, lengri enn axblöðin, sem eru breiðari, snubbótt, stundum klofin. Axleggirnir eru fyrir ofan vatnið, áviðflatar, styttri enn blöðin, og hafa þá 2sett blómstur.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

k. Kambsett Vatnsax (*P. pectinatum*).

Blöðin jafusíða, nálæg, 2ggja hliða, við neðri endann slíðrandi.

Rótin skriðandi, við neðri endanu hnöllótt. Staungullinu niðrsokkinn, sívalr, missettr, þéttgreinóttir. Blöðin laung, snúa til 2ggja hliða, burstalik. Axblöðin hymnulík, klofin, samgróin við blöðin. Axleggirnir mislángir. Blómstrin sitja í skurðóttu axini, mörg saman, þau neðstu strjál.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

8. Sagína (*Sagina*).a. Frammáviðliggjandi Sagína (*S. procumbens*). Staungullinn frammáviðliggjandi, sléttir. Króunblöðin stutt.

Rótin aungótt, af heuni vaxa margir rótumskjótandi, fínir, greinóttir, liðóttir, sívalir, sléttir, blöðóttir staunglar. Blöðin samvaxin mótsett, alilik, strikmynduð, slétt, við rótina þétt. Blómstristaunglarnir einstakir, í hornunum 2faldt lengri en blaðið, með 1 blómstri. Bikarblöðin opin, snubbótt, 2faldt lengri en króunblöðin. Króunblöðin eru heil á röndum. Fræhúsið eggmyndað. Öll urtin ljósgræn.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

9. Tillie (*Tillaea*).a. Vatns-Tillie (*T. aquaticae*). Staungullinn uppréttir, 2skiptr. Blöðin strikmynduð, hvöss. Blómstrið 4skipt, sitjandi.

Rótin með finnum aungum. Staungullinn sí-

valr, slètt, með mörgum görðum, marggreinótt. Blöðin mótsett, heil á röndum, alilík, strikmynduð, þykk. Blómstrin smá, sitjandi í blaðhornunum.

Eins árs urt; blómstrar í júlí.

Nytsemi og verkun: óþekkt.

## 5. H ó p r.

(*Pentandria*) fimm-mannaðar.

1sta Orða, (*Monogynia*) einkvæntar.

1. Gleymdu mèr ei (*Myosotis*). Krónan flatkrögótt með lítið randskornum flípum. Ginið lukt með smáhvelum.

2. Lúngajurt (*Pulmonaria*). Krónan trektmynduð. Ginið nakið. Bikarinn sívalr, 5hyrdr.

3. Höggormshöfuð (*Echium*). Krónan óreglulig. Ginið nakið. Örið 2-skipt.

4. Kúreki (*Primula*). Fræhúsið einrúmað með tiklofnum munna. Krónuginið opið. Pípan sívöl. Örið kulumyndað.

5. Þríblað (*Menyanthes*). Fræhúsið einrúmað. Krónan loðin. Örið klofið.

6. Sauðamergr (*Azalea*). Fræhúsið

5rúmað. Krónan klukkumynduð. Örið snubbótt.

7. Klukka (*Campanula*). Fræhúsið 3 til 5-rúmað, við neðri endann með götum, sem gegnumborað. Krónan klukkumynduð. Örið 3klofið.

8. Sandlæðíngur (*Glaux*). Fræhúsið 5frævað fyrir ofan blómstrin. Bikarinn 4-blaðaðr, litaðr.

9. Fíóla (*Viola*). Fræhúsið 1rúmað, 3blaðkað. Bikarinn 5blaðaðr með spora. Krónan óreglulig.

2ur Orða, (*Digynia*) tvíkvæntar.

10. Entíana (*Gentiana*). Fræhúsið 1-rúmað. Krónan við neðri endann pípumynduð, fyrir utan hunángsholur.

11. Vatnsnabli (*Hydrocotyle*). Skýlan einföld. Fræin samanþrykkt.

12. Spekíngsjurt (*Ligusticum*). Krónurnar íafnvaxnar, ávaxtarsamar, með innunöðnum krónublöðum. Reifarnar hymnuliðkar. Bikarinn 5tenntr.

13. Hvönn (*Angelica*). Krónurnar

jafnvaxnar, frjóvar, með innáviðbeygðum krónublöðum. Smáskýlurnar kúlumyndaðar. Fræin hálfkúlumynduð með 3 vængjum.

14. Kúmen (*Carum*). Krónurnar jafnvaxnar, nokkrar ófrjóvar. Fræin hnúskótt, rennótt.

15. Meistarajurt (*Imperatoria*). Krónurnar jafnvaxnar, frjófsamar. Skýlan útbreidd, flöt. Ávöxtrinn samanþrykktr, röndótt.

16. Skollakál (*Egopodium*). Krónurnar jafnvaxnar, frjófsamar. Ávöxtrinn eggmyndaðr, rennótt. Örin hvöss.

17. Mjölurt (*Atriplex*) hefir undirsitjandi 2kynja og kvennblomstur, og eitt niðrþrykkt fræ.

3ja Orða, (*Trigynia*) þríkvæntar.

18. Arfi (*Alsine*). Bikarinn 5blöðótt. Krónan ogsvo 5blöðótt. 3 til 10 dupthbarar. Fræhúsið 1rúmað, 3blöðkótt.

4ða Orða, (*Tetragynia*) fjórvæntar.

19. Lifrururt (*Parnassia*). Bikarinn 5skiptr. Krónan 5blöðótt. Hunánga hyrsl-

urnar á rönðunum settar kúluberandi burstum.

5ta Orða, (*Pentagynia*) fimmkvæntar.

20. Geldingahnaþr (*Statice*). Krónan 5blöðótt. Eitt fræ, sem er íklædt trektmynduðum bikar.

21. Hör (*Linum*). Krónan 5blöðótt. Fræhúsið 10rúmað.

22. Sibbaldsurt (*Sibbaldia*). Krónan 5blöðótt. Bikarinn 10klofinn, 5 nakin fræ.

6ta Orða, (*Hexagynia*) sexkvæntar.

23. Söldög (*Drosera*). Krónan 5blöðótt. Fræhúsið 3blaðkað, með mörgum fræum.

5. Hópr (*Pentandria*) fimmmannaðar.

1sta Orða (*Monogynia*) einkvæntar.

1. Gleymdu mér ei (*Myosotis*).

a. Engja gleymdu mér ei (*M. scorpioides palustris*) með snubbóttum, slöttum bikarleppum, jafnlangum krónupípunni, lensulíkum, næstum slöttum blöðum. Staungullinn lítið greinótt; ísl. Kattarauga.

Rótin augótt, lítið skrifandi; af henni vaxa margir uppreistir, strendir, stutthærðir í broddinn, missett-greinóttir staunglar, sem stundum eru liggjandi við neðri endaun. Blöðin sitjandi, rauð-

hærð með lítilli vörtu í efri enda yfirborðsins, fínhærð. Blómstrin eru í 2skiptum, í broddinn ábakaptr-beygðum klösum, sem um blómstrunartímann verða lángir, en eru áður mjög stuttir. Bikariinn er opiinn í kringum fræin, þegar þau fullgjörast. Krónurnar heiðbláar. Ginið lokað með 5 gulum kyrtlum. 4 eggmynduð, slétt fræ.

Margra ára urt; blómstrar lengi á sumrum.

- b. Haga gleymdu mér ei (*M. sc. arvensis*) með hvestum, hærðum, stuttum bikarleppum, sem eru lengri enn krónupípau, eggmynduðum, lensulíkum, stutthærðum blöðum. Staungullinn stutthærðr, greinótt.

Urt þessi mismunar þarí frá þeirri undangangandi, að hún hefir 1 árs rót, og er minni að vexti, loðnari, minna flatþrykkt fræ, og að bikararnir eru tillokaðir utanum þau fullvöxnu fræ.

Margra ára urt; blómstrar fyrri sumars enn undang.

- c. Litla Haga gleymdu mér ei (*M. sc. collina*) mismunar frá enum fyrri við að hún er mjög lítil, með gulbláum mjög litlum blómstrum.

## 2. Lúngajurt (*Pulmonaria*).

- a. Stranda Lúngajurt (*P. maritima*). Bikariinn stuttr. Blöðin eggmynduð, slétt. Staungullinn greinótt, framáviðliggjandi; ísl. Strandarfi.

Rótin trélik, næstum toppmynduð, dökkleit. Staungullinn framáviðliggjandi, greinótt, sívalr



við rótina, strendr milli blaðanna. Blöðin þykk, heil á röndum, snubbótt, mjórri við neðri endann, hafa fagrgrábláan lit og smáar snarpar vörtur. Blómstrin eru í blöðótum klösum í enda greinanna. Krónurnar, einsog staunglarnir, stundum ljóspurpurarauðar; bláar þegar eldast. Bikarinn sléttr, skiptur í 5 leusulíka parta.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi er styrkjandi og nærandi; hún er því góð móti hjartveiki og brjóstveiki. Seyði eðr te af blöðum urtarinnar drekkist, svo te bollum skipti, 4 sinnum dagliga. Rætnar soðnar í mjólk og stappaðar eru góð fæða.

### 3. Höggormshöfuð (*Echium*).

- a. Almennt Höggormshöfuð (*E. vulgare*). Staungullinn vörtusettr, hvasshærðr. Staungulblöðin leusulík, hvasshærð. Illiðar-axiur beygð á bak apr; ísl. Kisugras.

Rótin toppilík. Staungullinn upprèttr, rèttr, sívalr. Blöðin missett, með vörtum; hvasshærð, þau, efstu, sitjandi. Rótarblöðin leggjúð. Blöðin við blómstrin strikmynduð. Axíur niðráviðbeygð fyrir blómstrunartíman, en verða eptirá lengri og uppreist. Krónurnar bláar, stórar, áðrenn þær opnast rauðar. Duptberarnir lengri en krónan, uppáviðbeygðir.

2ja ára úrt; blómstrar í júní og júlí.

### 4. Kúreki (*Primula*).

- a. Mjölvaðr Kúreki (*P. farinosa*). Blöðin

Hríngnöbbótt, slött, á neðra borðið mjölvuð.  
Krónukraginn flatr.

Rótin með laugum augum. Skaptið uppreist, sívalt, slött. Blöðin umsnúin, eggmynduð, lensulík, mjöldreifð á neðri hlið; sem betr sæst meðan skaptið ekki er fullvaxið, styttri en skaptið. Skýlan með mörgum blómstrum. Blómstrin uppreist. Krónurnar bleiklifrauðar á neðra borð. Lepparnir umsnúin, hjartmyndaðir.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

### 5. Þríblað (*Menyanthes*).

- a. Almennt þríblað (*M. trifoliata*). Blöðin 3samfest. Krónunnar yfirborð mikið loðið; isl. Hörblaðka, Kveisugras, Reiðingagras.

Rótin þykk, sívöl, liðött, framáviðliggjandi, dökk. Staungullinn fáblaðaðr, við neðri endann liggjandi, greinótt, sívalr, stuttur, uppreistr í broddinn. Blöðin lángleggjuð. Smáblöðin breidt eggmynduð, slött, teunt, hríngbugðött. Miðblaðið minnst. Blómstrblöðin eggmynduð. Blómstrin sitja í axmynduðum skúf í staungulendanum. Bikararnir eggmyndaðir, stuttir. Krónurnar hvítar, með 5 snubbóttum þykkum, á efra yfirborðið þéttfínhaerðum, og á neðra yfirborðið rauðum leppum. Dupthyrzlan laug.

Margra ára urt; blómstrar í maí og júní.

### *Nytsemi og verkun:*

Kraptr þessarar urtar er magastyrkjandi, svita og þvagleiðandi, vessa þerrandi, uppleysandi, for-

rotnun mótstandandi, ormdrepaudi. Hún er því einukar góð í skyrbjúgi, gulu, miltis og lifrarveiki, vatnssótt, íktsýki, og flestum meinum í lífinu. Blöð hennar brúkast í te, hvaraf maðr drekkir fullan tebolla í senn, 3svar dagliga. Seyði af rótinni drekkist hálfur tebolli, 3svar dagliga. Seyði af jöfnum pörtum þessarar rótar og Heimulu er hið bezta magastyrkjandi og uppleysandi meðal, gott einukar í harðlífi, gulu, miltis- og lifrar-bólgu, samt öðrum meinalætum. Af því drekkist hálfur tebolli í senn, 4sinnum dagliga.

#### 6. Sauðamergr (*Azalea*).

- a. Framáviðliggjandi Sauðamergr (*A. procumbens*). Greinarnar útbreiddar, framáviðliggjandi. Blöðin mótsett, slétt.

Bolrinn brislótt, með mörgum framáviðliggjandi, þétt-samanvöxnum, blöðóttum, sívölum greinum. Blöðin mótsett, leggjuð, heil á röndum, stinn, græn, tilbaka undin. Blaðstaunglarnir stuttir, strikaðir, rauðhærðir. Blómstrin mörg saman. Staunglarnir með 1 blómstri rauðleitir, við neðri endann blöðóttir. Krónurnar dökkrauðar, 5skiptar, klukkumyndaðar. Fræhúsið krúglótt, eggmyndað, lívast. Blómstrar snemma sumars.

*Nytsemi og verkun:*

Góð fóðr-urt fyrir sauðfê.

#### 7. Klukka (*Campanula*).

- a. Hríngblöðnuð klukka (*C. rotundifolia*). Rótarblöðin cyrumlík. Staungulblöðin strikmyndað; ísl. Bláklukka.

Rótin trèlik, aungótt. Staunglarnir uppreist-ir, sívalir, strikaðir, blöðóttir, slöttir. Blöðin slött. Rótarblöðin leggjuð, krínglótt, nýra- eðr hjartalík, nöbbótt, visna sem optast áðrenn urtin blómstrar. Staungulblöðin missett, sitjandi, strik-mynduð, heik á röndum eðr fánöbbótt. Blómstripi sitja í einum toppi á fínum leggjum, lútandi. Krónurnar fagr-dökkbláar, sjaldan hvítar. Bikar-tennurnar hvassar, alilskar, vaðusflatar, opnar.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Í lög blaða og blómstra urtariunnar má blátt lita; líka grænt með álúul.

b. Tveggja ára Klukka (*C. patula*). Blöð- in stínn. Rótarblöðin eggmynduð, lensulík.

Blómstrtopprinn opiinn. Bikarinn tenntr.

Rótin þunn, hvítleit. Staungullinn upprètt, strendr, snarpr, með tóppinýnduðum, skiptum, opnum, laungum greinum. Rótarblöðin snubbótt, leggjuð, hríngnöbbótt. Staungulblöðin sitjandi, hlálfumfaðmandi, missett, lensulík, livestock, snörp. Blómstrtopprinn opiinn; blómstrin ogsvo opiin. Bikarlepprinn hefir á hvörja hlið við neðri endann tílla tönn. Krónan blá.

2ja ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

8. Sandlæðingur (*Glaux*).

a. Almeinnur Sandlæðingur (*G. maritima*).

Blöðin eggmynduð, aflauug, þau efstu mót- sett, þau neðstu missett. Blómstrin í blað- öxlunum.

Róttin hefir lánga liðótta ánga. Staungullinn uppréttr, neðan liggjandi, skrifðandi, liðótttr, sívalr, lítið greinótttr, sléttr, þéttsettr, einkum í efri enda, með sitjandi, slöttum, heilrönduðum, á neðri yfirborð bleikum blöðum. Blómstrin sitja einstök í blaðöxlunum, og eru ljósrauð. Fræðúsið kúlumyndað.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

### 9. Fíóla (*Viola*).

a. Mýraffíóla (*V. palustris*). Staungulslaus.

Blöðin úrumlík, slétt; ísl. Fíóla.

Róttin skrifðandi, aungótt, á hennar vaxa aungvar vatnsgreinar, en 4 strendir rótstaunglar, sem á miðju hafa 2 lítil blómstrblöð. Blöðin lánleggjuð. Bláðstaunglarnir flatir á efri, og sívalir á neðri hlið. Axblöðin eggmyndað, lensulík, nöbbótt. Blómstrin lítil. Krónan ljósblá, stundum rauðleit, rennótt.

Margra ára urt; blómstrar í maí.

b. Hundaffíóla (*V. canina*). Eldri staungullinn uppstígandi, skurðótttr.

Blöðin af-laung, hjartalík. Bikararnir hvestir; ísl. Tírsffíóla.

Róttin trèlik, aungótt. Staungullinn vex fyrst framávið fyrir blómstrunina, strendr, djúpskurðótttr, greinótttr, blöðótttr, sléttr, við neðri endann framáviðliggjandi; efri hlutinn í bugðu uppstígandi. Blöðin næstum slétt, hringnöbbótt. Bláðstaunglarnir vængjaðir á röndunum. Axblöðin lensulík, nöbbótt, hærð. Blómstrstaunglarnir

spretta millum blað- og greina-hornanna, uppréttir, sléttir, 4strendir, hafa 2 alilík blómstrblöð, sem eru nálægt blómstrinnu. Krónurnar ljósbláar.

Margra ára urt; blómstrar í maji og júní.

- c. Marglituð Fíóla (*V. tricolor*). Stauugullinn strendr, útbreiddr. Blöðin aflaug, teunt, hríngnöbbótt. Axblöðin úrumlík, hálfugguð; ísl. Fíóla, þreunfugar-gras (Blóðsóley).

Rótin aungótt. Stauugullinn stuttr, þykk, greinótt, blöðótt. Blómstrstauuglarnir strendir, strikaðir án blómstrblaða. Blöðin missett, leggjuð, á röndum dúnhærð, þau neðri kransmynduð, hjartalík. Krónan opt 3lit, nefniliga rauðblá og gul. Bikarinn bláleitr, lítið lengri enn krónan.

1 árs urt; blómstrar allt sumarið ígegn.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi hefir hjartastyrkjandi krapt, en rót hennar búklhreinsandi. Te af blómstrunnnu drekkist hálftr tebolli 2svar dagliga. Dupt rótarinnar skal, eptir Willemets, geta brúkast fyrir uppsölnmeðal, frá hálfu til heils kvintúns, inntekið á fastandi maga að morgni dags.

2ur Orða (*Digynia*) tvíkvæntar.

10. Entíana (*Gentiana*).

- a. Vall-leudis Entíana (*G. campestris*). Krónan 4 til 5-skipt, áviðflöt. Ginið með skeggi. Þeir yztu bikarleppar mikið stórir; ísl. Maríuvöndr, Kveisugras.

Urtin líkist þeirri næst eptir fylgjandi, en er þó lægri, þykkri, greinóttari. Blöðin breiðari, blómstrin snubbóttari. 2 innri bikarlepparnir smærri og lensulíkir. 2 þeir ytri 2faldt stærri og eggmyndaðir.

1 árs urt; blómstrar í ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Kraptr urtarinnar er styrkjandi, appleysandi, svitadrífandi, ormdrepanði. Hún er því góð móti hjartveiki, matarólyst, vindum og uppþembíngi, móti landsfarsóttum, ornum, blóðlátum, síateigjum, köldu og iktsýki. Seyði af rótinni takist 2 matspætur í senn, 6 sinnum dagliga. Af rótinni má dropa þannig tilbúa: tak af rótinni smáskorinni 4 lóð, af sterkasta brennivíni 16 lóð, lát á flösku, er standi við yl í 6 daga, síðan hið þunna frá og geym. Af dropum þessum takist 2 teskeiðar í senn, 4sinnum dagliga. Af duppti rótarinnar takist 1 teskeið í senn, 3svar dagliga, í vatni eður mysu.

b. Mark Funtána (*G. amarella*). Krónan

4 til 5skipt, áviðflöt. Ginið með skeggi.

Bikarlepparnir jafnstórir.

Rótin með finnum anugum. Staungallinn apprètr, lítið greinótt, 4strendr, slèttr, blöðótt. Rótarblöðin mörg saman, minni en staungulblöðin, 3sinótt. Staungulblöðin mótsett, lanug, eggmyndað, 3 til 5-sinótt. Blómstrin sitja í efri enda staungulsins, og í blaðhornunum á einstökum, eður 4strendum, greinóttum staunglum. Bikarinn helfings styttri en krónan, með 5 hvössum lepp-

um, nær því jafalaungum. Krónurnar bláar með hvítleitri pípu, nöbbóttum leppum og rauðleitu skeggi.

1 árs urt; blómstrar í ágúst og september.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- c. Reifð Entíana (*G. involucrata*). Krónurnar 5klofnar, trektmyndaðar, reifaðar. Staungullinn hvast strendr. Blöðin aflángt eggmynduð; ísl. Maríuvöndr.

Rótin einföld, í broddinn aungótt. Staungullinn greinótt, við rótina blöðótt, stundum óskiptr, sléttr. Greinarnar jafnlágar staunglinum, mótsettar, uppstígandi. Blöðin sitjandi, heil á röndum, snubbótt, þétt saman við rótina, mótsett, strjál á staunglinum. Blöðin á staunglinum umfaðma blómstrstaunglana, hvörra 4 sitja í efri enda staungulsins og 2 á greinunum. Blómstrin eru í skýlu á enda staungulsins og greinanna. Stundum vaxa fáein blómstar á greinahornunum, ogsvo blaðhornunum á staunglinum. Blómstrstaunglarnir mislángir, þræðilíkir. Bikarinn 3 til 5-skiptr, með mjóum, strikmynduðum leppum, sem eru lítið styttri enn krónan. Krónan gulleit, stundum rauðleit.

1 árs urt; blómstrar síðla sumars.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- d. Snjóentíana (*G. nivalis*). Krónan 5klofin. Bikarstrendrnar jafustórar, hvassar. Staunglarnir með mörgum blómstrum; ísl. Digragras.

Rótin aungótt, veigalítil. Staungullinn upp-  
réttr, skiptr, einfaldr, 4strendr, blöðótt. Grein-



arnar upprèttar, jafnlángar staunglinum, með 1 blómstri. Blöðin mótsett, heil á röndum, slètt. Rótarblöðin umsuúð - eggmynduð, nærstandandi, snubbótt, minni enn staungulblöðin, sem eru lensulík, hvöss, strjál. Bikarinn pípumyndaðr, 5strendr, slètt. Strendrnar framstandandi. Krónan lítil, innantil fagrblá, utantil græuleit.

1 árs urt; blómstrar snemma sumars.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- e. Litla Entíana (*G. tenella*). Krónurnar 5klofnar, áviðflatar. Ginið með skeggi. Staungullinn 2skiptr. Blómstrstaunglarnir lángir. Blöðin eggmynduð, snubbótt.

Rótin þræðilík, anngótt. Staungullinn upprètt, stendr, blöðótt við rótina, og þar sem hann skiptist, slètt, 2skiptr. Blöðin þètt saman við rótina, aflaug, fá á staunglinum, mótsett, eggmynduð, neðan aðþrykkt staunglinum. Blómstrstaungullinn lengri enn sjálfir staungullinn, með 1 blómstri í efri enda staunglanna og greinanna. Bikarlepparnir eggmyndaðir, misstórir, styttri enn krónurnar. Krónurnar bláar, með lensumynduðum leppum.

1 árs urt; blómstrar í ágúst.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- f. Holkrögótt Entíana (*G. rotata*). Krónurnar 5klofnar, hjólmyndaðar. Blöðin strikmynduð, lensulík.

Rótin toppmynduð. Staungullinn upprètt, óskiptr, slètt, 4stendr, blöðótt. Blöðin mótsett, einslaug sem langt er á millum þeirra, slètt,

hriggjött neðan, en þrykkt að staunglinum, opin, í broddinn lítið beygð á bak apr. Millum blaðhornanna vaxa smá-blómstrstaunglar með 1 blómstri, stundum ogsvo smágreinir. Bikariun jafulánger krónunni, með strikmynduðum, opnum, hvössum leppum. Krónan ljósblá, með aflaungum, snubbóttum leppum og lítilli pípu. Fræhúsið nærri jafulángt krónunni, samanþrykkt, rennótt beggja hliða. Örið snubbótt.

Margra ára urt; blómstrar í ágúst.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

g. Randhærð *Entiana* (*G. ciliata*). Krónurnar 4 til 5klofnar randhærðar.

Hér á Íslandi gefast 2 tegundir urtar þessarar, nefnilega:

aa. Afkubbuð randhærð *Entiana* (*G. cil. detonsa*), með 4klofnum krónum og afkubbuðum leppum.

Rótin þræðilík, með finum aungum. Staungullinn uppréttr, við rótina greinótt, blöðótt, 4-strendr. Rótarblöðin mjó, aflaung, snubbótt. Staungulblöðin strikmynduð, hvöss, mótsett, slétt. Bikarlepparnir mislángir, 2 lensulíkir, 2 eggmyndaðir. Krónan blá. Lepparnir snubbóttir, smánöbbóttir, Dupþræðirnir hvítir. Dupthnapparnir gulir.

Margra ára urt; blómstrar síðla sumars.

bb. Nöbbótt randhærð *Entiana* (*G. cil. serrata*), með 5klofnum smánöbbóttum krónum.

Urtin líkist enni fyrri, utan að krónulepparnir eru hvassari og litrinn dökkblárri.

Margra ára urt; blómstrar síðla sumars.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

11. Vatnsnabli (*Hydrocotyle*).a. Almeunr Vatnsnabli (*H. vulgaris*).

Blöðin skjöldmynduð. Skýlurnar með 5 blómstrum.

Rótin með stuttum augum. Staungullinu skriðandi, þræðilíkr, liðótttr, sívalr, misjafn, længr. Blöðin mótsett með staunglum, slètt, glansandi, ljósgræn, einsog öll urtin, krínglótt, 2faldt hríngnöbbótt. Skýluleggirnir einstakir eðr í þörum saman í blaðhornunum, hafa 2 hymnulík blómstúr-blöð. Skýlan lítil, stundum toppskjótandi. Krónublöðin hvít eðr rauðleit, hvöss. Ávöxturinn lítið áviðflatr, hefir 3 rif hvörjumegin hliðar.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

12. Spekingsurt (*Ligusticum*).a. Skotsk Spekingsurt (*L. scoticum*).

Blöðin 2faldt-3sett.

Rótin þykk, stutt, með augum á hliðunum. Staunglarnir uppréttir, sívalir, strikaðir, slèttir, blöðóttir, ofanverdt greinaóttir. Blöðin missett. Smáblöðin skáhallt skakk-4hyrnd, innskorin, nöbbótt, hvöss, neðan heilrönduð. Blaðstaungullinn við neðri endann hymnulíkr, umfaðmandi. Skýlurnar, hvaraf einúngis 1 er á hvörjum staungli, eru uppreistar, margkvíslaðar. Geislarnir slèttir, strendir. Sameginliga reifarnar hafa 4 til 5 misstór blöð. Litlu reifarnar samanstanda af mörgum stórum strikmynduðum blöðum. Krónurnar litlar, hvítar. Ávöxturinn aflánger með uppháum, hymnulíkum rifbeinum.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi gefr góða lukt og smekk, gott meðal við magapínu, sem og að lækna og mótstanda ýmsum veikindum vorra tömdu dýra. Seyði af henni gefist inn með salti.

### 13. Hvönn (*Angelica*).

- a. Ætihvönn (*A. archangelica*). Blöðin 2-sett, ugguð, það einstaka blað 3flipað.

Rótin þykk, kjötlig. Staungullinn upprèttur, þykkur, holur, greinóttur, sívalur, slèttur, rauðleitt-strikaður. Smáblöðin eggmynduð, innskorin, djúpt hvassnöbbótt, slètt; það einstaka blað skipt í 3 leppa. Blaðstaungullinn neðan keistr, þykkur, á röndum hymnulíkr. Stóra-skýlan er kúlumynduð, samanstandur af mörgum geislum. Smá-skýlurnar þéttar, ávalar. Stóru-reifarnar hafa fá affallandi strikmynduð blöð. Minni-reifarnar samanstanda af 8 stuttum, lensulíkuðum, ábakaptrbeygðum blöðum. Krónublöðin græn, innáviðbeygð. Fræin breið, aflaug, með 3 upphækkuðum röndum.

2ja ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Urtin hefir styrkjandi, vindeyðandi, svitaleiðandi, ormdrepandi, uppleysandi, ferrottnun mótstandandi og blóðhreinsandi krapt. Hún er því góð ímóti matarólyst, vindum í þörmum, innvortis tökum, gulu, hósta, skyrbjúgi, stöðnuðu tíðablóði, og mótstandur drepsóttum. Fræið smásteitt, brúkað til dropa, sem tilbúast þannig: tak hvanna-

fræ marið og steitt 2 loð, sterkasta brennivín 8 lóð, lát á flösku, sem standi við yl í viku vel tillokuð; þaraf takist hálft spónblað í seinn, 4 sinnum dagliga. Af rótinni má og tilbúa seyði og dropa. Til seyðsins takist 2 lóð af rótinni, móti 8 eðr 12 af vatni, sjóðist litla stund í luktum katli, hvarf það standi til kallt er orðið, þá sýist hið þunna frá. Af seyðinu takist 2 matspænnir hvorn annan klukkutíma. Til dropanna takist 4 lóð af rótinni smáttskoriinni, móti 8 lóðum brennivíns, tilbúist síðan allteins og brúðist sem droparnir af fræinu. Það er haldið bezta meðal að tryggja þurkaða hvannarót, þá næmar sóttir gánga. Til manneidis má rótina brúka, er hún munntöm fæða með fiski og nýu smjöri; hún er og bezta sælgæti bituð og selltuð með sykri.

b. Snóka hvönn (*A. sylvestris*). Smáblöðin jafnstór, eggmynduð, nöbbótt; ísl. Geitla.

Rótin toppmynduð, greinótt. Staungullinn uppréttr, bládöggvaðr, sívalr, sléttr, strikaðr, greinótttr, blöðótttr. Blöðin 2sett, ugguð, missett, jafnult staunglinum. Smáblöðin sundrskild, hvöss, nöbbótt, dúnhærð á efra borð, smærri enn á undangangandi. Blaðstaunglarnir breiðir, neðan umfaðmandi, keistir. Skýluleggirnir sívalir, strikaðir, fínhærðir. Skýlurnar hálfkúlumyndaðar, marggeislaðar. Geislarnir dúnhærðir. Stóru-reifarnar vanta optast, eða þær samanstanda af fáum affallandi blöðum. Smá-reifarnar strikmyndaðar, hárunlíkar, margar. Krónublöðin rauðleit, hvít, innáviðbeygð. Ávöxturinn aflánger með vængjaðri rönd, sem er

með upphækkuðum reunum, minni enn á undangangandi.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

#### 14. Kúmen (*Carum*).

- a. Algengt Kúmen (*C. carvi*). Staungullinn greinótt. Bláslíðrin keist; eingar smáreifar.

Rótin toppmynduð. Staungullinn upprètt, greinótt, strendr, slètt, strikaðr. Blöðin 2sett, ugguð, slètt. Smáblöðin innskorin, með stuttum strikmynduðum leppum. Á efri enda staungulsins og greinanna eru margar reifar. Stóru-reifarnar, sem stundum vanta, hafa 2 til 3 blöð. Krónublöðin hvít, hjartalík, innáviðbeygð. Það yzta krónublað stærst. Fræin aflaung, lítil, hnúskótt, með 5 upphækkuðum strikum; dökk þá fullvaxin eru.

2ja ára urt; blómstrar í júní og júlí.

#### *Nytsemi og verkun:*

Þessi urt, einkum fræ hennar, er uppleysandi, vindeyðandi. Það eykr mjólk í konubrjóstum, er gott móti gulu, lifrabólgu og óstyrk magans. Te af fræinu drekkist, svo tebollum skipti. Dropa má af fræinu tilbúa á þennan hátt: tak kúmensfræ steitt 4 lóð, sterkasta brennivín 12 lóð, lát standa við yl í 4 daga, sýa hið þunna frá og geym á flösku. Hæraf takist hálft spónblað í senn, 3svar dagliga. Fræið mjöliblandað, gefr brauði og súpum þægiligan smekk.

15. Meistarajurt (*Imperatoria*).a. Bjarga Meistarajurt (*I. ostruthium*).

Efstu blöðin mótsett. Smáblöðin 3skipt.

Rótin hnöllótt; ísl. Sæhvönn.

Staugullinn uppréttr, sívalr, sléttr, strikaðr, skiptr ofan. Blöðin 2faldr-3sett, missett, við rótina lánleggjuð, efst á stannglinum sitjandi, mótsett. Smáblöðin eggmyðuð, nöbbótt, iunskorin. Skýluleggirnir skurðóttir. Skýlnar þéttar. Smáreifarnar samaustanda af litlum, hárilíkum, fáum, fljótt affallandi blöðum. Krónublöðin hvít, með innáviðbeygðum broddi. Fræin breið í broddinn, og við neðri enda randskorin, slétt, og hafa á hryggnum 3 til 4 upphækkandi strik. Stundum hefir stóra-skýlan fáblöðóttar reifar.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi er blóðhreinandi, svitadrífandi, vindeydandi, styrkjandi, forrotun mótistandandi. Hún er því góð móti vindum í maganum, og matarólyst. Hún leysir tíðir kvenna, lækna niðrfalls-sótt og aðrar sinatægjur, líka innantökur og vatnssótt. Seyði af rótinni takist 2 matspænis í senn, 6sinnum dagliga. Te af blöðunum drekkist, svo tebollum skipti, 3svar dagliga. Af rótinni má dropa tilbúa á þennan hátt: tak af rótinni smáskorinni 3 lóð, sterkasta brennivíns 15 lóð, blanda saman og lát standa við yl nokkra daga, sýa síðan hið þunna frá og geym. Af dropum þessum takist 80 í senn, 4 sinnum dagliga.

16. Skollakál (*Ægopodium*).

- a. Skurfótt Skollakál (*Æ. podagraria*).  
Rótarblöðin tvöföld. Staungulblöðin einföld, 3hópsett; ísl. Geitnanjóli.

Rótin skriðandi, greinótt. Staungullinn upprètt, skurðótt, sívalr, liðótt. Blaðstaunglaruif lágir, liðóttir. Smáblöðin á staunglum við rótina, annaðhvort misstór, eðr lið minna er samgróið við endablaðið og 2skipt. Skýlurnar í efri enda staungulsins margkvíslaðar. Krónurnar hvítar, ólíkar, misjafnar. Ávöxturinn sporöskjumyndaðr, með 3 rifum beggja hliða.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

17. Mjölurt (*Atriplex*).

- a. Garða Mjölurt (*A. hortensis*). Staungullinn upprètt; blöðin mynda sem þríhyrning; ísl. Garðasól.

Staungullinn upprètt, strendr, skurðótt, grænn, slètt. Blöðin aflaug, mjölvuð, missett, leggjuð, bleikgræn, heilrönduð eðr fátenuð. Klasarnir á greina-endumum, ofantil í blaðhornunum.

1 árs urt; blómstrar í ágúst.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- b. Leppótt Mjölurt (*A. laciniata*). Staungullinn útbreiddr. Blöðin næstum múrarspaðamynduð, bugðótt, tennt, á neðra borði silfrlituð.

Rótin greinuótt, með laugum aungum. Staungullinn framáviðliggjandi, útbreiddr, sívalr, hvít-hreystrótt. Greinarnar við neðri endann mótsettar,



ábakaptrbeygðar, spretta útaf einum hnúsk á staunglinum. Blöðin missett, leggjuf; við neðri endann stundum mótsett, sitjandi, lítið niðrbeygð á efri endann, silfrglansandi, hreystrótt á neðra borði, snubbótt bæði ofan og á tönnunum. Tönnurnar eru stundum stórar, stundum líka sem væru leppar. Þau 2kynja blómstrin vaxa í stuttu axini. Kvenubikararnir einfaldir í blaðöxlunum. Fræin samræðrykkt, innilukt í stórum, skakkferhyrndum, tenntum bikar.

1 árs urt; blómstrar í ágúst.

*Nytsemi og verkun:* góð fóðr-urt.

- c. *Svína Mjölurt (A. patula)*. Greinarnar útskagandi, neðri blöðin spjótmunduð, þau efri lensulík, næstum heil á röndum. Frjófu bikarblöðin skakk-ferhyrnd, tenut ofaná hryggnum.

Rótin með laungum augum. Staungullinn upp-réttr, framáviðliggjandi, stuttr, greinótt. Greinarnar standa nær því beint út frá hölnum, síðan bogið uppstigandi, þær neðstu mótsettar, þykkari neðan, lángr; þær efstu styttri, missettar, minna útstandandi. Neðstu blöðin teunt. Miðblöðin hafa neðantil stóra tönn á báðum hliðum. Þau efstu lensulík, heil á röndum, þunn, laung, vessamikil. Blómstrin sitja í efstu blaðhornunum á lithum, legglansum, aflaugum axinum. Bikarblöðin skakk-ferhyrnd, krúglótt. Fræið áviðflatt, sporöskjumyndað, dökkglansandi.

1 árs urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

3ja Orða (*Trigynia*): Þríkvæntar.18. Arfi (*Alsine*).

- a. Almeður arfi (*A. media*). Blöðin eggmynduð, hjartalík. Staungullinu framáviðliggjandi með hársettum strikum á vixl.

Rótin augótt. Staungullinu greinótt, liðótt, meýrr, sívalr, slètt. Millum blaðanna er hvítt strik, er myndast af hvítum hárum, svoléiðis, að neðri eudinn byrjar í axlinni milli blaðsius og staungulsins, og endar í þeirri efstu milli þeirra fyrir ofan verandi blaða. Blöðin mótsett, þöriu missett, stuttleggjuð, heil á röndum, slètt, með þykkri síu á miðjunni, rauðhærð. Staungullinn hærðr, efstu blöðinu sitjandi. Blómstrstaunglarnir í efri euda staungulsins og í blaðhorunum, einstakir, með 1 blómstri, hærðir á aðra hlið. Sá sem ber lið opna blómstr er lengstr. Krónublöðin hvít, djúpskipt. Bikarinn hærðr, lengri enn krónan. Fræhúsið eggmyndað, með ótenntum munna. Fræin misjöfn.

1 árs urt; blómstrar allt sumarið út.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi er kælandi, mýkjandi og græðandi. Seyði af arfa mýkir bólgu og þrota. Arfinn nýr, heittr í potti, gjörir hið sama. Nýtekinn arfi, kaldr viðlagðr, stillir og kælir hitaverk og bólgu. Mýkjandi grautr úr arfa gjörir vel út meinsemdir. Seyði af arfa nýum, hvaraf drekkist 1 peli í sennu, er vallgáng mýkjandi, yðrabólgu uppleysandi, og græðir sár í lúngum, samt örfar matarlyst.

4ða-Orða (*Tetragynia*) fjórvæntar.19. Lifrururt (*Parnassia*).

- a. Hvít Lifrururt (*P. palustris*). Blöðin hjartalík. Staungullinn í blaðaðr, strendr; ísl. Mýra Sóley.

Rótin augótt. Staungullinn eðr skaptið upp-  
rètt, snúið, slètt, með 1 blómstri. Blöðin slètt,  
heil á röndum, sinótt. Rótarblöðin mörg saman,  
leggjótt. Staungulblöðin sitjandi. Blómstrið stórt  
eptir urtiinni, í enda staungulsins. Krónublöðin  
hjartalík, hol, lengri enn bikarinn, hvít, með gagn-  
særum, rauðleitum æðum. Bicarlepparnir lensu-  
líkir, misstórir. Hunágsberarnir mótsettir krónu-  
blöðunum, kjötlígir, hjartalíkir, skiptir í 8 til 10  
þræði, sem hafa gult höfuð á endanum. Duptber-  
arnir, sem eru mótsettir bicarleppunum, og í milli  
hunágsberanna, hallast hvör eptir öðrum ofan-  
yfir dupthyrzlnar. Dupthnapparnir hjartmynd-  
aðir. Örin sitja á því eggmyndaða ávaxtarhúsi,  
án þess þau hafi stýlinn.

Margra ára urt; blómstrar í ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi er uppleysandi, mýkjandi, skaðlig  
fyrir augu. Te af blöðunum drekkist, svo tebolli-  
um skipti, og er gott móti lifrar- og miltisbólgu,  
samt kvefi og brjóstþýngslum.

5ta Orða (*Pentagynia*) fimkvæntar.20. Geldíngahnappur (*Statice*).

- a. Algengr Geldíngahnappur (*S. ar-  
meria*). Skaptið óskipt. Blómstrin mynda

eitt höfuð. Blöðin strikmyndað; ísl. Gullintoppa.

Rótin trèlik, með mörgum þéttum aungum. Af henni yxa 1 eðr fleiri upprétt, sívöl, óskipt, hærð, smástrikótt sköpt. Blöðin við rótina þétt, slétt, röndótt. Blómstrin sitja í einu höfði saman á skaptendanum, þétt saman, ljósrauð, hafa neðan margblaðaðar, þaktar, harðhymuóttar reifar. Krónublöðin umsnúð-hjartalík, með nöglum. Bikarinn hymnuískr, með 5 randum strikum. Duptberarnir styttri en krónan. Dupthyrslurnar hærðar við neðri endann.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

## 21. Hör (*Linum*).

### a. Viltvaxandi Hör (*L. catharticum*).

Blöðin mótsett, umsnúð-eggmynduð, lensulík. Staungullinn ofanvert 2skipt. Krónublöðin hvöss.

Rótin þræðilík. Staunglarnir uppréttir, sléttir, sívalir, neðantil óskiptir, blöðóttir. Blöðin snubbótt, slétt, heil á röndum, við rótina minni og þéttari saman. Blómstrin hallast áðr þau sprínga út. Bikarblöðin nöbbótt. Krónublöðin hvít. Duptberarnir samauvaxnir neðantil. Öriu höfðilík.

1 árs urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Urtin er búkhreinsandi og þvagleiðandi. Hún er því góð í vatnssýki, gulu, þvagteppu. Seyði af

rótiinni drekkist, svo te bollum skipti, 2svar dagliga. Sè urtiu soðin með járnviktríli lítar hún svari.

## 22. Sibbaldsurt (*Sibbaldia*).

a. Framáviðliggjandi Sibbaldsurt (*S. procumbens*). Blöðin fleygmynduð, 3tennt.

Rótin þykk, framáviðliggjandi, trélik. Af henni spretta margir stuttir, blöðóttir staunglar. Blöðin 3sett, lánleggjuð. Smáblöðin umsnúð-fleygmynduð, hærð, hafa á efri enda 3 stórar tenur. 2 litlu axlablöðin samgróin við neðri enda blaðstaungulsins. Blómstrin eru í hálfskýlu, lítil, gulleit. Bikarlepparnir hærðir, misstórir, viðvarandi. Krónublöðin umsnúð-eggmynduð. Duptberarnir styttri enu krónublöðin. Fræin eggmynduð; ísl. Fjalla-smári.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

Gta Orða (*Hexagynia*) sexkvæntar.

## 23. Sóldögg (*Drosera*).

a. Hríngblöðótt Sóldögg (*D. rotundifolia*). Blöðin eru við rótina hríngmynduð. Skaptið ber klasa.

Rótin annugótt; af henni vaxa mörg upprétt, óskipt, sívöl, slétt, dökkrauð sköpt. Blöðin sitja í skýlu við rótina, þétt útbreidd á jörðu; þau eru leggjuð, hol, heil á röndum. Á efra flatveg og svo á röndum rauðhærð, á hárbroddunum sitr ein dekkri kúla. Blómstrin sitja í innáviðbeygðum klasa á enda skaptisins. Bikarlepparnir aflángir,

snubbóttir, dökkir, uppreistir. Krónublöðin um-  
snúið-eggmynduð, hvít. Örin kylfumynduð. Fræ-  
húsið afláugt. Fræin og svo laung.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Með urt þessari soðinni í mjólk má burtaka  
freknur, sè húðin þarí þvegin. Urtin ný núin á  
hringorma eyðir þeim.

b. Lángblöðótt Söldögg (*D. longifolia*).

Blöðin við rótina umsnúið - eggmynduð.

Skaptið ber klasa.

Að undanskildri blaðanna lögun, líkist urt  
þessi að öllu einni undangangandi.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:* öll hin sama.

## 6. H ó p r.

(*Hexandria*) sexmannaðar.

1sta Orða, (*Monogynia*) einkvæntar.

1. Beinbrjótr (*Anthericum*). Krónan  
6blöðótt, opin. Fræhúsið eggmyndað.

2. Vorblómi (*Convallaria*). Krónan  
6klofin Berið 3rúmað. Örið 3strendt.

3. Sef (*Juncus*). Bikarinn 6blöðóttur,  
undirsitjandi. Fræhúsið 3blaðkað, marg-  
frævað.

2ur Orða, (*Trigynia*) þríkvæntar.

4. Skreppa (*Rumex*). Bikarinn 3-blöðótt. 3 krónublöð. 1 fræ, með 3 flatvegum.

5. Bjarnarbroddur (*Nartheticum*). Bikarinn 3skiptr. 6 krónublöð. 3 margfrævuð fræhús.

6. Sældíngur (*Triglochín*). Bikarinn 3-blöðótt. 3 krónublöð. Fræhúsið opnar sig við neðri endann.

6ti Hópr (*Hexandria*) sexmannaðar.

1sta Orða (*Monogynia*) einkvæntar.

1. Beinbrjótr (*Anthericum*).

a. Greinóttur Beinbrjótr (*A. ramosum*). Blöðin rennótt. Skaptið greinótt. Krónurnar flatar. Dupthyrzlan útstandandi; ísl. Íglagras, Síkisgras.

Rótin með litlum görðum, hvítum aungum. Skaptið upprétt, rött, sívalt, strikað slètt, í broddinu greinótt. Blöðin öll við rótina, strikmyndað, slètt, á efra borð rennótt, hryggjótt á neðra borð. Blómstrin sitja á staungulbroddinum, ogsvo greinanna í útbreiddum klösum; við neðri enda sérhvörrar greinar er eitt blómstrblað, sem líkist enim öðrum blöðum, en er þó minna. Krónublöðin hvít, þau 3 yztu stærri; þau 3 innri hafa

strik í miðju og á toppinum grænan blett. Duptberarnir mislángir. Ávaxtarbotniinn 3-hyrndr.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

## 2. Vorblómi (*Convallaria*).

### a. Tvíblöðótt Vorblómi (*C. bifolia*).

Blöðin hjartalík, stuttleggjuð, króuan 4skipt, 4mönnuð.

Rótin smá-aungótt. Staungullinn uppréttr, strendr, 2blöðótt, lítið boginn við neðsta blaðið. Blöðin missett, hvöss, sinótt, slétt á efra, en lítið hærð á neðra yfirborð. Blómstrin sitja í eggmynduðum sléttum klasa í efri enda staungulsins. Blómstrstaunglarnir hvítir. Krónurnar hvítar, 4-klofnar. Lepparnir beygðir á bak aftir; við neðri enda blómstrstaunglanna eru lítil, síná, tennt blómstrblöð. Duptberarnir lángir, eptir krónuunnar stærð. Örið snubbótt. Berið kúlumyndað, fyrir frjófguartímann grænglansandi, með rauðum deplum, en rautt, þá fullþróast.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

## 3. Sef (*Juncus*).

### a. Burstablöðótt Sef (*J. squarrosus*). Strá-ið nakið. Blöðin burstalík; einn samansetttr lmykilmyndaðr toppr á efri enda strásins.

Rótin með þéttum aungum; af henni vaxa mörg strá og fjöldi þéttsamanverandi blaða. Stráin uppreist, slétt, sívöl, lítið innáviðbeygð. Blöðin burstalík, stinn, röndótt á yfirborðið, slétt, innáviðbeygð, nær því hálfu styttri enn stráið. Blómstr-



topprinn greinóttur, neðan slíðraðr í einu blaði, sem er styttra en topprinn. Bikarblöðin dökk, á röndum stinnu- og hvítlærð. Fræhúsið snubbótt, umsuúð-eggmyndað.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

- b. Útbreiddt Sef (*J. effusus*). Stráið nakið, rött, hefir útbreiddan, margtvísettan hlíð-artopp. Fræið snubbótt.

Rótin þykk, vatnslöt. Af heani vaxa mörg upprött, sívöl, útvortis með hvítum mergi, fín, strikuð, hvöss, slètt strá, sem neðantil eru í hymnulíkum, snubbóttum, dökkum slíðrum. Blöðin stór, og eru eginuliga ófrjófsöm strá. Krónublöðin hvest, gulgræn. Fræhúsið umsuúð-eggmyndað, snubbótt.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

- c. Þríklofið Sef (*J. trifidus*). Stráið nakið, hefir 3 blómstur og 3 blöð á toppinum.

Rótin aungótt. Stráin þètt saman, rött, þunn, strikuð, umkríngð neðan af slíðrandi, ljósleitu hreistri. Í toppi þeirra vaxa 3 blöð, millum hvörra venjuliga sitja 3 blómstur, sem eru ryðlituð sitjandi. Bikarblöðin eggmynduð. Fræhúsið hvast.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

- d. Liðótt Sef (*J. articulatus*). Blöðin görðótt, liðótt, lítið flatþrykkt. Blómstrtopp-greinarar bera þètt blómstur. Bikarblöðin jafustór, lítið snubbótt.

Rótin þètt, aungótt, skríðandi. Stráið neðan niðráviðliggjandi, ofan uppreist, sívalt, slètt, blöðótt, við rótina sett alilíku hreistri. Blöðin missett,

slíðrandi, hvöss, hol, með þéttum liðum, sem hægara finuast enn sjást, og sem innauvert gjöra eins mörg millibil. Blómstrtopprinn á strásendanum. Greinuarnar 2skiptar, og hafa á endanum og við millibilin 3 til 4 legglau blómstur. Við neðri enda toppsins er eitt reifarmyndað blað, nærri jafnlangt toppinum, og við millibilin lítil, hymnulík blöð. Bikarblöðin lensulík, dökk. Fræhúsið aflángt, 3strent, hvast.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

- e. *Hnöllótt Sef (J. bulbosus)*. Blöðin strikmynduð, rennótt. Stráið við neðri endann blöðótt. Blómstrtopprinn skúfmyndaðr. Fræhúsið snubbótt.

Rótin þykk, skríðandi, lítið hnöllótt með hliðar anngum. Stráin þétt saman, upprétt, óskipt, lítið flatþrykkt, strikuð, slétt, neðan blöðótt, ofan næstum blaðlaus. Blöðin styttri en stráin, slíðrandi, hvöss. Blómstrtopprinn á enda strásins, marg-blómstraðr, neðan slíðraðr í litlu blaði. Bikarblöðin aflaug, snubbótt, misstór, græn, dökk, hymnulík á röndnum. Fræhúsið umsnúið-eggmyndað, snubbótt, með brodd á endanum, lengra enn bikarinn, ljósdökkt.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

- f. *Vatna-Sef (J. bufonius)*. Blöðin strikmynduð, rennótt. Stráið klasalíkt, 2skipt. Blómstrin einstök.

Rótið aungótt, á henni vaxa hneppi stráa, sem eru upprétt, veikari enn á undangangandi, sívöl, slétt, bugðótt, með finnum rennum, í broddinu

2skipt, blöðótt. Blöðin strikmynduð, ei svo stinn sem á undangangandi, hvöss, mikið styttri enn stráíð. Blaðslíðrin jafnlaung blaðinn. Blómstrin sitjandi eður stuttleggjuð, spretta í hornunum þar sem stráíð skiptist, eður þar á hliðunum. Bikarblöðin jafnstór, lensulík, hvöss á röndum, hvít-hymnótt. Fræhúsið styttra enn bikarinn, mjórri enn á undangangandi. Hefir ljósgrænan lit.

1 árs urt; blómstrar í júní og júlí.

- g. Tríblómstrað Sef (*J. biglumis*). Blöðin flöt. Blómstrhöfuðið blöðótt neðan, hefir 2 blómstur, og er á aðra síðu strás-endans.

Rótin aungótt. Stráið óskipt, upprétt, einblöðótt, sívalt, strikað, jafndigr, bogið. Blöðin strikmynduð, alilík, snubbótt, styttri enn stráíð. Bláðið við blómstrin snubbótt, leingra enn hin. Blómstrin 2, hvort uppaf öðru. Bikarblöðin dökkbrún, lensulík. Þan 3 að utanverðu hafa á miðju innri hliðarinnar grænt strik. Fræhúsið umsnúið-eggmyndað, snubbótt með stuttum broddi; leingra enn bikarinn.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

- h. Þríblómstrað Sef (*J. triglumis*). Blöðin flöt. Blómstrhöfuðið uppreist með 3 blómstrum í broddi strásins.

Þessi er stærri enn undangangandi, sem hún er mjög lík. Rótin aungótt. Stráin fá saman, næstum nakin, upprétt, þræðilík, slétt, sívöl, neðantil blöðótt. Blöðin strikmynduð, alilík, hvöss, slíðrandi við neðri nedann. Slíðrin strikuð. Blöðin við blómstrin eggmynduð, snubbótt, hol, styttri

enn blómstrin; þau yztu stærst. Bikarblöðin aflaug, lensulík. Fræhúsið aflángt, snubbótt, leiugra enn bikariun.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

- i. Hært Sef (*J. pilosus*). Blöðin flöt, hærð. Hálfskýlan einföld. Blómstrstaunglarunir einblómstraðir, látandi. Bikarblöðin eggmynduð, hvöss, styttri enn fræhúsið.

Rótin aungótt, lítið skriðandi. Stráin upp-  
rètt, óskipt, sívöl, blöðótt. Blöðin strikmynduð,  
lensulík, hvöss, sinótt, á röndum með laungum,  
fínum, hvítum hárum. Þau neðstu jafnlaung strá-  
inu. Staungulblöðin missett, slíðrandi, innantil  
og á röndunum rauðleit. Blómstrtoppriun hálf-  
skýlumyndaðr, í efri enda strásius með útstand-  
andi ábakaptrbeygðum greinum. Á sérhvörjum  
staungli er eitt blómstr, sem við neðri endann  
hefir 2 lítil, hvöss blöð. Bikarblöðin lensulík,  
hvöss, dökk, með gulri rönd. Dupthnapparunir  
stórir, gular. Fræhúsið snubbótt, gult.

Margra ára urt; blómstrar í maí og júní.

- k. Vallar-Sef (*J. campestris*). Blöðin flöt,  
hærð. Axinin skýlumynduð, leggjuð á enda  
strásins, það í miðju sitjandi. Fræhúsin  
snubbótt.

Rótin skriðandi, dökk, aungótt. Stráið upp-  
rètt, sívalt. Blöðin strikmynduð, hvöss, á rönd-  
um hærð. Fyrir neðan axinin eru 2 slíðrandi,  
mislauug blöð. Það neðra og leiugra nær jafnhátt  
axinu. Axinin, sem eru eggmynduð, snubbótt,  
eru optast leggjuð, fyrir blómstrunina uppreist,

eptirá lútandi. Í miðjunni er legglaust axin. Við enda hvörs blómstrs eru 3 til 4 í broddinn trösnuð blómstrblöð. Bikarblöðin lensulík, hvöss, leingri enn fræhúsið. Dúptberarnir styttri enn á undangangandi. Fræhúsið umsnúið-eggmyndað, hefir 3 fræ.

Margra ára urt; blómstrar í maí og júní.

1. Axblómstrað Sef (*J. spicatus*). Blöðin flöt. Axið klasamyndað, lútandi, neðantil samsett. Fræhúsin hvöss.

Rótin með þettum áungum. Stráið upprètt, blöðótt, sívalt, fínt, slètt. Blöðin mjó, strikmynduð, hvöss, missett, beygð ábakaptr, á röndum fínhærð, slíðrandi. Á enda strásins er aflángt, snubbótt, dökkryðlitað axini, sem neðst er með millibili. Blómstrblöðin ranðhærð, trösnuð, bleik. Bikarblöðin lensulík, hvöss. Fræhúsið snubbótt.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

- m. Finnmerkr-Sef (*J. arcticus*). Stráið rètt, nakið, hefir blómstrskýlu á hliðinni. Blómstrin án smástaungla.

Rótin skriðandi, liðótt, aungótt. Stráin saman, blaðlaus, sívöl, strikuð, slètt, stíngandi, hvöss í broddinn, neðan slíðruð af mörgum ljósdökkum, snubbóttum hreystrum. Blómstrin sitja við broddinn á stráinu, í þetti, stuttri, höfnðmyndaðri skýlu, við hvörrar greinir margar legglausar krónur eru fastar. Krónublöðin alilík, rennótt, og hafa dökkgljáandi lit. Við neðri enda hvörrar krónu er eggmyndað-nunfaðmandi hreystr, ljósdökkt að lit. Dúptberarnir styttri enn dúpthyrzlan, jafnlángir

krónublöðnum. Fræhúsið umsnúið-eggmyndað, sklofið að ofanverðu.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun allra þessara sefurta: óþekkt.*

## 2ar Orða (*Trigynia*) Þríkvæntar.

### 4. Skreppa (*Rumex*).

- a. Rauð-Skreppa (*R. acutus*). Fræblöðkurnar afláugar, lítið tenutar, hafa 1 korn á sér. Blöðin eggmyndað-aflanug, hvest. Blómstrklasarnir blöðóttir; ísl. Heimilis-njóli, Heimula, Fardagakál.

Rótin toppmyndað, greinótt. Staugullinn uppréttur, greinóttur, strendur, skurðóttur, sléttur, holur. Greinarnar þunnar, opnar, blöðóttar. Blöðin hjartmyndað, lensulík, á rándum krúsuð, hvest, leggjuð. Blómstrin í laugum klösum, skipt í hliðarkransa, sem hvörr hefir 1 blað neðantil. Krónublöðin fyrst heil á rándum, eður lítið nölhótt, eptir blómstrunina teunt. Á sérhvörju, eður í hið minnsta á 2, sitr rautt korn.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi hefir barkandi, samandragandi, styrkjandi krapt. Hún leiðir vallgang, uppleysir þykkva vessa, er hlóðhreinsandi og farrotinn mótstandandi. Hún brúkast því móti lífsýki, blóðsótt, gulu, harðlífi, lifrabólgu, vatussýki, kláða og úthrotum, skyrbjúgi og holdsveiki. Af blöðunum nýum búlst seyði til; þaraf drekki maður 1 tekholla 3svar dagliga. Í seyði þessu er gott að þvo allslags út-

brot hörundsins. Sè fræið þurkað, og síðan þaraf seyði tilbúið, af því takist 2 matspæninir í senn 4 sinnum dagliga. Dupt' af rótinni brúgist 1 teskeið full, hvörn 3ja tíma. Af rótarinnar seyði er þannig þúrgernuðal tilbúið: tak af rótarseyðinu 1 eðr  $2\frac{1}{2}$  pela, af hvítu smásteyttu salti 1 lóð, uppleys saltið í seyðinu volgu, og tak inn á fastandi maga. Smyrsl móti kláða og útbrotum má þannig tilbúa: tak af duptri rótarinnar 5 lóð, smásteyttaun brennistein 1 lóð, ósaltað vel afvatnað nýtt smjör, sem sè brædt, 10 lóð, blanda og hnoða þetta vel saman.

Blöð og rót urtarinnar soðin með vatni og álúni gefa gulan lit, sem verður enn fegri, sè því strax eptir blekk't í staðið þvag. Tak af blöðunum smáskornum 4 til 6 hnefa, 2 lóð af álúni, 2 potta vatns og 1 mörk af þvagi, og sjóð þarí sem gult skal litast til þess vel er tekið. Blöð urtarinnar eru hollasta kálmeti í súpun og grantum, ekki einúngis hráustum og heilbrigðum, heldr og svo veikum, sem ekki þola annann mat.

- b. Súruskreppa (*R. acetosa*). Blöðin aflaug, skeytilik. Fræblöðkurnar bera korn; ísl. Vallarsúra.

Rótin greinótt, innantil hvít. Stauugullian uppréttr, sívalr, strikaðr, blöðótt, ofan greinótt. Blöðin slétt, heil á röndum, þau neðri á stauuglinum snubbótt. Stauugulblöðin sitjandi, umfangandi, hvöss. Blómströppgreinarnar opnar. Blómstrkransarnir niðráviðbeygðir. Kvemblómstrin hafa dekkri lit enn kallblómstrin, hvörra krónur þar á móti eru meir opnar.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi er kælandi, vallgang mykjandi, mótstendr forrotnun og skyrbjúgi. Fræ hennar er bindandi; hún brúkast því móti harðlífi, skyrbjúgi, matar-ólyst, blóðsótt, þorsta í landfarsóttum, ólgu í blóðinu, blóðlátum og þykkum vessum. Seyði af nýrri súru og skarvakáli tilsamans er hið bezta meðal móti skyrbjúgi. Af seyði af einsömlum súrublöðum drekkist hálfur tebolli í senn, 3svar dagliga. Duft af fræinu brúkst 1 teskeið full í senn, 3svar dagliga, í spæni fullum af mysu.

c. Spjótblöðótt Skreppa (*R. acetosella*).

Blöðin lensulík, spjótmynduð. Fræblöðkurnar kornlausar.

Urt þessi líkist mikið enni undangangandi, en er öll mikið minni. Staungullinn greinuóttari. Rótarblöðin hafa útstandandi flípa við neðri endann; efstu blöðin lensulík. Kallurtarinnar duftluappar rauðleitar; kvennurtarinnar dupthyrzlur hvítleitar.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

*Nytsemi og verkun:* sem undangangandi.

## 5. Bjarnarbroddur (*Nartheticum*).

a. Fjalla-Bjarnarbroddur (*N. calyculatum*). Krónublöðin umsnúið-eggmynduð, snubbótt; ísl. Sýkisgras.

Rótin með laungum aungum. Staungullinn uppréttr, óskiptr, nær því blaðalaus, sívalr, sléttr. Blöðin líkjast grasstráum, eru hvöss, sínótt.



Blómstrin sitja í axi á staungulendanum, eru ljóseðr hvít-græn. Bikariu 3klofinn, minni enu krónan. Krónublöðin snubbótt, hol, ævarandi.

Margra ára urt; blómstrar í ágúst.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

## 6. Sældíngur (*Triglochin*).

- a. Mýra-Sældíngur (*T. palustre*). Fræhús-ið 3rúmað, næstum strikmyndað.

Rótin auggótt. Skaptið upprétt, lítið strent, slétt, óskipt. Blöðin jafulaung skaptinu, hálfsvöl, rennótt, slétt, strikmyndað, við neðri endann slíðrandi, kjötlig. Blómstrin eru á skaptendanum í margblómstruðu axini. Fræhúsin snubbótt, sitja á stuttum leggjum. Fræin strikmyndað.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

- b. Stranda-Sældíngur (*T. maritimum*).

Fræhúsin Grúmuð, eggmyndað; ísl. Sandlaukr.

Urt þessi líkist mjög undangángandi, en hefir mjórri rót, leiugra og hálfsvölt skapt, breiðari og kjötligri blöð, stærri og snubbóttari blómstur, sem hafa styttri leggi og þéttari axin.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

## 7. H ó p r.

(Heptandria) sjömannaðar.

1sta Orða (Monogynia) einkvæntar.

1. Fagurblóm (*Trientalis*). Bikarinn 7blaðaðr. Krónan 7skipt, jöfn, flöt. Berið 1rúmað, þurt.

7di Hópr (Heptandria) sjömannaðar.

1sta Orða (Monogynia) einkvæntar.

1. Fagurblóm (*Trientalis*).

a. Evropískt Fagurblóm (*T. europæa*). Blöðin eggmyndað-lensulík, heil á röndum, og sitja í kransi.

Rótin hnúskótt, með laungum aungum. Staungullinn uppréttr, óskiptr, næstum blaðlaus að neðan, stundum hefir hann þó 2 til 3 smá, missett, hreystrilík blöð; hann er þarfyrirutan allr sléttr. Á enda staungulsins sitja 5 til 6 opin blöð, sem eru heil á röndum, og sitja í einum kransi. Fyrir ofan blöðin finnast 1 til 4 blómstrstaunglar, samanhnepttir, rauðleitir. Bikarblöðin alilík, hvöss. Krónan skjallhvít. Krónunnar blöð eggmyndað, snubbótt, við neðri endann samanst, svoð krónan eiginliga er 1blöðuð. Dupthæðirnir hvítir, styttri en krónan. Dupthnapparir rauðir. Berið næstum gagaært, glansandi, kúlulíkt.

Marga ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Sæmilig fóðr-urt fyrir annann pening einn kýr. Taki maðr blómstur hennar og blöð og núi millum fingra sinna, og þareptir strjúki þeim um augnahvarma sér, er sagt hún bati ýmissa augna-veiki.

Að vitni Hr. Distriktskírúrgs *S. Pálssonar* er þessi snotra og fásæna urt fundin í Fljótsdal eystra af Herra Prófasti *Guttormi Pálssyni*.

## 8. H ó p r.

(*Octandria*) áttmannaðar.

1sta Orða, (*Monogynia*) einkvæntar.

1. Purpurajurt (*Epilobium*). Krónan 4blöðótt. Bikarinn 4klofinn, yfirsitjandi. Fræhúsið 4rúmað. Fræin þelulluð.

2. Bláber (*Vaccinium*). Krónan 1blöðótt. Bikarinn 4tenntr, yfirsitjandi. Ávöxturinn ber.

3. Lýng (*Erica*). Krónan 1blöðótt. Bikarinn 4blaðaðr, undirsitjandi. Ávöxturinn er fræhús.

2ur Orða, (*Trigynia*) þríkvæntar.

4. Marghyrna (*Poligonum*). Bikarinn

5skiptr, krónulíkr, undirsitjandi. Eingin króna. Eitt nakið fræ.

3ja Orða, (*Tetragynia*) fjórkvæntar.

5. Fjögralaufajurt (*Paris*). Bikarinn 4blöðótt. Krónan 4blöðótt. Berið fyrir ofan blómstrið.

8. Hópr (*Octandria*) áttmannaðar.

1sta Orða (*Monogynia*) einkvæntar.

1. Purpurajurt (*Epilobium*).

- a. Breiðblöðótt Purpurajurt (*E. latifolium*). Blöðin missett og mótsett, eggmynduð-lensulík, næstum heil á röndum, dúnhærð, æðalaus. Krónurnar ójafnt skiptar; ísl. Purpurablómstr, Maríuvöndr.

Staugullinn uppréttr, strendr, blöðótt, 6skiptr. Blöðin sitjandi, mjög stuttleggjnd, hafa fjar litlar tenur á röndunum, beggjamegin fínt dúnhærð. Blómstrin stór, sitja á stuttum staunglum í efstu blaðhornunum. Bikarlepparnir strikmyndaðir, lensulíkir. Krónublöðin snubbótt, næstum krúglótt, fagr-lifrauð. Duptberarnir íbjúgir í broddinn.

Margra ára urt; blómstrar í ágúst.

- b. Sléttblöðótt Purpurajurt (*E. montanum*). Blöðin leggjótt, eggmynduð, teunt. Staugullinn sívalr. Örið 4skipt; ísl. Eyra-rós.

Rótið með fínum greinum, skriðandi. Staungullinn rættur, upprættur, óskiptr, sívalr, rauðleitr, fínhærðr, eukum við blaðstaunglana. Blöðin stuttleggjuð; þau neðstu mótsett, slætt; þau efstu missett, lensulík. Bikarlepparnir næstum strikmyndaðir. Krónublöðin lítil, bleik, rauðklofin í broddinu. Arslepparnir beygðir á bak aprtr. Fræhúsið 4strent.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

- c. Mýra Purpurajurt (*E. palustre*). Blöðin sitjandi, mjó, lensulík, tennt. Staungullinn sívalr. Örið óskiptr.

Staungullinn upprættur, lítið greinóttur eðr óskiptr, slættur, eðr mjög fínhærðr, blöðóttur. Blöðin mótsett, þau neðstu missett, næstum strikmynduð, heil á röndum, slætt. Krónublöðin lítil, randskorin, bleikrauð. Örið strikmyndað. Fræhúsið uppreist.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

- d. Fjalla Purpurajurt (*E. alpinum*). Blöðin mótsett, eggmynduð, lensulík, heil á röndum. Fræhúsið sitjandi. Staungullinn neðantil niðráviðliggjandi.

Rótið skriðandi. Staungullinn uppstígaandi, óskiptr, snubbóttur, 4strendr, slættur. Blöðin stuttleggjuð, slætt, lítið tennt í broddinn, standum missett, slætt. Urtin hefir 2 til 3 lítil, rauðleit blómstur í efri enda staungulsins, hjá hvörjum sitja lítil, missett blöð. Krónublöðin randskorin. Fræhúsið slætt.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

- e. Ferstrend Purpurajurt (*E. tetragonum*). Blöðin lensulík, smátennt. Staungullinn ferstrendr.

Staungullinn uppréttr, óskiptr, blöðótttr, sléttr, ofantil fíuhærðr, rauðleitr. Blöðin næstum sitjandi, hálfumfaðmandi, hvöss, slétt, mótsett utaná sinnum og röndinni. Blöðin við blómstrin missett. Klasarnir fáblómstraðir. Krónurnar litlar, rauðar. Örið kylfumyndað. Fræhúsið 3- til 4-faldt leingra en leggirnir.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

- f. Mjóblöðótt Purpurajurt (*E. angustifolium*). Blöðin útdreifð, strikmyndað, lensulík, með æðum, slétt. Krónurnar ójafnar. Duptberarnir niðráviðbeygðir.

Rótin græinótt, lítið skriðandi. Staungullinn uppréttr, réttr, óskiptr, sléttr, sívalr, blöðótttr, rauðleitr. Blöðin sitjandi, heil á röndum, slétt, hvöss, og hafa þykkva sin á miðjunni. Blómstrin sitja blaðlaus á efri enda stanugulsins í 4 strendum, uppmjóum klasa. Klasaleggirnir strendir. Krónurnar fagr-rauðar. Bikarblöðin dökkrauð. Duptið á dupleiðmóppunum bláleitt.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

#### *Nytsemi og verkun:*

Rótin hefir inni að halda mjölilíka parta, og kann því að brúkast til matar; sömuleiðis staungullinn. Fræullinn kann, með bómullu blönduð, að spinnast. Þaraðauki má hana brúka í kveiki, svoel í lampa sem kerti.

- g. Smáblöðótt Purpurajurt (*E. angustissimum*). Blöðin útdreifð, strikmynduð, lensulík, tönnótt, æðalaus. Króunblöðin jafuvaxin, heil á röndum.

Stauugullinn upprètt, rètt, sívalr, slètt, í efri endann greinótt. Blöðin mjög mjó, lensulík, strikmynduð, stundum móttsett, stundum missett, stundum án nokkurrar orðu. Blómstrin opin, sitja á efri euda stauungulsins, á stuttum staunglum, nærfeldt helfings styttri eun fræhúsið. Á hvörjum staungli vex eitt lítið blað, sem þó á nokkrum sitja við neðri enda. Króunblöðin dökkljósrauð, umsuúð-eggmynduð, lensulík, nokkuð stór. Bikarblöðin eggmynduð, hvöss, við neðri endanu rauðleit, í broddinu gul. Örið suubótt.

Margra ára urt; blómstrar í júl.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

## 2. Bláber (*Vaccinium*).

- a. Aðal-bláber (*V. myrtillus*). Blómstr-staunglarnir í blómstraðir. Blöðin eggmynduð, uðbbótt. Stauugullinn strendr; ísl. Aðalbláberjalýng.

Rótin greinótt, aungótt, lítið skrifðandi. Bolurinn greinótt. Greinarnar strendar, slèttar, græuleitar. Blöðin missett, stutt, leggjuð, slètt, ljósgræn. Blómstrin lútandi, sitja einstök í blaðhornunum á litlum staunglum. Bikarinn lítill, 5tenutr. Krónan kúlumynduð, með kjötlit, í munnaun 5teunt. Duptberarnir innilokaðir af króunum. Duptlinappararnir 2hyrdir. Berið kúlumyndað, dökkblátt.

Margra ára urt; blómstrar í júní; berin fullvaxin í ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Ber, blöð og rót þessarar urtar eru kælandi, barkandi og forrotnun mótstandandi. Þau eru því góð móti lífsýki, köldu, sem og skyrbjugi, samt til að þurka upp skarpa vessa úr slæmum kaunum. Blöðin takist í júní, en berin öndverðliga í september, þá fullvaxin eru. Af seyði berjanna og blaðanna takist 2 matspænis í senn, hvörun annann klukkutíma. Dnpt af rótinni er gott að strá í holdfúa sár. Af berjunum má búa til maut með því móti, að merja berin, blanda síðan með sykri eður hvináangi og geyma. Í matspónn af mauti þessu, blandaðr í pela af vatni, er hollr drykkir fyrir landfarsóttarsjúka, móti hita og þorsta. Berin marin, látin í járnsíát, síðan sett í yl, súrna og gefa svartan lög, sem barkar vel skinn, sèu þau þarí lögð, ásamt nokkru af álúni. Berin nýsoðin með álúni gefa fíólet eður lífrauðan lit, einkum líni og ullu. Blöðin handtèruð á sama hátt hita gult.

- b. Almenn Bláber (*V. uliginosum*). Blómstrastaunglarnir einblómstraðir. Blöðin umsnúð-eggmynduð, heil á röndum, slétt. Greinarnar sívalar.

Staungullinn sívalr, greinótt. Blöðin snubbótt, æðótt, slétt, á neðra borði gráleit, á úngum urtum eru blöðin lítið hærð við neðri endann. Blómstrin stærri og bleikari enn á undangangandi,



4skipt í munnann. Dupthnapparnir með stríi. Berin kúlmýnduð, með bláleitri dög.

Blómstrar í júní og júlí.

- c. Mýra-Bláber (*V. oxycoccus*). Blöðin eggmynduð, heil á röndum, lítið á bakaptrbeygð, hvöss. Staunglarnir skríðandi, þræðilíkir, sléttir.

Rótin augótt. Staunglarnir trèlíkir, viðvarandi, þéttir, einkum í yztu greinunum. Blöðin missett, stuttleggjuð, á neðra borði grálcit. Þeir einblómstruðu blómstrstaunglar eru margir saman á efri enda greinanna, rauðir, hafa við neðri endann lítil blómstrblöð. Blómstrin lútandi. Krónurnar 4skiptar, ljósrauðar, með ábakaptrbeygðum leppum. Dupthberarnir framstandandi. Dupthnapparnir hengja sig þétt utan um þá framstandandi dupthyrzlu. Berin rauð, kúlmýnduð.

Blómstrar í júlí.

### 3. Lýng (*Erica*).

- a. Algengt Lýng (*E. vulgaris*). Dupthnapparnir innilokaðir. Dupthyrzlan framskagandi. Krónan 4skipt, styttri enn bikarinn. Blöðin mótsett, sporótt; ísl. Beitilýng.

Rótin greinótt, trèlík. Bolrinn hríslótt, við rótina liggjandi, greinótt. Greinarnar sívalar í efri enda blómstur- og blöð-berandi. Blöðin eru í mótsettum 2 röðum, nálmynduð, 3strend, við neðri endann niðrbeygð, slétt, innþrykkt að staunglinum, næstum þökt. Blómstrin eru í klösum, leggjuð, slútandi. Bikarinn 2faldr, sá ytri samanstendr af 4

litlum, eggmynduðum, randhærðum blöðum, sá innri stærri enn krónan, litadr. Krónan dökk-kjöt-litadr, stundum hvít, 4skipt. Dupthnapparnir hafa við neðri endanu 2 strí. Dupthyrzlan leingri enn bikarian. Örið 4klofið. Fræhúsið lítið, krúnglótt, niðráviðþrykkt, 4blaðað, 4rúmað.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi er góð fóðr-urt fyrir sauðfè. Hún hefir og sterkbarkandi eiginligleika; brúkast því til að lita skinn með. Með álúni, jarnviktríli eðr pottösku soðin, litar hún ýmisliga og falliga kaffe-brúnt. Sè hún lögð í rúm eðr annarstaðar í hús, koma þar traðgla mýs eðr rottur.

2ur Orða (*Trigynia*) Þríkvæntar.

4. Marghyrna (*Polygonum*).

- a. Útbreidd Marghyrna (*P. aviculare*). Blómstrin í blaðhornnum. Blöðin aflang, lensulík, snörp á röndum. Sinarnar á ax-blöðunum strjalar. Staungullinn framáviðliggjandi; ísl. Oddvari, Blóðarfi.

Rótin samanstendr af mörgum seigum anngum. Staungullinn útbreiddur, útskagandi, greinóttur, sívalr, blöðóttur, strikaðr. Blöðin slètt, missett, heil á röndum. Axblaðanna hymnur harðar, hvassar, með fám, strjálum hymnum. Blómstrin smáleggjuð. Krónurnar rauðar og hvítar. Dupthyrzurnir styttri enn bikariinn. Dupthyrzlurnar mjög stuttar. Fræið 3hyrnt.

Blómstrar frá í júní og til hausts.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi hefir styrkjandi og samauðragandi krapt. Hún er því góð móti lífsýki, matarólyst og blóðlátum. Dúpt urtarinnar takist 1 full teskeið, hvört dagsmark. Fræ hennar má brúka til manneidis og líkist nokkuð bóghveitigrjónum.

- b. Topp - Marghyrna (*P. viviparum*).  
 Staungullinn óskiptr með 1 axini. Blöðin  
 lensulík, tilbaka-undin á röndunum; ísl.  
 Kornsúra.

Rótin þykk, vatnsflöt. Staungullinn uppréttr, neðan hreystraðr. Rótarblöðin aflaug, lensulík, lánleggjuð. Staungulblöðin strikmyndað, lensulík, þau efstu sitjandi, öll heil á röndum, á neðra borð lítið bleikari og lítið hærð. Á efri enda staungulsins er einstakt-strikmyndað, sívalt, glansandi axin. Krónurnar fagr-rauðar, þær neðstu stundum með toppi. Dúptberarnir 8. Fræin 3ja hliða.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi er barkandi og styrkjandi; hún er því góð móti allslags blóðlátum og lífsýki. Af rótinni búist til seyði, sem drekkist hálfri tebolli í senn, 4sinnum dagliga. Dúpt af rótinni takist 1 full teskeið, 3svar dagliga, í vatni eðr mysu. Dúptinu er gott að strá í illaluktandi sár og sem eru vessafull; það stemmir og blóðrás úr skurðum. Fræ urtarinnar vandliga þurkað, og síðan til matar búið í mjólkur jukki, gefr vel seðjandi fæðu, ei ólíka bóghveiti, sem er sama kyus og urt þessi.

Með rótinni má og svart lita, sè hún soðin með járnviktríli, sem fæst sumstaðar hér á landi, svo sem á Reykjanesi.

- c. Bitr Marghyrna (*P. hydropiper*). Blómstrin 6mönnuð, hálf-2kvænt. Blöðin lensulík, bylgjótt. Axinin þræðilík, lútandi. Staungullian upprètt.

Rótin augótt. Staungullian upprètt, eðr uppstigandi, sívalr, slètt, þykkliðótt. Liðirnir rauðir á neðri röndina. Blöðin heil á röndum, hvöss, án bletta. Axiblöðin randhærð. Axinin mjó, laung. Blómstrin hvít eðr rauðhvítleit, utan stúngin. Duptberarnir styttri enn krónurnar. Fræið samanþrykkt.

1 árs urt; blómstrar í ágúst og september.

*Nytsemi og verkun:*

Urtin ver flóm. Með álúni og vínsteiini má með henni grænt lita, þó enn betr, láti maðr járnviktríl samauvið. Urtin soðin, viðlögð kinnarnar, sefar taunpínu; ítem er dult af vellurkuðum blöðum hennar gott í slæm sár.

- d. Breiðblöðótt Marghyrna (*P. amphibium*). Blómstrin 5mönnuð, hálf-2kvænt.

Rótin skriðandi, liðótt með görðum. Staunglarnir sívalir, slèttir, slíðraðir af hymnulíkum, heilrönduðum axlablöðum, sveimandi þá urtin vex í vatni, skriðandi við neðri endann, uppreist í broddinn, þá hún vex á þurrlendi. Blöðin missett, leggjúð, breið-lensulík, á röndum smánöbbótt, glausandi á efra yfirborð. Blaðstaunglarnir sívalir, slèttir. Blómstr-axinið sitr á efri enda

staungulsins og er uppreist, þétt. Krónurnar rósrandar, millum hvörrar einnar, einkum hinna neðstu, er hymnulíkt blómstrblað. Bikarinn trektmyndaðr. Duptberarnir sitja á bikarröndunum, og eru opt styttri enn bikarinn. Dupthyrzlan skipt að miðju. Fræið dökkt, eggmyndað, samanþrykkt.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Rót þessarar urtar er dreifandi og uppleysandi. Hún er því góð móti gulu, lifrabólga og meinlætum. Seyði af urtinu drekkið, svo tebollum skipti, 4sinnum dagliga.

c. Lensnblöðótt Marghyrna (*P. persicaria*). Blómstrin 6mönnuð, hálf-2kvænt. Axinin eggmyndað, aflang, uppreist. Blómstrstaunglarnir hárlausir. Axblöðin randhærð; ísl. Flógarurt.

Rótin aungótt. Staungullinu við neðri enda rótumskjótandi, uppréttr, missett-greinótt, líðótt, blöðótt, sívalr, sléttr, rauðleitr. Blöðin stutt, leggjuð, missett, lensulík, heil á röndum, hvöss, opt niðráviðbeygð, stundum blettótt. Axblöðin slétt, slíðrandi, hymnulík, á röndum lítið hærð. Axinin í efri enda staungulsins og greinanna, á laungum staunglum, uppreist og samþétt. Blómstrin ljósrand. Krónan 5- til 6-skipt. Duptberarnir jafnlángir bikarum. Fræið 3ja hlíða.

1 árs urt; blómstrar í júlí, ágúst og septbr.

*Nytsemi og verkun:*

Með blöðum urtar þessarar má gult lita, sæ það er litast á, áðr soðið í álúns vatni. Að öðru

leiti hefir hún alla sömu, en þó ei svo kröptuga verkun, sem Bitra Marghynnan.

### 3ja Orða (*Tetragynia*) fjórvæntar.

#### 5. Fjögralaufajurt (*Paris*).

- a. Algeing Fjögralaufajurt (*P. quadrifolia*) hefir 4, sjaldnar 5 krans-eggmynduð blöð á staungulendanum; ísl. Fjögralaufasmári.

Rótin laung, kjöttlig, skrifðandi. Staungullinn upprèttur, óskiptur, rèttur, sívalur, strikaður, slèttur, íblómstraður, blöðóttur einasta í broddinn. Blöðin, af hvörjum finnast 5, sjaldnar 3, eru dökkgræn, hvöss, heil á röndum, slètt, sínótt. Blómstrstaunglarnir eru á staungulendanum fyrir ofan blöðin óskiptir, upprèttir, strendir. Bikarblöðin eggmynduð, lensulík, hvöss, sínótt. Krónublöðin strikmynduð, græn, og sitja missett á móts við bikarblöðin. Þeir strikmynduðu dupthnappar sitja lángs eptir miðju enna grænu dupthráða, og eru grónir þarvið. Ávaxtarhyrzlan með 4 kornum, sívöl, dökkljósblá. Dupthyrzlurnar stuttar, gular. Berið svart, 4rúmað.

Margra árafurt; blómstrar í júní.

#### *Nytsemi og verkun:*

Þessi fásæða urt vex í *Búðahrauni*. Hún er ævæfandi, verkar uppsölu, mótstendr sinatægjum. Ber hennar eru haldin eitruð. Eptir lærðra manna reynslu, skal hún brúkast geta sem uppsölnmeðal, og skal þá rótin malast eður steytast í durt, og sè af því tekið  $\frac{1}{3}$  til  $\frac{1}{2}$  kvintín. Með

blöðum artarinna, sèu þau tekin áðrenn hún blómstrar, og þurkuð, má að *Frankismanna* dæmi lita purpurarautt; skulu þau sjóðast í vatni og síðan í seyðsluna látið ull, sem áður hefir í álúns vatni soðin verið, og þareptir þurkuð.

## 9. H ó p r.

(*Enneandria*) níumannaðar.

Ista Orða, (*Trigynia*) þríkvæntar.

1. Rhabarber (*Rheum*). Einginn Bikar. Krónan 4- til 6klofin, æværandi. 2 til 3 ör, utan stýls. 1 hymnótt fræ.

9. H ó p r (*Enneandria*) níumannaðar.

Ista Orða (*Trigynia*) þríkvæntar.

1. Rhabarber (*Rheum*).

a. Tvíkvænt Rhabarber (*R. digynum*). Krónan með 4 blöðum. Fræin flöt. Blöðin nýrumlík; ísl. Ólafs-súra.

Rótin með þunnum aungum, laug. Staungullinn uppstígandi eðr upprètt, nær því blaða- og greinalaus, utan við blómstrin, með ryðlituðu, hymnulíku hreystri við rótina. Blöðin flest við rótina á laugum, strikuðum, slèttum blaðstaungum, þykk, slètt, nýrumlík, nær því krínglött, bugðótt á röndum, ljósgræn. Blómstrklasarnir

samansettir af minni klösum. Fræblöðkurnar rauð-leitar.

Margra ára urt; blómstrar í ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi hefir mikið líka verkun og Vallarsúran, hvörri hún líkist að smekk.

## 10. H ó p r.

(*Decandria*) tímannaðar.

1sta Orða (*Monogynia*) einkvæntar.

1. Andrómeðusjurt (*Andromeda*). Krónan eggmynduð. Fræhúsið 5rúmað.

2. Mjölber (*Arbutus*). Krónan eggmynduð, við neðri endann gagnsær. Berið 5rúmað.

3. Vetrarlilja (*Pyrola*) Fimm krónublöð. Dupthnapparnir hafa 2 holur. Fræhúsið 5rúmað, opnar sig á hliðunum.

2ur Orða (*Digynia*) tvíkyæntar.

4. Steinbrjótr (*Saxifraga*). 5 krónublöð. Bikarinn 5skiptr. Fræhúsið með 2 trjónum, margfrævað.



3ja Orða (*Trigynia*) þríkvæntar.

5. Blöðrurt (*Cucubalus*). Fræhúsið 3rúmað. Krónublöðin klofin með nøglum, án gynkrans. Bikarinn uppblásinn.

6. Hólurt (*Silene*). Fræhúsið 3rúmað. Krónublöðin tvíklöfin með gynkransi.

7. Stjörnujurt (*Stellaria*). Fræhúsið 4rúmað. Krónublöðin 2 skipt, opin.

8. Sandjurt (*Arenaria*). Fræhúsið 1-rúmað. Krónublöðin heil, opin.

4ða Orða (*Pentagynia*) fimmkvæntar.

9. Steinajurt (*Sedum*). 5 Fræhús. 5 hunángshreystur við enda ávaxtarhyrzunnar. Krónan 5blöðótt.

10. Ljósberi (*Lychnis*). Fræhúsið 5-eðr 4rúmað, margfrævað. Bikararnir pípu-myndaðir, hymnulíkir.

11. Músareyra (*Cerastium*). Fræhúsið 4rúmað. Krónublöðin 2klöfin. Bikarinn 5blöðótt.

12. Skurfa (*Spergula*). Fræhúsið 4rúmað. Krónublöðin óskipt. Bikarinn 5-blöðótt.

10. Hópr (*Decandria*) tímannaðar.1sta Orða (*Monogynia*) einkvæntar.1. Andrómeðusurt (*Andromeda*).

- a. Algeing Andrómeðusurt (*A. hypnoides*). Blöðin þökt, alílk. Blómstrleggirnir einstakir á staungulendanum. Krónurnar kúlumyndaðar, klukkulíkar.

Rótin þræðilík. Staungullinn framáviðliggjandi, greinótt, þéttblöðótt. Blöðin græn, nálmyndað, þétt, fín, glansandi, hvöss. Blómstrstaungullinn slétt, niðráviðbeygðr. Krónan gul. Bikarblöðin eggmyndað.

Blómstrar í júlí.

Nytsemi og verkun: óþekkt.

2. Mjölber (*Arbutus*).

- a. Fjalla Mjölber (*A. alpina*.) Bolrinn framáviðliggjandi. Blöðin hrukkótt, snubbótt.

Bolrinn trélikr, marggreinótt, með ljósdökkum, afflysjandi berki. Blöðin umsnúð-eggmyndað, missett, smánöbbótt, snubbótt, hafa þéttar æðar, niðrhlaupandi í 1 legg. Blómstrin sitja í klösum í greina-endunum. Krónurnar hvítar. Við blómstrstaunglana eru finhærð blómstrblöð. Berin svört, kúlulík, hol í endann.

Blómstrar í júlí.

- b. Algeingt Mjölber (*A. uva ursi*). Bolirnir framáviðliggjandi. Blöðin heil á röndum; ísl. Sortulýng, Mulníngr.

Rótin trélík, greinótt. Bolrinn trélíkr, fram-  
áviðliggjandi, greinótt, með slöttum berki. Blöðin  
missett, stuttleggjuð, umsnúð-eggmynduð, snubb-  
ótt, slött, skinnlík, æðamörg, stíun. Blómstrin  
sitja í stuttum, lítið lútandi klasa í enda grein-  
anna og stanngulsins. Krónan eggmynduð, hefir  
kjöttlit. Við hvörn staungul sitja lítil, litnð blómstr-  
blöð. Berið niðrþrykkt, kúlumyndað, rautt, 5-  
frævað.

Blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi er mjög barkandi, má því með var-  
úð brúkast; hún er góð móti lífsýki, sæu eingir  
verkir meðfylgjandi; item móti munnsviða og  
öðru húðleysi líkamans. Seyði af blöðum urtar-  
innar takist 1 matspónn 3svar dagliga. Seyði þessu  
er gott að halda í munni sér við munnsviða, og  
til að þvo með húðlausa staði. Dupt af blöðun-  
um og berjunum takist hálf teskeið í spæni full-  
um af mysu, 2svar dagliga, er það haldið gamallt  
gott meðal móti blöðrusteini.

Með sortulýngi og ati litast svart, sem al-  
menníngi er kunnugt; hvarum Herra konferenzráð  
M. Stephensen ritað hefir ágætar varúðarreglur,  
sjá Klaustropóst 1818, Nr. 8.

### 3. Vetrarlilja (*Pyrola*).

- a. Hríngblöðótt Vetrarlilja (*P. rotun-  
difolia*). Duptberarnir uppstígjandi. Dupt-  
hyrzlan niðráviðbeygð. Blómstrklasinn marg-  
blómstraðr; ísl. Vetrarlaukr.

Rótin þræðilík, skriðandi. Stannglarnir upp-  
rèttir, óskiptir, strendir, blöðóttir. Blöðin mis-  
sett, leggjúð, næstum krínglótt, slètt, heil á rönd-  
um eðr lítið uöbbótt, einkum við neðri endann;  
á staungulendanum sitr strendr klasaleggr, sem  
hefir 3 til 4 missett, snubbótt, lensulík, dökkrauð  
hreystur. Klasinn margblómstraðr. Blómstrstaungl-  
arnir missettir, uíðráviðbeygðir, og hafa við neðri  
endann hvast, lensulíkt blómstrblað. Krónurnar  
stórar, hvítar. Duplepparnir skurðóttir. Duplep-  
hyrslan leingri enn duplepparnir. Örið hjólmynd-  
að. Ávaxtarhyrslan óskurðótt.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Te af blöðum urtarinnar er gott við brjóst-  
veiki.

b. Einnar-síðu Vetrarlilja (*P. secun-  
da*) hefir einnar síðn blómstrklasa.

Rótin skriðandi með laungum aungum. Staung-  
ullinn framuáviðliggjandi, uppstígandi, hreystur,  
blöðóttir, greinuóttir. Blöðin minni enn á undan-  
gáugandi, eggmynduð, hvöss, smánöbbótt, netilíkt-  
aðótt. Klasastaungullinn upprèttir, settr 4 til 6  
grænum, lensulíkum, hvössum hreystum. Klasinn  
marg- og þétt-blómstraðr, styttri enn á undan-  
gáugandi. Blómstrin öll snúa 1 veg. Við neðri  
enda hvörs blómstrstaunguls er hvítt, lensulíkt  
blómstrblað. Bikarlepparnir stuttir, grænir, ábak-  
aptr-undnir. Krónublöðin hol, með innuáviðbeygð-  
um oddi, hvítleit. Duplepphyrslan rétt, eðr lítið  
uppstígandi, leingri enn á undangáugandi.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.  
*Nytsemi og verkun:* sama sem undangangandi.

2ur Orða (*Digynia*) tvíkvæntar.

#### 4. Steinbrjótr (*Saxifraga*).

- a. Nabla Steinbrjótr (*S. cotyledon*). Rót-arblöðin í hópum, tángumynduð, brjóskenut. Staungullinn blöðótttr, toppmyndað-skiptr í endanu. Bikararnir settir kyrtílberandi hárum; ísl. Klettafrú.

Staungullinn upprètttr, slètttr, frá neðri enda blómstrsettr. Blöðin stínn, breið, slètt, þau yztu hol, þau innri ávöl. Við enda hvörrar blómstrgreinar er eitt eggmyndað-lensulíkt, hvast, tenut blað; sömuleiðis við sèrhvöru blómstrstaungul, einúngis eru þau minni. Húu hefir mörg blómstr. Krónublöðin næstum krúglótt, hvít. Bikarblöðin raudhærð.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Blöð þessarar urtar eru góð, viðlögð þar sem maðr brennir sig.

- b. Stjörnu Steinbrjótr (*S. stellaris*). Blöðin nöbbótt. Staungullinn blaðlaus. Krónublöðin hvöss. Fræhúsið fyrir ofan bikarinn.

Rótið þètt, auugótt. Staungullinn upprètttr, við neðri eudaun blöðótttr, hærðr, sívalr, í broddinu greinótttr. Blöðin umsuúð-eggmynduð, fleigmynduð, hvöss, nöbbótt, hærð. Blómstrstaungullinn fáblómstraðr. Blöðin við blómstrin lensulík.

Krónublöðin hvít, lítið gul innantil, við neðri endann eggmynduð, 3sinótt. Bikartopparnir beygðir á bak aptr. Fræhúsið slétt. Fræin mörg, snörp.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

- c. Snjó-Steinbrjótr (*S. nivalis*). Blöðin umsnúið-eggmynduð, nöbbótt. Staungullina blaðlaus. Blómstrin þétt saman. Fræhúsið hálft fyrir neðan líkariinn.

Rótin þykk, með laugum sungum. Staungullinn sívalr, línhærðr, sèrdeilis í toppinn, óskiptr, stundum greinótt. Við hvörja grein vex eitt lensulíkt, hvast blað. Blöðin breiðari og þykkri eun undangángandi, nöbbótt einasta í efri endann, þétt saman. Krónublöðin hvít, umsnúið-eggmynduð, hafa græna bletti, snubbótt, hríngnöbbótt. Bikariann sitr á miðri ávaxtarhyrslummi.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

- d. Ferstrendr Steinbrjótr (*S. oppositifolia*). Staungulblöðin eggmynduð, mótsett þétt, þau efstu randhærð; ísl. Snjó-blómstr, Vetrarblóm, Lambablóm.

Rótin augótt. Staunglarnir mislángir, fram-áviðliggjandi, greinóttir, stundum rótum skjótandi. Greinarnar þéttblöðóttar, þær blómstrberandi uppreistar. Blöðin þétt, snubbótt, þykk, rennótt, hryggjótt, hol, þau efstu í enda greinanna missett, þau neðri visin, þá þau efri eru græn. Blómstrin eru í enda greinanna og staungulsins. Krónublöðin dökkrauð, sinótt, umsnúið-eggmynduð.

Blómstrleggirnir óskiptir. Bikarinn sitr á miðri ávaxtarhyrzlunni.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:*

Af Steinbrjót gefast hér í landi 16 tegundir, og hafa nokkrar af þeim sama krapt og þessi. Hann er nefnilega þvagdreifandi og mýkjandi. Hann mótstendr og eyðir þvagstemmu, og brýtr steina, leiðir tíðir kvenna. Te af urtinni drekkist, svo tebollum skipti, 4 sinnum dagliga. Bakstr af urtinni útvortis, dreifir bólgu og ígerðum, eðr gjörir þær út.

- e. Útleggjaðr Steinbrjóttr (*S. hirculus*). Staungulblöðin missett, lensulík. Staungullinn upprètt. Ávaxtarhyrzlan eggmynduð, ofar enn bikarinn.

Rótin augótt. Staungullinn upprètt, óskiptur eðr stuttgreinótt, við neðri endann sívalr, blöðótt, ofantil ryðlitaðr. Blöðin snubbótt, slètt, lítið randhærð. Á staungulbroddinum spretta fyrir blómstrunartímann lútandi blómstur, sem eru mikið stærri enu á undangangandi. Krónublöðin umsnúið-eggmynduð, sinótt, gul, með dökkum stúngum innan og neðantil. Ávaxtarhyrzlan aflaug.

Margra ára urt; blómstrar í ágúst og septbr.

*Nytsemi og verkun:* sem undangangandi.

- f. Tannhærðr Steinbrjóttr (*S. aizoides*). Staungulblöðin strikmynduð, missett, tennt-randhærð. Staungullinn við neðri endann niðráviðliggjandi. Ávaxtarhúsið niðráviðþrykkt, hálftr fyrir neðan bikarinn.

Rótin aungótt. Staunglarnir uppstígandi, óskiptir á þeim niðráviðliggjandi, en í uppreista partinn greinóttir, sívalir. Blöðin missett, randhærð, hafa litlar tenur. Blómstrin sitja í blöðóttum toppi. Bikarinn uppreistr. Krónublöðin jafulanug bikarnum, útbreidd, gul með dökkum blettum.

Margra ára urt; blómstrar í ágúst.

*Nytsemi og verkun:* sama.

- g. Þvali Steinbrjótr (*S. cernua*). Blöðin hendilík, leggjuð. Staungullinn laukberandi. Ávöxturinn ofar enn bikarinn. Krónublöðin innþrykkt í broddinn.

Rótin aungótt, sett lensulíku hreystri, opt kornótt. Staungullinn upprèttur, greinóttur, í broddinu stundum óskiptur, einblómstraður, sívalur, slèttur, blöðóttur. Rótarblöðin og þau neðstu staungulblöð lánleggjuð, missett, nýrumlík-krúglótt, fagrgræn, skipt í 5 til 7 flípa, slètt. Miðstaungulblöðin stuttleggjuð, 3skipt, þau efstu sitjandi, lensulík, og hafa í hornunum rauðan lauk. Blómstrin einstök á greinunum eður staunglinum. Bikarlepparnir aflángir, hærðir. Krónublöðin hvít, randskorin, 3sinótt.

Margra ára urt; blómstrar í júl og ágúst.

- h. Lækjar Steinbrjótr (*S. rivularis*).

Blöðin hendilík, leggjuð, þau efstu reku-mynduð. Staungullinn fáblómstraður.

Rótin aungótt. Ávaxtarhúsið hálft fyrir neðan blómstrið. Á rótinni spretta 1 eður 2 staunglar, sem eru upprèttir, óskiptir, optast 2blómstraðir, slèttir. Rótarblöðin lánleggjuð, innskorin í 5



snubbótta flipa, slètt. Staungulblöðin stuttleggjuð, þau efstu óskipt, sitjandi. Blöðin við blómstrin lensulík. Bikarinn línhærðr við neðri endann. Krónublöðin hvít, lítil, snubbótt.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

- i. Þríklofiun Steinbrjótr (*S. tridactylites*). Blöðin fleigmynduð, 3 til 5skipt, missett, þau efstu óskipt. Blómstrin í einum toppi. Ávaxtarhúsið fyrir neðan bikarinn.

Rótin augótt. Staungullian upprètt, greinóttur eðr óskiptr, sívalr, rauðleitr, vessamikill, eins og öll urtin er. Blöðin eru saman við rótina, og missett á staunglinum, hin fyrri 2- til 5-skípt. Þau síðari optar lensulík, þykk, hærð. Blómstr-toppurinn blöðóttur. Krónublöðin umsnúð-eggmynduð, lítil, hvít. Bikarinn og ávöxturinn hærðr.

1 árs urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:*

Rót þessarar urtar hefir uppleysandi kraft; hún er því góð móti gulu. Seyði af rótinni drekkist, svo tebollum skipti, 3svar dagliga, lækna hana.

- k. Fimmtenntr Steinbrjótr (*S. petraea*). Blöðin heil og 3tennt. Staungulblöðin 5-tennt, þau efstu 3klofin. Blómstrstaunglarnir 3blómstraðir.

Rótin með fínum, þéttum augum. Staungullian upprètt, óskiptr, stundum sívalr, greinóttur, rauðleitr. Blöðin sitja þétt saman, kransmynduð við rótina. Blöðin við blómstrin strikmynduð, snubbótt. Greinarnar í broddinn mis-

settar. Staunglarnir uppréttir. Bikarinn hefir litla eggmyndaða leppa, og er fyrir ofan ávöxtinu. Krómunblöðin umsnúið-eggmynduð, lítið randskorin, hvít. Urtin er þvöl, líkist mjög næstandangángandi.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

1. Hríslóttir Steinbrjótr (*S. caespitosa*). Rótarblöðin samsett, þykk, strikmynduð, heil, 2skipt; á neðra borð sínótt. Staungullinn næstum blaðlaus, 2blómstraðr.

Rótin aungótt. Staungullinn upprétt, sívalr. Rótarblöðin þykk, randhærð, snubbótt, stundum heil á röndum, opt 3klofin í broddinn, á neðra borð 3sínótt. Á staunglinum sitja 2 blöð, hvörra hið efra er strikmyndað, óskipt; það neðra 3klofið í broddinn. Blómstrstaunglarnir á efri enda staungulsins uppréttir. Bikarinn límhærðr, með snubbóttum leppum. Krónublöðin gulleit, umsnúið-eggmynduð, 3sínótt. Fræhúsið næstum neðanúr blómstrinu.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

- m. Grænlenzkr Steinbrjótr (*S. caesp. Grænlantica*), með hendilíkum, margskiptum, hvassleppóttum blöðum og uppreistum staungli.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

- n. Handblöðóttir Steinbrjótr (*S. palmata*). Blöðin hærð, hendilík, 5- til 3skipt. Staungullinn blöðóttir. Blómstrin í 1 toppi. Krónublöðin næstum kringlótt.

Rótin þettaungótt. Staungullinn uppréttr, sívalr, hærðr, fáblöðótt, hefir stundum ófrjófsama síðuleggi, á hvörjum blöðin sitja þett saman, í efri endann stjörnumynduð. Blöðin þekkjast frá ennar undangangandi, við að þau eru loðin, mjórri við neðri endann og djúptskiptari í broddinn. Rótarblöðin þett saman. Staungulblöðin 3 eðr 4 með aflaungum leppum. Blómstrtopprinu hefir 3 eðr 4 stór blómstur. Bikariun er sem á undangangandi, en minna snubbótt. Krónublöðin gullhvít, 3sinótt. Fræhúsið hálfst fyrir neðan bikarinn.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

o. Þríyddr Steinbrjótr (*S. tricuspidata*).

Rótarblöðin samsett, fleigmynduð, randhærð, hvöss, 3tennt. Staunglarnir uppstígandi. Blómstrin í klasa. Krónublöðin lensulík, 3svar leingri enn bikarinn.

Rótin augótt, greinótt. Staungullinn uppstígandi, sívalr, sléttr, í efri endann skiptr. Blöðin næstum lensulík, fleigmynduð, breiðari í broddinn, við að 2 stórar teunn standa beint út, þetlögð hvört ofanyfir annað á enum uppstígandi hluta staungulsins, missett á efra partinum. Blómstrin í klösum á laungum staunglum, stór, gul. Bikararnir litlir.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

p. Mosalíkr Steinbrjótr (*S. hypnoides*).

Blöðin strikmynduð, heil og óskipt. Renglurnar framáviðliggjandi. Staungullinn næstum blaðlaus. Krónublöðin sporeskjumynduð, aflaung.

Rótin með laungum annum. Staungullinn hálfur niðráviðliggjandi, hálfur uppreistr, neðri partur hans blöðóttur. Blöðin missett, hvöss, hærð. Þau neðri, samt blöðin á renglunum, strikmynduð, innáviðbeygð. Blómstratoppurinn útbreiddur, límugur. Krónurnar stórar. Bikarlepparnir hvassir, styttri enn krónublöðin, sem eru hvít, 3sinótt. Ávaxtarhúsið hálft fyrir neðan blómstrið.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- q. Fleigmyndaður Steinbrjótr (*S. cuneifolia* s. *punctata*). Blöðin fleigmynduð, snubbótt, hringbugðótt. Staungullinn blaðlaus. Blómstrin í einum toppi.

Rótin augótt. Staungullinn uppstígandi, við neðri endann blöðóttur, ofantil nakiinn, óskiptr. Blöðin eru í 2 krönsnum, breiðfleigmynduð, niðr-hlaupandi í 1 legg. Blöðin við blómstrin strikmynduð, hvöss, missett. Krónublöðin leingri enu bikarinn, snubbótt, aflaug, bleikrauð. Bikarblöðin beygð á bak aptr.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

### 3ja Orða (*Trigynia*) Þríkvæntar.

#### 5. Blöðrujurt (*Cucubalus*).

- a. Almennu Blöðrujurt (*C. behen*). Blómstrin lítandi, í einum toppi. Krónublöðin lítið klöfin. Bikarinn hart uppblásinn, netmyndaður-æðóttur. Blöðin lensulík. Staung-

ullinn upprèttir; ísl. Púnga-gras, Hol-  
urt, Hjartagrass.

Rótin þétt, aungótt, lítið greinótt. Staungl-  
arnir uppstígjandi við rótina, síðan uppréttir, grein-  
óttir, sléttir, sívalir, blágráir. Blöðin breið, lensu-  
lík, hvöss, slétt, blágrá, heil á röndum, við rótina  
þétt saman, næstum rekumynduð. Blómströppur-  
inn 2skiptr. Bikarinn hvítleitr, gagnsær, og gegu-  
umþrykktr með rauðleitum og grænum æðum.  
Krónublöðin hvít, optar án ginkrans. Ávaxtar-  
húsið lifrautt. Fræhúsið eggmyndað.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Urtin er sæmilig fóðr-urt. Blöð hennar eta  
menn sem kál, og sömulciðis rótina, hvaraf mala  
má mjöl. Blómstur hennar lækna kláða.

b. Stranda Blöðrujurt (*C. maritimus*).

Blómstrin næstum einstök á staungulendan-  
um. Krónublöðin klofin með ginkransi.  
Bikararnir uppblásnir, sléttir, netmyndað-  
æðóttir. Blöðin strikmynduð, lensulík.  
Staungullinn niðráviðleggjandi.

Urt þessi líkist mjög undangángandi. Rótin  
skrifðandi. Staunglarnir næstum framáviðliggjandi,  
marg-greinóttari enn á undangángandi, minni, færri  
blómstur. Blöðin mjórri á röndunum, smátenntarl.  
Krónublöðin djúpskiptari. Fræhúsið krínglótt.

Margra ára urt; blómstrar í ágúst og septbr.

*Nytsemi og verkun:* sama sem undangángandi.

6. Holurt (*Silene*).

- a. Staungullans Holurt (*S. acaulis*) utan staunguls. Blöðin strikmynduð, neðan randhærð. Blómstrstaunglarnir einstakir, fáblómstraðir; ísl. Lambagras, Holtarót, Hærðasægjur, Gulltoppr.

Rótin óskipt, laung; af henni spretta margar þéttar greinir, sem mynda gras-svörð. Blöðin þétt saman sitjandi, strikmynduð, umfaðmandi, opin með litlum kjöl; í enda greinanna sitr stuttr, sljór, 4strendr, fíun blómstr-staungull. Bikarinn klukkumyndaðr, 5klofinn. Krónublöðin ljósranð, augsjáanliga krónuð. Fræhúsið sívalt, leiugra enn bikarinn.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Rót mrtarinnar soðin fyrst leingi í vatni, síðan í mjólk, er sæmiligr matr. Eins má og rótina á glæðum steikja, og þannig með smjöri til matar hafa.

7. Stjörnujurt (*Stellaria*).

- a. Lánghnöppótt Stjörnujurt (*S. cerastoides*). Blöðin sporeskjumynduð, aflanug, snubbótt. Staunglarnir 2blómstraðir. Bikararnir Isinóttir, dúnhærðir.

Rótin skriðandi. Staungullinn framáviðliggjandi, útbreiddr, greinóttir við neðri endaun, blöðóttir í broddinn, sívalr, sléttr. Blöðin heil á röndum, lítið til einrar síðu. Bikarblöðin snubbótt, á röndunum hvíthymnótt, neðantil hærð. Krónu-

blöðin hvít, nær því tvöfaldt leingri enn bikarblöðin, lítið klofin eður djúpt randskorin. Ávöxturinn eggmyndaðr.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

- b. Tvíblómstruð Stjörnujurt (*S. biflora*). Blöðin alilík. Blómstrstaunglarnir 1- eður 2blómstraðir. Krónublöðin randskorin. Ávaxtarhúsið aflángt. Bikarinn rennóttir.

Rótin með sínum, laungum aungum. Staunglarnir niðráviðbeygðir, greinóttir, þèttblaðaðir. Blöðin mótsett, hvöss. Blómstrstaunglarnir í enda greinanna. Blómstrin lítil. Bikarinn eins stór og krónan, hvass. Krónublöðin hvít, lítið randskorin.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

### 8. Sandjurt (*Arenaria*).

- a. Þykkblöðótt Sandjurt (*A. peploides*). Blöðin eggmynduð, kjötlig, snubbótt. Bikararnir snubbóttir, sinalausir; ísl. Berjarfi, Smeðjukál, Fjöruarfi.

Rótin samanstendr af laungum, skríðandi, þræðilíkam aungum. Staunglarnir framáviðliggjandi, útbreiddir, greinóttir, slèttir, blöðóttir, lítið strendir. Blöðin mótsett, sitjandi, heil á röndum, heygð á bak apr, slètt, hryggjótt, hvass-strend, þètt saman. Blómstrin eru legglans í blaðhornunum. Bikarblöðin kjötlig, sporöskjulík, snubbótt. Krónublöðin rekumynduð. Fræhúsið næstum kúlumyndað. Við neðri enda hvörs dupthera, er einn

húnángskirtill, 3 hvöss ör. Fræin umsnúið-eggmynduð, stúngin, svört.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi má til matar brúkast, sem kál tilbúin.

- b. Margleggjuð Sandjurt (*A. multicaulis*). Blöðin eggmynduð, sínalaus, sitjandi, hvöss. Krónurnar stærri enn bikarinn.

Rótin með laungum aungum. Staunglarnir framáviðliggjandi, greinóttir, við neðri endanu uppstígandi, lángir. Blöðin kjöttlig, með einstökum fínum hárum við neðri endann, þétt saman á öllum staunglium. Á efri enda staungulsins er 1 eða 2 blómstur, á burstamynduðum staunglum. Bikarblöðin mikið hvöss, eggmynduð, fínsiuótt. Krónublöðin stór, hvít. Fræhúsin eggmynduð.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- c. Smákrónuð Sandjurt (*A. serpyllifolia*). Blöðin eggmynduð, nærri sitjandi, snörp. Bikararnir loðnir, 5sinóttir.

Rótin með fínum aungum; af hennu vaxa margir uppstígandi, stinnir, 3skiptir, greinóttir, stundum flatar, dúnhærðir staunglar. Blöðin smá, heil á röndum, þétt saman á miðjum staunglinum, hvassari í broddinn. Bikarblöðin eggmynduð, hvöss á röndum, stinn-hymnótt, þau inuri 3sinótt. Krónublöðin heil, styttri enn bikarblöðin. Fræhúsin eggmynduð. Fræin gul.

Eins árs urt; blómstrar í júní og júlí.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.



d. Randhærð Sandjurt (*A. ciliata*). Blöðin eggmynduð, sínótt, randhærð, hvöss.

Rótin með laungum augum. Staunglarnir útbreiddir, greinóttir, snubbóttir, 4strendir, á strendunum snarpir. Blöðin eggmynduð, lítil, kjötlig, mjórri neðan. Greinarnar 2blómstraðar. Bikarblöðin eggmynduð-lensulík, rennótt, sínótt. Á röndum hymnótt. Krónublöðin lítið stærri enn bikarinn. Fræhúsið aflángt.

Blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

4ða Orða (*Pentagynia*) fimmkvæntar.

9. Steinaurt (*Sedum*).

a. Beisk Steinaurt (*S. acre*). Blöðin missett, næstum eggmynduð, kjötlig, hnúskótt, aðvaxin-sitjandi. Blómstrskúfrið 2skiptr, blöðóttir; ísl. Helluhnoðri.

Rótin augótt. Staunglarnir framáviðliggjandi, þéttir, marggreinóttir, sléttir, sívalir, þétt-blöðóttir, einkum greinarnar. Blöðin missett, þökt, snubbótt, á innra borð samgróin við staungulinn, græn eða rauðleit. Krónublöðin fagr-gul, hvöss. Bikarblöðin snubbótt.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi er blóðhreinsandi, vessa þynnandi, uppleysandi, forrotnun mótistandandi. Hún verkar uppsölu og niðrgang. Hún er því góð mótiskyrbjúgi, nýrnasteini, kvefi, hósta, harðlífi, og

óhreinindum magans. Urtin ný, soðin í mysu, kann að brúkast, svo matspónum skipti, þartil hún verkar. Saft, pressað af urtinni, takist 2 teskeiðar í senn, hvörn hálfan tíma til uppsölu. Hér-  
aðauki er saftin, sem blóðhreinsandi meðal, gott meðal móti krabbameinum og slögum. Urtin þurk-  
uð, getr og brúkast í seyði, 2 matspænir í senn, hvörn tíma til þess verkar.

- b. Engelsk Steinaurt (*S. annuum s. anglicum*). Blöðin nærri missett, eggmynduð, kjötlig, hnúskótt, aðvaxin-sitjandi. Blómstrskúfrinn 2skiptr, blaðlaus.

Rótin augótt. Staunglarnir þéttir, útbreiddir, sléttir, blöðóttir, rauðleitir. Greinarnar upp-  
rættar. Blöðin missett, mótsett, blágrá, þétt sam-  
an. Blómstrskúfrinn klasalíkr. Blómstrin stutt-  
leggjuð, uppreist. Bikarblöðin snubbótt. Krónu-  
blöðin hvöss, hvít, hafa rauðan kjöl, og eru rauð-  
stúngin á broddinum. Fræhúsið slétt.

Eins árs urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

- c. Bjargsteinaurt (*S. saxatile s. rupestre*). Blöðin hálfsvöl, snubbótt, laus við neðri  
endann. Staungullinn greinótt, niðrávið-  
liggjandi.

Rótin augótt, lítið skrifandi. Staungullinn  
uppstígandi, greinótt við neðri endann, sívalr,  
blöðótt. Þau neðstu blöð skammvinn. Blöðin vaxa  
óreglugl, eru kjötlig, slétt. Blómstrin gul, sitja  
á bakaptrbeygðum greinum. Krónublöðin hvöss.  
Bikarblöðin styttri enn krónublöðin, snubbótt.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

- d. Loðin Steinaurt (*S. villosum*). Blöðin missett, strikmynduð, áviðflöt, hærð, einsog blómstrstaunglarnir. Staungullinn uppréttr.

Rótin með finum aungum. Staungullinn uppréttr, sívalr, sléttr, greinótttr, við neðri endann hærðr, í broddinn blöðótttr. Blöðin snubbótt, kjötlig, fínhærð, einkum þau efstu. Blómstrtopprinn skúfmynðaðr í staungulendanum. Bikarinn snubbótttr, límhærðr. Krónublöðin breið, snubbótt, hvít, með rauðum sinum. Fræhúsin hvöss, mjó, eggmynduð.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

- e. Hvít Steinaurt (*S. album*). Blöðin aflaug, sívöl, snubbótt, opin, slétt. Blómstrtopprinn greinótttr.

Rótin aungótt. Staungullinn skriðandi, neðan-til greinótttr, sívalr, sléttr, rauðleitr, þykkari um miðju enn við neðri endann. Blöðin slétt, kjötlig, flöt á efri hlið, þykkri í broddinn enn neðan, blá- eðr rauð-græn, þétt saman, einkum í greina-endunum. Blómstrtopprinn á staungulendanum, missett-greinótttr. Bikarblöðin lítil, slétt, krínglótt, snubbótt. Krónublöðin hvít, með rauðum strikum utanvert. Duptþræðirnir hvítir. Dupt-þnapparnir purpuralitir. Dupthyrzlau rauðleitr.

Margra ára urt; blómstrar í ágúst og septbr.

#### 10. Ljósberi (*Lychnis*).

- a. Aungótt-blómstraðr Ljósberi (*L.*

*flos cuculi*). Krónublöðin 4skipt. Fræhúsið næstum kúlumyndað; ísl. Múkahetta.

Rótin aungótt, greinótt. Staungullinn upprètt, strendr, skurðótt, liðótt, snarpr, utanvert dökkrauðr, ofantil límugr. Blöðin mótsett, neðantil samvaxin, mjó, lensulík, slètt. Blómstrklasinu í efri enda staungulsins upprètt, tvískipt. Bikariu sivalr, eggmyndaðr, dökkrauðr. Krónublöðin ljósrauð. Lepparnir misstórir, linir.

*Nytsemi og verkun:* Sæmilig fóðr-urt.

b. Límugr Ljósberi (*L. viscaria*). Krónublöðin óskipt. Fræhúsið órúmað.

Rótin lítið greinótt, aungótt. Staungullinn upprètt, liðótt, sivalr, slètt, undir liðunum límugr. Blöðin samvaxin við neðri endann, strikmynduð, lensulík, slètt, þètt saman, leingri við rótina. Blómstrstaungullinn þètt, í staungulendannum. Bikariu sivalr, hymnulíkr, rauðleitr. Krónublöðin fagr-rauð, lítið randskorin. Fræhúsið eggmyndað.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

c. Fjalla Ljósberi (*L. alpina*). Urtin slètt. Krónublöðin 2klofin. Blómstrin sitja í skýlumynduðu höfði; ísl. Kveisugras, Augnfræ.

Rótin þykk. Staungullinn upprètt, einstakr, óskipt, slètt, sivalr. Blöðin strikmynduð, alílk, skurðótt, hvöss, slètt, þètt saman við rótina, mótsett, umfaðmandi, fá á staunglinnum. Blöðin við blómstrin gagnsær, blómstrin þètt. Krónu-

blöðin án ginkrans, hvöss, fagr-rauð, lítið klofin.  
Urtin hefir 4 dupthyrzlur.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

# 11. Músareyra (*Cerastium*).

## a. Almeunt Músareyra (*C. vulgatum*).

Urtin límug, loðin. Blöðin eggmynduð.

Krónublöðin jafnlaung bikarblöðunum.

Blómstrin leingri enn blómstrstaunglarnir.

Rótin aungótt. Urtin bleikgræn. Staungullinn framáviðliggjandi, greinótt, sívalr, blöðótt. Blöðin sitjandi, snubbótt, eggmynduð, stundum mjó-eggmynduð, heil á röndum. Blómstrin sitja þar sem urtin skiptir sèr á smástaunglum, hvörra efstu eru leingstir. Bikarblöðin lensulík, hvöss á röndum, hymuótt, einkum þau innustu. Krónublöðin aflaung, randskorin, hvít. Fræhúsið sívalt, lítið bogið, leingra enn bikarinn. Fræin ójöfn, gul.

Eins árs urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

## b. Límugt Músareyra (*C. viscosum*). Urtin

límug, loðin, útbreidd. Blöðin lensulík, aflaung.

Rótin aungótt. Urtin öll laung, þèttþærð. Staunglarnir útbreiddir á allar sfömr, sívalir, blöðóttir, í endann skiptir. Blöðin mjórri við neðri endann, snubbótt; þèttust saman neðantil og í broddi staungulsins. Blómstrin sitja þar sem staunglarnir skipta sèr á leggnum, lítið leingri enn bikarinn, niðráviðbeygðir eptir blómstrunina.

Bikarblöðin lensulík, á röndum hvítgljáandi. Krónublöðin hvít, leingri enu bikarinn. Fræhúsið sívalt, áviðbogið, leingra enn bikarinn. Fræin hrukkótt.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- c. Fjalla Músareyra (*C. alpinum*). Blöðin sporeskjulík, nakiu og hærð. Blómstrtoppriu 2skiptr, fáblómstraðr, blöðótt. Fræhúsið aflángt, ábakaptrbeygt.

Rótin augótt, skríðandi. Á henni vaxa margir, þéttir saman, uppréttir, sívalir, við neðri endann sléttir, í broddinu hærðir, blöðóttir, óskiptir, fáblómstraðir staunglar. Blöðin mótsett, snubbótt, hærð eðr slétt, þétt, lítil við rótina, stærri og færri á staunglinum. Blómstrstaunglarnir lángir, hëumbil 3 á enda staungulsins. Blómstrblöðin lensulík, missett og mótsett. Bikarblöðin lensulík, hvöss á röndum, glansandi, hvít-hymuótt. Krónublöðin stærri enu bikarinn, hvít, umsnúðeggmynduð, lítið klofin. Fræhúsið tenut í broddinu.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- d. Breiðblöðótt Músareyra (*C. latifolium*). Blöðin sporeskjulík, suörp. Blómstrstaunglarnir í staungulendanum, óskiptir, næstum einstakir. Fræhúsið eggmyndað.

Rótin augótt. Af henni spretta margir hálfuppréttir, þéttblöðóttir, sívalir, íblómstraðir staunglar. Blöðin eggmynduð, sporeskjulík, umfaðmandi, þétt- og stinnhærð. Blómstrstaunglarnir jafnláugir staunglinum, stinnhærðir, sívalir,

Iblómstraðir án blómstrblaða. Bikarblöðin opin, snubbótt. Krónublöðin hvít, umsnúið-hjartmynduð. Fræhúsið eggmyndað.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

## 12. Skurfa (*Spergula*).

- a. Almenn Skurfa (*S. arvensis*). Blöðin í krönsum. Blómstrstaunglarnir niðrávið-beygðir eptir blómstrunartímann. Fræin úrumlík.

Rótin þétt, augótt. Staunglarnir liggjandi, ofantil uppréttir, greinóttir, opnir, sívalir, sléttir, liðóttir, lítið hærðir. Blöðin alilík, strikmynduð, slétt, hærð, vessafull, dökkgræn, skurðótt á neðra borð. Blómstrtopparnir í staungulendanum marg-blómstraðir, 2skipt-útstandandi. Blómstrstaunglarnir Iblómstraðir, dúnhærðir, uppréttir fyrir og um blómstrunartímann, en niðrhángandi eptirá. Bikarhlöðin hærð, hvít á röndum. Krónublöðin fleingri enn bikarinn, eggmynduð, hvít. Fræhúsið eggmyndað, leingra enn bikarinn.

Eins árs urt; blómstrar í júní, júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:* afbragðsgóð fóðr-urt.

- b. Görðótt Skurfa (*S. nodosa*). Blöðin mótsett, alilík, jöfn, þau efstu í bindinum. Bikarinn sinalaus.

Rótin augótt. Urtin ljósgræn. Staunglarnir þéttir, framáviðliggjandi, við efri endann uppstígandi, sívalir, þræðlíkir, þéttliðóttir, sléttir, fá-blómstraðir. Blöðin stutt, umfaðmandi, slétt,

stundum lítið hærð. Blómstrstaunglarnar einstakir, einblómstraðir, í efri staungulendanum, lútandi fyrir blómstrunartímaun. Bikarblöðin eggmynduð, hryggjótt, slètt, smánöbbótt. Krónublöðin hvít, leingri enn bikarinn. Fræhúsið ogsvo leingra enn bikarinn.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:* góð fóðr-urt.

c. Lángleggjuð Skurfa (*S. saginoides*).

Blöðin mótsett, alilík, brodd- og hára-laús.

Blómstrstaunglarnir einstakir, lángir, slèttir.

Urtin öll slètt. Rótin auugótt; af henni spretta margir upprèttir, framáviðliggjandi, í toppinn uppreistir, greinóttir, sívalir, blöðóttir staunglar. Blöðin hvöss, samvaxin við neðri endann. Blómstrstaunglarnir í staungulendanum einstakir, upprèttir, 1blómstraðir, næstum eins lángir og staungullinn. Blómstrin lútandi. Bikarblöðin eggmynduð, snubbótt, neðantil hnúskótt. Krónublöðin snubbótt, næstum sívöl, styttri enn bikarinn. Fræhúsin eggmynduð, optast einúngis 5 duptharar. Fræin nýrumlík.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.



## 12. H ó p r.

(*Icosandria*) bikarmannaðar.

1sta Orða (*Trigynia*) þríkvæntar.

1. Reynir (*Sorbus*). Bikarinn 5klofinn, yfirsitjandi. 5 krónublöð. Berið 3frævað.

2ur Orða (*Pentagynia*) fimmkvæntar.

2. Mjaðarurt (*Spiræa*). Bikarinn undirsitjandi, 5klofinn. 5 krónublöð. Fræhúsin 2rúmuð, margfrævuð.

3ja Orða (*Poligynia*) margkvæntar.

3. Krækla (*Rubus*). Bikarinn 5klofinn, undirsitjandi. Krónan 5blöðótt. Berið samansett af margfrævuðu korni.

4. Jarðarber (*Fragaria*). Bikarinn 10klofinn. Fræin nakin, fest við bermyndaðan, affallandi ávaxtarbotn.

5. Mura (*Potentilla*). Bikarinn 10klofinn. Fræin hrukkótt, nakin, strílaus.

6. Negulrót (*Geum*). Bikarinn 10klofinn. Fræin hafa knébogið strí. Ávaxtarbotnin stafmyndaðr.

7. Krákufótr (*Comarum*). Bikarinn

10klofinn. Fræin nakin, strílaus, viðfest njarðarvetti líkan, ullhærðan, ævarandi ávaxtarbotn.

8. Hármey (*Dryas*). Bikarinn 8- eður 10klofinn. 5 eður 8 krónublöð. Fræin hærð, hafa hala.

9. Blóðrót (*Tormentilla*). Bikarinn 8-klofinn. 4 krónublöð. Fræinn nakin, hafa eingan hala.

## 12. Hópr (*Icosandria*) bikarmannaðar.

### 1sta Orða (*Trigynia*) þríkvæntar.

#### 1. Reynir (*Sorbus*).

- a. Almennr Reynir (*S. aucuparia*). Blöðin ugguð, slètt á báðum hliðum; ísl. Reynir.

Urtin er trè meðalstórt. Bolrinn upprèttur, í toppinn greinóttur. Blöðin ójafnt-ugguð. Smáblöðin mótsett-sitjandi, aflaug, lensulík. nöbbótt við neðri endann, heil á röndum. Endablaðið stærra og leggjað, nývöxnu blöðin dúnhærð á neðra borð. Blaðstaungullinn rauðleitr, slèttur, á efra borðið röndóttur millum smábláðanna. Blómstrin sitja í stórri skúfmyndaðri, þétt-dúnhærðri hálf-skýlu á greina-endanum. Bikarlepparnir dúnhærðir. Krónublöðin hvít. Berin fagr-rauð, hærumbil 3frævuð.

Blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi er barkandi, þvagdrífandi og styrkjandi, getr því brúkast móti blóðlátum, lífsýki og blöðrusteini. Mauk af nýum berjunum takist 2 teskeiðir í senn. Seyði af berjunum drekkist, svo tebollum skipti, 3svar dagliga. Berin þurkuð, etin 10 á morgni og 10 á kvöldi, er gott meðal móti blöðrusteini.

2ur Orða (*Pentagynia*) fimmkvæntar.

2. Mjaðarurt (*Spiræa*).

- a. Almenn Mjaðarurt (*S. ulmaria*). Blöðin með millibílum uggótt, á neðra borð fýld. Það einstaka endablað stórt, flípótt. Blómstrin í skúf.

Rótin þykk, með skrífandi aungum. Staungullinn uppréttr, skurðótttr, sléttr, í toppinn greinótttr, blöðótttr. Smáblöðin eggmynduð, flípótt, á neðra borð hvítleit. Blaðstaunglarnir strikaðir, sléttir, lítið umfaðmandi. Blaðskúfrinn þétt- og margblómstraðr. Axblöðin aðskild frá hinum blöðunum, nær því krínglótt, tennt. Krónurnar litlar, hvítar.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Urtin er nokkuð barkandi, svitadrífandi, verk-eyðandi, græðandi; hún er því góð móti lífsýki, blóðsótt, blóðlátum og vondum sárum. Te bæði af blöðum og blómstrum hennar drekkist, svo tebollum skipti, 3svar dagliga, sem er gott móti holdfúa og vondum sárum, sæu þau í því þvegin.

Lita má með henni syrt, sè hún með ati seydd og ullartagi þarí á eptir soðið. Urtariunar blöð eru og góð að barka með skiun.

### 3ja Orða (*Poligynia*) margkvæntar.

#### 3. Krækla (*Rubus*).

- a. Frúrberjakrækla (*R. saxatilis*). Blöðin 3sett, slétt, við rótina nrtum líkar, skriðandi kræklur. Topprinn fáblómstraðr; ísl. Hrútaber, Skollareipi.

Rótin aungótt; á heuni vaxa margir blómstrberandi, stuttir, þyrniberandi, blöðóttir staunglar, og lanug, slétt, skriðandi, blöðótt, en ei blómstrberandi rôtarskot. Smáblöðin breiðeggmyndað, 2faldt-nöbbótt, á neðra borð hærð. Endablaðið leggjótt, hin önnur sitjandi. Blástaunglarnir blöðóttir, jafnláugir blaðinu. Blómstrin í efri enda staungulsins, 6 eðr 4 á hærðum staunglum. Bikarlepparnir lensulíkir. Krónublöðin aflaung, lensulík, hvít. Berið rautt, samanstendr af 4 eðr 5 kornum, sem eru fráskiliu hvört öðru og ei falla af til samans.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

#### *Nytsemi og verkun:*

Ber þessi eru barkandi, kælandi, vessaþynnandi, forrotnuu mótstandandi. Þau eru því góð móti hjartveiki, lífsýki og skyrhjúgi. Mauk af berjunum tilbúið takist 2 teskeiðar í senn, 4 til 6 sinnum dagliga, móti ofanuefndum sjúkdómum. Af berjunum má dropa þannig tilbúa: Tak af berjunum steittum eða mörðum 6 lóð, af sterku

brennivíni  $1\frac{1}{2}$  pela, lát á flösku og set í heitann sand í 3 dægur, sýa síðan hið þunna frá og geym. Af dropum þessum takist lítill matspörn, 3svar dagliga. Dropar þessir eru hjartastyrkjandi og maga, samt ágætir móti skyrhjúgi.

#### 4. Jarðarber (*Fragaria*).

- a. Almenn Jarðarber (*F. vesca*). Með laungum, skrifðandi kræklum. Blöðin 3sett, djúpnöbbótt.

Rótin með laungum aungum. Stanngullinn slètt, sívalr, upprètt, hærðr. Af rótinni spretta lángs með jörðu laung, þráðmynduð, blaðlaus, ófrjó rótarskot, af hvörjum aptr spretta nýar urtir, þar sem þær festast í jörðina. Blöðin lánleggjuð. Smáblöðin dökkgræn, hærð, með strikum á efra borðið, á neðra borðið æðótt, bleikari við neðri enda, heil á röndum. Blaðstaungullinn loðinn og hefir við neðri endann 2 lensulík, heil á röndum, slètt axblöð, sem eru samgróin við hann. Blómstrin sitja í hálfskýlu. Krónublöðin styttri en bikarinn, næstum krínglótt, hvít. Ávöxturinn eður sá kjötligi ávaxtarbotn rauður, eggmyndaður, kúllíkr, hefir nakin fræ.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi er nokkuð barkandi, þvagleiðandi, blóðhreinsandi. Te af blöðunum drekkist, 1 lítill tebolli í senn. Ber urtarinnar eru hlóðhreinsandi, þvagleiðandi, græðandi, styrkjandi, forrotann mótstandandi, uppleysandi. Þau eru því góð móti

óstyrk magans, matar-ólyst, þvagstemma, iktsýki, brjóstveiki og steini í nýrum og blöðru. Þau uppleysa hraðberg á tönnum og bæta munnfýlu. Þau etast ný með lítlu af mjólk, eðr, hvað betra er, með víni og sykri, móti iktsýki og brjóstveiki, skal af þeim mikið eta í senn. Riddari *Linné* kvaðst hafa etið fullan disk af þeim móti iktsýki og fótaveiki sinni. Mauk af berjunum tilbúið með sykri takist 2 teskeiðar í senn, hvörn annann tíma. Það er bül stórt, að þessi ágætu ber ei kunna hér í landi, sem erlendis, í sæðgörðum ræktast, enda munu fáir reynt hafa.

#### 5. Mura (*Potentilla*).

- a. Gæsar-Mura (*P. anserina*). Blöðin í millibilum uggótt, nöbbótt, á neðra borð silkihærð. Staunglarnir skrífandi. Blómstrstaunglarnir einblómstraðir; ísl. Mura, Murusóley, Mýrutágar.

Rótin með laungum aungum. Staunglarnir skrífandi, framáviðliggjandi, þráðmyndaðir, blöðóttir, hærðir, rauðleitir. Blöðin stuttleggjuð, liggja flöt á jörðu, verða hvítleit, þá urtin sprettr í þurri leirjörð. Smáblöðin hvass- og djúpuöbbótt, snubbótt, á neðra borð silfrglansandi. Blómstrstaunglarnir einstakir, í blaðhornunum, sívalir, hærðir. Bikarinn með 9 eðr 10 leppum, silfrglansandi hærðr. Krónan gul.

Marga ára urt; blómstrar í júní og júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Urtin er barkandi, svitadrífandi, uppleysandi,

styrkjandi. Hún er því góð móti lífsýki, blóðlátum og gigt. Seyði af rótarblöðum takist 2 matspænin, eðr hálfir tebolli í senn, hvörn 3ja tíma. Ræturnar eru til manneldis hafðar með því móti, að þær seyðast fyrst í vatni, síðan í mjólk. Líka má þurka þær og síðan mala til mjöls og brúka með mjöli í brauð og granta. Lögur blaðanna vandliga pressaðr og seyddr síðan með álúni, gefr grænan lit, sè ullartægi þarí á eptir soðið.

- b. Vor-Múra (*P. verna*). Rótarblöðin 5sett, fleigmynduð, nöbbótt, strikótt, randhærð, stinn. Staungulblöðin 3sett. Staungullinn niðráviðbeygðr.

Staunglarnir upprétt-framáviðliggjandi, grelnóttir, hærðir, blöðóttir. Blöðin stinn. Rótarblöðin lángleggjuð, með 3klofnum smáblöðum. Þau efstu heil á röndum, hærð. Blómstrstaunglarnir í staungulendanum 1blómstraðir, uppréttir. Bikarinn hærðr. Krónublöðin gul, randskorin.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

- c. Gullmúra (*P. aurea*). Rótarblöðin 5sett, umsnúð-eggmynduð, fúnskorið-nöbbótt, hærð, næstum hymnulík. Staungulblöðin 3sett. Staunglarnir næstum uppréttir.

Rótin greinótt, skáhöll. Staunglarnir framáviðliggjandi, uppstígjandi, greinóttir, hreystaðir neðantil, blöðóttir. Blöðin glansandi, snubbótt, við rótina lángleggjuð. Staungulblöðin sitjandi, þau efstu einstök sitjandi, opt mótsett. Blómstrin eru í bladhornunum í staungulendanum, á laungum, sívölum, hærðum, 1blómstraðum blaðstaungl-

um. Bikarlepparnir lensulíkir. Krónublöðin um-  
snúið-eggmynduð, leingri enn bikarinn, rauðgul.  
Fræin hrökkótt.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

### 6. Negulrót (*Geum*).

- a. Engja Negulrót (*G. rivale*). Rótarblöð-  
in strikmynduð. Axlablöðin hvass-iunskorin.  
Blómstrin lútandi. Fræstrfin skurðótt,  
snúin; ísl. Fjalldæla, Fjallafífill,  
Sólsekvía.

Rótin sívöl, eðr greinótt, lítið vatnsflöt með  
hlíðaranngum. Staungullinn uppréttr, í toppinn  
greinótt, blöðótt, hærðr, dökkleitr. Rótarblöðin  
með millibilum uggótt, stundum 3sett. Endablaðið  
stærra enn hin önnur. Öll smáblöðin næstum  
krínglótt, iunskorin, nöbbótt, hærð, lítið rykkt.  
Staungulblöðin sitjandi, 3sett, eðr 1stök-3skipt.  
Blómstrin sitja í greina- og staungulendunum á  
lútandi staunglum. Bikarlepparnir misstórir, utan-  
til dökkir. Krónublöðin hafa kjötlit, eru stund-  
um hvít. Fræstrfið hujábeygt um miðjuna, krók-  
myndað í endanu.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Urtin er barkandi, styrkjandi, köldueyðandi,  
svitaleiðandi, forrotunin mótstandandi. Hún er því  
góð móti lífsýki og í landfarsóttum, einkum að  
styrkja krapta eptir þær. Hún er og góð móti  
matar-ólyst, blóðsótt, og til að strá í illaluktandi



sár. Rót hennar brúkast einkauliga bæði í seyðum og duppti. Af seyðinu er mátuligt að taka 2 matspæni í seunu hvört dagsmark. Af dupptinu litla teskeið eins opt.

### 7. Krákufótr (*Comarum*).

- a. Mýra Krákufótr (*C. palustre*) með 5-sinóttum, nöbbóttum blöðum; ísl. Engjarós, Mýratág, Blóðsóley.

Rótin laung, skriðandi. Staunglarnir neðantil liggjandi, uppstígandi, blöðóttir, sívalir, sléttir, eður lítið hærðir. Blöðin langleggjuð. Smáblöðin aflaug eður umsnúið-eggmynduð, nöbbótt, á efra borð dökkgræn, á neðra borð gráleit. Bláðstaunglarnir hymuóttir neðantil, hálf-umfaðmandi. Blómstrin sitja í enda staungulsins, næstum í einum toppi. Blómstrbikarlepparnir hvassir, dökkvir, 5 stærri, 5 minni. Krónablöðin dökkrauð, minni eun bikarinn. Ávöxturinn eggmyndaður, samsettr af litlum stuttum fræum.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Með urtinni má rautt lita, einkum ull, þó ei fagr-rantt.

### 8. Hármey (*Dryas*).

- a. Nöbbótt-blöðótt Hármey (*D. octopetala*). Blöðin nöbbótt; ísl. Rjúpnalýng, Rjúpnalauf, Holtasóley, Pétarsóley.

Rótin trélik. Staunglarnir liggjandi, lítið

grelnóttlr. Grelnarnar þéttblöðóttar, uppréttar, sléttar. Blöðin leggjuð, eggmynduð, á röndum beygð á bak aptr, djúpnöbbótt, snubbótt, dökk-græn, slétt á efra, en hvít, fýld á neðra borð. Blómstrið stórt, sitr einstakt á laungum fýldum og sívölum staunglum á greina og staungulendanum. Bikarinn Sleppóttur, hærðr, hefir kyrtla. Krónublöðin 8, heil á röndum, snubbótt, hvít, stærri enu bikarinn. Fræstríin láughærð.

Margra ára urt; blómstrar í ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi hefir barkandi og styrkjandi krapt. Hún brúkast því móti lífsýki og blóðsótt. Seyði af blöðunum takist inn 2 matspænin í senn, 4 sinnum dagliga. Blöð urtariunnar, ásamt með Blóðbjörg og Vallhumli er gott og heilnæmt te, það styrkir magann og brjóstið.

9. Blóðrótt (*Tormentilla*).

- a. Uppreist Blóðrótt (*T. erecta*). Staungullinn næstum uppréttur, greinóttur. Blöðin sitjandi.

Róttin trélik. Staunglarnir neðst uppstígandi, ofantil uppréttir, greinóttir, sívalir, hærðir, rauðleitir. Blöðin 3sett, breið, lensulík, djúpnöbbótt, hærð. Axlablöðin innskorin. Blómstrstaunglarnir lágir, þráðmyndaðir, mótsettir, einblómstraðir. Blómstrbikarsins leppar 8, eggmyndað-lensulskir, hvörra 4 eru stærri, 4 minni. Krónublöðin umsnúið-hjartmynduð, gul, dekkri við neðri endann. Fræin hrukkótt.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Elgi mega menn taka urt þessa fyrir Burní-rót, hvör af nokkrum vaðbekkjandi kallast Blóð-rót. Blóðrótin er lítil urt með gulu blómstri, lík Sóley. Blóðrót hefir barkandi, þvagleiðandi og styrkjandi krapt. Seyði hennar, einkum af blöðunum, hálfri peli í senn, er einkargott móti lífsýki og þvagstemma. Dupt af rótinni stillir nasa-blöð í nef tekið; ítem er gott að strá í vessafull og illaluktandi sár. Barka má skinn með seyði af urt þessari, sæu þau í það lögð.

### 13. H ó p r.

(*Polyandria*) margmannaðar.

1sta Orða (*Monogynia*) einkvæntar.

1. Svefnurt (*Papaver*). Bikarinn 2-blöðóttr, affallandi. Fræhúsið 1rúmað með opnum holum undir örinu.

2ur Orða (*Polygynia*) margkvæntar.

2. Fræstjarna (*Thalictrum*). Einginn bikar. 4 eðr 5 krónublöð. Fræin halalaus.

3. Smjörblómstr (*Ranunculus*). Bikarinn 3- eðr 5-blöðóttr. Krónublöðin 5, með hunángaþerandi nöglum. Mörg nakin fræ.

4. Kúablóm (*Caltha*). Einginn bikar.  
5 krónublöð. Einginn hunángshyrzla.

13. Hópr (*Polyandria*) margmaunaðar.

1sta Orða (*Monogynia*) einkvæntar.

1. Svefnurt (*Papaver*).

a. Skaptleggjuð Svefnurt (*P. nudicaule*).

Skaptið einblómstrað, nakið, stinnuhært.

Blöðin hálfugguð, bugðótt; ísl. Melasól.

Rótið laung, greinótt. Skaptið upprétt, sívalt. Blöðin lánleggjuð, stjinnuhærð. Lepparnir snubbóttir. Blástaunglarnir flatar, hærðir. Bikarblöðin affallandi, aflaug, loðin, dökkleit. Krónublöðin snubbótt, slétt, krínglótt, ljósgul, stór, eptir urtarinnar stærð.

Margræða urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi hefir svæfandi, verkeyðandi og stillandi kragt. Hún er því góð móti svefnuleysi, stríðum verkjum og sinatægjum. Af smáskornum blómstrum urtarinnar má dropa tilbúa á þennan hátt: Tak blómstrin smáskorin 6 lóð, gott sterkt hvítt vín  $1\frac{1}{2}$  pela, lát standa í viku við yl, sýa síðan hið þunna frá og geym. Þaraf takist 1 eður 2 teskeiðar í senn eptir þörfum.

2ur Orða (*Polygynia*) margkvæntar.

2. Fræstjarna (*Thalictrum*).

a. Fjalla Fræstjarna (*T. alpinum*). Staung-

ullinn óskiptr, nær nakinn, með óskiptum

klasa í broddinum; ísl. Vèlindisurt, Krossgras, Júfrsmein, Brjósta-gras, Kverkagras.

Rótin samanstendr af dökkleitum aungum. Staungullinn upprètt, þvínær þráðmyndaðr, einblaðaðr, slètt. Rótarblöðin lánleggjuð, 2faldu-gguð. Smáblöðin krúglótt, 3klofin, slètt, stinn, á röndunum beygð á bak aptr; gráleit á neðra borð. Blómstrin leggjuð, lútandi. 4 gulleit hvöss krónublöð. Duptberarnir gulir. Örin sitjandi, dúnuð. Fræin jöfn.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* góð fóðr-urt.

### 3. Smjörblómstr (*Ranunculus*).

- a. Bítandi Smjörblómstr (*R. acris*). Bikararnir opnir. Blómstrleggirnir sívalir. Blöðin 3svar-margskipt; þau efstu strikmynduð; ísl. Brennisóley.

Rótin samanstendr af mörgum laugum aungum. Staungullinn í toppinn greinótt, slètt, sívalr, settur með aðþryggtum hárum, lítið blöðótt. Blöðin djúpt, 3- eðr 5skipt. Miðleppriinn venjula-  
liga 3klofinn. Rótarblöðin lánleggjuð, þau efstu blöð sitjandi, strikmynduð. Blómstrstaunglarnir hærðir án skurða, íblómstraðir. Bikarblöðin bugðótt, snubbótt, loðin. Krónublöðin næstum krúglótt, glausandi, gul, einkum á innri hlið. Hmángshreystrið randskorið.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi er þauvæn, því ei til innvortis brúkunar. Blómstur hennar, viðlögð húðina, þena til að brenna af skiinnið og draga undir sig blöðrur. Þó er ei gott að láta leingr viðleggja ein þartil vel roðnar, þá sè frátekið, og mun blaðra koma upp á eftir. Í mörgum sjúkdómum eru blöðrudragandi meðöl nýtsamlig, svo sem iksýki í útlimum, auguveiki, heyrnarleysi, dofa, máttleysi, tökum, svima, brjóstveiki, og til að eyða æxlum.

- b. Mýra Smjörblómstr (*R. hederaceus*).  
Blöðin nýrumlík, krínglótt, 3- til 5-flípótt,  
heil á röndum, jöfn. Staungullinn skrið-  
andi.

Rótin aungótt. Staunglarnir framáviðleggjandi, skriðandi, greinóttir, sívalir. Blöðin lánleggjuð, missett, þykk, þarsem staunglarnir skipta sèr mótsett. Blómstrin mótsett blöðunum, eðr í greinahornunum, einstök, lítil, leggjuð. Krónublöðin fleingri ein bikarinn, hvít. Duptberarnir 5 til 10. Fræin hrukkótt.

Margra ára urt; blómstrar í júní, júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

- c. Skriðandi Smjörblómstr (*R. reptans*).  
Blöðin strikmynduð. Staungullinn skriðandi.  
Rótin með laungum aungum. Staungullinn neðantil liggjandi, í broddinn upprétt, þræðilíkr, þykkblöðótt. Við liðina blöðum- og rótum-skjótandi. Blómstrastaunglarnir spretta milli blað-

anna, láugs eptir urtnni, en ei einungis í brodd-  
inum. Þeir eru fínir, uppréttr, 1blómstraðir.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Öll hin sama sem Bitandi Smjörblómstrsins.

- d. Ísa-Smjörblómstr (*R. glacialis*). Blöð-  
in 3sett. Smáblöðin 3skipt, margklofin.  
Staungulblöðin sitjandi. Staungullinn 3-  
blómstraðr. Bikarinn stinnhærðr; ísl.  
Dvergásóley.

Rótin samanstendr af þéttu hneppi lángra,  
þykkra ánga. Staungullinn uppréttr, blöðótt, sí-  
valr, sléttr, óskiptr. Blöðin lánleggjuð, sléttr,  
nokkuð þykk, með snubbóttum leppum. Þan efstu  
blöð sitjandi. Blómstrin stór, sitja á staungul-  
endanum á rauðleitum staunglum. Bikarblöðin egg-  
myndað, rauðleit, einkum í broddinu. Krónublöð-  
in stærri en bikarinn, rauðleit, hvít, á röndinni  
fínt, rykkt, hríngnöbbótt.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- e. Snjó-Smjörblómstr (*R. nivalis*). Blöð-  
in 5slipótt, heil á röndum. Staungulblaðið  
sitjandi, fíngmyndað. Staungullinn 1blóm-  
straðr; ísl. Dvergásóley.

Rótin samanstendr af mörgum laungum aung-  
um. Staungullinn uppréttr, óskiptr, fáblöðótt,  
1blómstraðr sléttr. Rótarblöðin lánleggjuð, 3-  
til 5slipótt, sléttr. Á staunglinnum vaxa 2 blöð, hvörra  
hið neðra, sem þó er ofar en á miðju hans, er  
sitjandi, 5skipt, með lensulíkum leppum; það efra

óskipt, lensulíkt. Blómstrið lítið, og er í staungulbroddinum. Bikarblöðin jafnstór krónublöðnum, eggmynduð, hol; snubbótt, hærð. Krónublöðin 5, aflaug, gul.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- f. *Lapplenzkt Smjörblómstr* (*R. Laponicus*). Blöðin 3skipt, flípótt, snubbótt. Staungullinn næstum nakinn, einblómstraðr.

Rótin aungótt. Staungullinn, hvörra margir þó opt spretta á einni rót, þræðlíkr, upprætt, slætt, óskiptr, optast blaðlaus, 1blöðótt. Blöðin við rótina lángleggjuð, djúpt-3skipt. Lepparnir hríngnökkóttir, slættir. Staungulblaðið, sem þó opt vantar, því nær sitjandi. Blómstrið lítið á staungulendanum. Bikarinn venjuliga 3blöðótt. beygðr á bak aptr, slætt, gulr. Krónublöðin hvöss, jafnstór bikarinn, gul.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- g. *Þríflípótt Smjörblómstr* (*R. hyperboreus*). Blöðin djúpt-3flípótt. Flíparnir aflángir, útspanaðir. Staungullinn þráðmyndaðr, skrífandi.

Urtin öll slætt. Rótin aungótt. Staungullinn framáviðliggjandi, skrífandi, einfaldr, stundum lítið greinótt, blöðótt. Blöðin djúpt-3skipt, með heilrönduðum, snubbóttum leppum, lángleggjuð. Blómstrið á staungulendanum, á þráðmynduðum stanngli. Krónan og bikarblöðin mjög lítil, gul.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.



*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

- h. Skríðandi Smjörblómstr (*R. repens*).  
Bikarblöðin opin. Blómstrstaunglarnir skurðóttir. Blöðin samansett. Urtin hefir skríðandi renglur.

Rótin augótt. Staunglarnir uppréttir, greinóttir, hærðir, einkum neðan, hvar þeir ogsvo eru bláleitir. Af rótinni spretta lángr, skríðandi, blöðóttar renglur. Blöðin 3sett, leggjuð. Smáblöðin 3skipt, nöbbótt, þau efstu heil á röndum. Blómstrstaunglarnir hærðir. Bikarblöðin hvítleit, bugðótt, hærð. Krónublöðin gul, á innri síðu glansandi.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

- i. Vatna Smjörblómstr (*R. aquatilis*).  
Blöðin niðri vatninu hárumlák, fyrir ofan vatnið skjöldmynduð; ísl. Lónasóley.

Rótin augótt. Staunglarnir niðrsökkur eður sveimandi, sívalir, sléttir, blöðóttir. Blöðin leggjuð, þau efstu sveimandi, nýrumlák eður krínglótt, 3flípótt, iunskorin, slétt; þau neðstu samansett af þræðilákum, hvössum flípum. Blómstrstaunglarnir mótsettir blöðnum. Blómstrin hvít, gul á miðju. Fræja hrökkótt.

Margra ára urt; blómstrar í júní, júlí og ágúst.

4. Kúablóm (*Caltha*).

- a. Almennu Kúablóm (*C. palustris*), með nýrumlákum, tenntum, mótsettum blöðum; ísl. Lækjasóley, Hófblaðka, Hófgresi.

Rótin vatnsflöt, með laungum aungum. Staungullinn uppstígandi, slöttur, sívalr, greinóttur, blöðóttur, skurðóttur. Blöðin snubbótt, neðan hjartmynduð, slött, æðótt, þau neðstu lánleggjuð, þau efstu sitjandi. Bláðstaunglarnir slöttir, strendir. Blómstrin á greina- og staungulendanum, á upp-röttum, einblómstruðum staunglum. Krónublöðin stór, opin, fagr-gul.

Margra ára urt; blómstrar í maí og júní.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi er lítið barkandi og hreinsandi; hennar helzta nytsemi er því, að hennar nýu blöð, lögð á sár, hreinsa þau og græða. Hin útsprúngnu blómstur lögð á húðina draga undir sig blöðru eðr brenna, en það skal þá að hörundinu snúa, sem uppeit á blómstrunum. Blómstrin soðin með vatni og álúni gefa gulan lit.

## 14. H ó p r.

*(Didynamia)* tvímecktugar.

Ista Orða (*Gymnospermia*) nakin-  
frævaðar.

1. Thymían (*Thymus*). Bikarmunninn lokaðr með hárum.

2. Tvítönn (*Lamium*). Gynið beggjamegin tennt.

3. Hanasarpr (*Galeopsis*). Efri-vörin ávöl, sú neðri ofanvert 3tennt.

4. Blákolla (*Prunella*). Allir dupthberarnir eru 2klofnir í broddinn.

2ur Orða (*Angiospermia*) hafa innilokuð fræ.

5. Hanatoppr (*Bartsia*). Bikarinn litaðr. Fræhúsið 2rúmað. Fræin strend.

6. Hanakambr (*Rhinanthus*). Bikarinn búkmikill. Fræhúsið 2rúmað. Fræin samanþrykkt, flöt, þökt.

7. Augnafró (*Euphrasia*). Fræhúsið 2rúmað. Fræin rennótt. Dupthnapparnir þyrnóttir.

8. Tröllaurt (*Pedicularis*). Fræhúsið 2rúmað. Fræin broddótt. Krónan grímumynðuð. Hjálmrinn samanþrykktr.

9. Skarnurt (*Limosella*). Fræhúsið hálf-tvífúmað. Krónan klukkumynduð, nær því jafnskipt.

14. Hópr (*Didynamia*) tvímeztugar.

1sta Orða (*Gymnospermia*) nakinfrævaðar.

1. Thymían (*Thymus*).

a. Villi Thymían (*Th. serpyllum*). Blómstrin í einu höfði. Staunglarnir framáviðliggj-

andi. Blöðin flöt, eggmynduð, snubbótt, við neðri endann randhærð; ísl. Blóðberg, Hellinhagra, Bráðbjörg E. O.

Rótin smágreinótt. Staunglarnir framæviðliggjandi, lítið lírislóttir, mikið greinóttir, blöðóttir, lítið dúnhærðir. Blöðin stuttleggjuð, heil á röndum, gagnsær, stúngin, dökkgræn. Blómstrhöfuðið sitr í græna- og staungulendanum. Bikarinn rennóttir, stúngiun. 2 neðri tennurnar stærri, randhærðar. Bikarginið er lokað með hvítum hárum eptir blómstrunartímann. Krónurnar ljósrauðar.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Þessarar alþektu urtar kraptr er hjarta- og sína-styrkjandi, þvag- og tíðir-leiðandi, vessaþynnandi, blóðhreinsandi. Af því urt þessi er lítil, brúkast hún öll, blómstr, blöð og leggir. Seyði urtarinnar má ei leingr sjóðast, en svari drukklaugri stund, vegna þeirra sínu parta er annars vilja burtfljúga. Af því drekkist lítil tebolli í senn, 2svar dagliga, móti tíðateppu, þvagstemmu, niðrfallssyki, kvefi, harðlífi, hjarteyeki og svefnleysi. Þaraðauki bætir hún lukt í húsum, og lögð milli fata ver hún flóm og möl.

## 2. Tvítönn (*Lamium*).

- a. Rauð Tvítönn (*L. purpureum*). Blöðin hjartmynduð, snubbótt, leggjuð, þau efstu þètt.

Rótin með laungum aungum. Staunglarnir lið-

óttir, greinóttir, sléttir, neðan skrifðandi. Blöðin breitt-hjartmynduð, hríng- og ójafnt-nöbbótt. Bláð-staunglarnir á neðri síðu ávalir, á efri síðu holir. Blómstrkransarnir sitja í staungul- og greinatoppinum í bláðhornunum á uppmjókkandi ferstrending, verða blómstrin minni eftir sem þau sitja hærra. Bikarinn svartleitr með hvössum, randhærðum tönnum. Krónan purpurarauð með dekkri rennum, og ljósari rauðum blettum á efra borði neðri vararinnar.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

- b. Hvít Tvitönn (*L. album*). Blöðin hjartmynduð, hvöss, leggjótt. Kransarnir með 20 blómstrum.

Rótin skrifðandi. Staungullinn upprétt, hærðr, sérdeilis í broddinn. Blöðin hærð, djúpnöbbótt. Blómstrin eru í mörgum krönsum. Blómstrstaunglarnir optast lifrauðir einsog neðri endi bikarsins, og sá partr staungulsins, sem kransarnir sitja á. Krónurnar stórar, uppreistar, hvítar. Hjúlminna mjúkhærðr. Bikarinn klukkumyndaðr, með burstalíkum, randhærðum tönnum. Dupthnapparnir sívalir, hafa gul strik á sér.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi er allgóð fóðr-urt. Í Svíþjóð brúkast hennar uryöxnu blöð í kál-stað.

### 3. Hannasarpr (*Galeopsis*).

- a. Smáblöðótt Hannasarpr (*G. ladanum*). Staungulmillibilin milli blómstr-kransana

jafnþykk. Blöðin lensulík, lítið nöbbótt, stinnhærð. Krónuhjálmrinn óljóst-hring-nöbbótt.

Rótin greinótt. Staungullinn upprètt, greinótt, sett nokkuð stinnum, lítið á bakaptrbeygðum hárum. Blöðin lensn- eðr eggmynduð-lensulík, leggjuð; þau efstu sitjandi. Blöðin við blómstrin strikmynduð, hafa glansandi brodd. Blómstrin sitja í krönsum í staungul- og greina-toppinum. Bikarinn lítið klukkumyndaðr, leðinn, með hvössum stíngandi tönnum. Krónan ljósrauð með hvítum blettum.

Eins árs urt; blómstrar í júlí og ágúst.

- b. Almennur Hannasarpr' (*G. tetrahit*). Staungullinn stinnhærðr. Staungul-millihilin milli blómstrkransana, ofanvert þykkri. Krónan 2faldr stærri en bikarinn. Hjálmrinn næstum rætt.

Rótin anngótt. Staungullinn upprètt, greinótt, allavega sett stinnum, næstum stíngandi hárum, lítið ábakaptrbeygðum. Líðirnir þykkir, þèthærðari en hinu partr staungulsins. Blöðin eggmynduð-hjartalík, leggjuð, hvöss, nöbbótt, stinnhærð. Bikarinn mjög stinnhærðr, með hvössum, stíngandi tönnum. Krónan stór, hefir mjóa hvíta pípu, rauðan hjálm, og rauðhvítblettútta neðri vör. Blómstrar í júlí og ágúst.

#### 4. Blákolla (*Prunella*).

- a. Almenn Blákolla (*P. vulgaris*, s. *officinalis*). Öll blöðin eggmynduð, aflaug, leggjuð; ísl. Brúnella.

Rótin anugótt, lítið skriðandi. Stanugullinn uppstígandi, strendr, slètt, eðr með einstöku hárum, neðantil greinótt. Blöðin snubbótt, lítið hærð, óljóst-tennt. Blómstrin sitja í staungul- og greina-endunum, í aflaunga höfði eðr axini, sem hefir 2 blöð við neðri endann. Blöðin við blómstrin nýrumlík, hjartmynduð, hvest-rand-hærð. Bikars efrivörin breið, 3teunt, sú neðri mjó, klofin. Krónurnar lifrauðar eðr hvítar. Hjúlmurinn ávalr yfir duptherrannum.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi hefir hreinsandi og dreifandi krapt. Seyði af urtarinnar blöðum er gott að skola með hálsinu móti kverkabólgu.

2ur Orða (*Angiospermia*), hafa innilokuð fræ.

5. Hanatoppr (*Bartsia*).

- a. Fjall-Hanatoppr (*B. alpina*). Blöðin mótsett-hjartmynduð, eggilík, með snubbóttum hnöppum. Duptherrarnir loðnir; ísl. Lokasjóðsbróðir.

Rótin skriðandi, görðótt. Stannglarnir upp-rèttir, óskiptir, blöðóttir, strendir, hærðir. Blöðin sitjandi, hrukkótt, snubbótt, dökkgræn, á neðra borð hærð, þau efstu lifrauð. Blómstraxinið sitr á staungulendanum. Bikarinn línugr, hærðr, hvass-leppótt, lifrauðr. Krónan dökklifrauð með beygðri pípu. Dupthnapparnir og dupthyrzlan loðin. Fræhúsið eggmyndað.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

6. Hanakambr (*Rhinanthus*).

- a. Almennur Hanakambr (*R. crista galli*). Krónunna efri vör ávöl, randskorin, 2tennt, ennar neðri miðleppr mikið stuttur. Blöðin lensulík, slétt; ísl. Lokasjóðr, Öskugras, Peníngagras.

Rótin aungótt. Staungullinn uppréttr, strendr, slétt, í toppinn greinótt. Blöðin sitjandi mótsett, hvassnöbbótt, og blöðin við blómstrin eggmynduð-lensulík, hvassnöbbótt, jafnlaung blómstrbikarnum, við neðri endann lítuð, lítið suörp. Blómstr-smástaunglarnir mikið stuttir. Bikarinn lítið flatþrykktr, uppblásinn, einkum eptir blómstrunartímann, ljósgulr, samanhnepptr í munnaun. Krónan 2faldr leingri eun bikarinn, gul; efri vörið blá í broddinn; dupthnapparnir loðnir. Fræhúsið ásamt með viðvarandi bikarnum er, þá fræið tekr að þróast, mjög hymnulíkt, þurt, hvörsvegna þá hrært er við urtinni að heyrir sem skráfi eðr hringli í henni, hvaraf sum útlend nöfn hennar eru dreginn. Fræin hymnulík, vængjuð.

Eins árs urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi er mýkjandi og lítið samandragandi. Hún brúkast því móti hósta, gulu, lifrabólgu og lífsýki. Te af urtinni drekkist, svo tebollum skipti, 3svar dagliga. Blómstr urtarinnar með álúni soðin gefa gulan lit.

7. Angnafró (*Euphrasia*).

- a. Almenn Angnafró (*E. officinalis*). Blöð-



in eggmynduð, strikótt, hvasstennt; ísl. Augnagras.

Rótin auggótt. Staungullinn uppréttr, greinótt, rauðleitr, hærðr. Greinarnar blöðóttar, jafn háar staunglinum. Blöðin stuttlleggjuð eðr sitjandi umfaðmandi. Staungulblöðin mótsett; greina-blöðin missett. Blómstrin sitjandi eðr stuttlleggjuð, í efstu bláðhornunum missett. Krónurnar hvítar, með lifrauðum rennum, og gulu gini. Þó finnst tegundir urtarinnar sem eru alhvítar, aðrar aptr rauðar með dökkum rennum. Fráhúsið unnsúðið-egg- eðr hjart-myndað.

Eins árs urt; blómstrar í júlí, ágúst og septbr.

*Nytsemi og verkun:*

Þessi litla urt vex í vallendis brekkum, hefir samandragandi, barkandi og styrkjandi kragt. Seyði af urtinni er gott að leggja við vot og svíðandi augu. Dropar tilbúnir af urtinni eru magastyrkjandi og slími eyðandi. Af þeim takist 2 teskeiðar í senn, og þaræð urtin er svo lítil, tekur maðr hana alla og þurkar.

### 8. Trölla-urt (*Pedicularis*).

- a. Skóga Trölla-urt (*P. sylvatica*) hefir marga óskipta staungla á einni rót. Bikarinn aflánger, strendr, sléttr, misjafnt fleppótt, innskorinn.

Rótin auggótt, toppmynduð, greinótt. Staungullinn uppréttr, strendr, hærðr, blöðótt. Þau ueðstu blöð hreystruð, eggmynduð, ljósgræn. Blöðin djúpt hálfeggjuð, þétt saman. Blómstrbikarinn

æðóttir, en á hönnu eru þó hvorki stúngur né hár. Krónan stór, dökkrauð. Neðri vararflíparnir ekki randhærðir. Fræhúsið samanþrykkt. Skaptið hálf-eggmyndað, í endanu stúgandi, líkist fuglanesi.

Eins eðr 2ja ára urt; blómstrar í júlí.

- b. Eldgul Trölla-urt (*P. flammea*). Staungullinn óskiptr. Blöðin teunít, hálfugguð, snubbótt. Lepparnir þaktir, hríngnöbbóttir.

Rótin hnöllótt, toppmyndað. Staungullinn upp-rèttir, slèttir, blöðóttir, dökkrauðr. Blöðin þètt saman, helzt við rótina, leggjuð, djúpt inuskorin á hliðunum, lensulík. Lepparnir eggmyndaðir, hafa þannig leggi, að efri rönd annars flíppans hylr neðri rönd hins. Blöðin fá á staunglinum. Blómstraxinið langt, samanþrykkt. Bikarinn renn-óttir, aflánger, nokkurnveginn slèttir. Krónan laung, þunn. Efrivörin innklípa í broddinn, dökkrauð; sú neðri lítil, dökkgul.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

### 9. Skarnurt (*Limosella*).

- a. Litla Skarnurt (*L. aquatica*). Blöðin lensulík, lánleggjuð, snubbótt. Blómstrin niðr við rótina.

Rótin aungótt, af henni spretta skrífandi rótarskot. Blöðin við rótina uppreist, heil á röndum, slètt. Blómstrstanugaruir ogsvo við rótina, margir saman, mjög stuttir, íblómstraðir. Blómstrin mjög lítil. Bikarinn slèttir. Krónan ljósrauð-

hvítleit, stoppótt, ójafnt skipt. Duptberarnir styttri enn krónan.

Eins árs urt; blómstrar frá júní mánuði til september.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

## 15. H ó p r.

(*Tetradynamia*) fjórmegtugar.

1sta Orða (*Siliculosa*), hafa breiðan og stuttan skálp.

1. Alblað (*Subularia*). Litli skálprinn heill á röndum. Blöðkurnar eggmyndaðar, holar, mótsettar milligirðingunni.

2. Gæsablóm (*Draba*). Litli skálprinn heill á röndum. Blöðkurnar flatar, snúa einsog milligirðingin.

3. Þúngurt (*Thlapsi*). Litli skálprinn randskorinn, umsnúið-hjartmyndaðr. Blöðkurnar rendótt-hryggjóttar.

4. Skeiðarurt (*Cochlearia*). Litli skálprinn nær því heill á röndum, keistr, hrukkótt, tvíblöðkótt, margfrævaðr.

5. Strandbúi (*Cakile*). Litli skálprinn

lensulíkr, tvíliðótttr. Liðirnir einfrævaðir, þeir efstu affallandi.

2ur Orða (*Siliquosa*), er hafa lánga skálpa.

6. Hlaupblaðka (*Cardamine*). Lánga skálprinn hleypr í sundr, eður opnar sig með fjöðurkrapti, með ábakaptrundnum blöðkum. Arið heilt. Bikarblöðin lítið opin.

7. Opinblaðka (*Sisymbrium*). Lánga skálprinn gapandi, með röttum blöðkum. Bikarinn opin.

8. Gæsamatr (*Arabis*), fjórir ábakaptrbeygðir kirtlar fyrir neðan bikarblöðin. Lángskálprinn strikmyndaður, görðótttr.

15. Hópr (*Tetradynamia*) fjórmegtugar.

1sta Orða (*Siliculosa*), hafa breiðan og stuttan skálp.

1. Alblað (*Subularia*).

a. Vatns-alblað (*S. aquatica*). Blöðin allífk, styttri enn skaptið.

Rótin augótt, hvít. Skaptið upprétt, óskipt, lítið bugðótt, nær því hálfu leingra enn blöðin, slétt, optast niðri vatni, hvar urtin vex. Blöðin öll við rótina, slétt, hvöss, lítið niðráviðbeygð. Blómstrin eru í klasamynd á stauungulendanum á

stuttum staunglum. Krónublöðin eggmynduð, hvít. Smáskálprinn aflánger, slètt. Fræin gul.

Eins árs urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

## 2. Gæsablóm (*Draba*).

- a. Vörgæsablóm (*D. verna*). Skaptið nak-  
ið. Krónublöðin klofin. Blöðin lensulík,  
lítið innskorin, stinnhærð.

Rótin með finnum aungum. Sköptin uppreist lítið hærð, sívöl. Blöðin þétt saman, öll við rótina, nöbbótt, eðr lítið innskorin í efri endann, heil á röndum, mjórri við neðri endann, og sett klofaum hárum. Blómstrin eru í hálf-skýlumynduðum klösum á skaptendanum. Blómstrstaunglarnir missettir, opnir. Ávaxtarleggriun niðráviðbeygð. Bikarblöðin eggmynduð, opin á röndunum, rauðleit. Krónublöðin skipt nær því að miðju. Litli skálprinn sporeskjumyndaðr, slètt, snubbótt, hefir viðvarandi axin, sem sitja á efri enda hans.

Eins árs urt; blómstrar í mají og júní.

- b. Múrara Gæsablóm (*D. muralis*). Staungullinn greinótt. Blöðin hjartmynduð, tennat, stinnhærð. Skálprinn sporeskjumyndaðr, snubbótt, flatr.

Rótin aungótt. Staungullinn upprètt, greinótt, blöðótt, sívalr, lítið snarpr. Blöðin missett, sitjandi, umfaðmandi, nöbbótt, stinnhærð. Blómstrin lítil í mörgum klösum á litlum staunglum, sem verða leingri þá urtin blómstrar. Krónublöðin

heil á röndum, umsnúð-eggmynduð, hvít. Smáskálprinn aflánger, sléttir.

Eins árs urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

- c. Stríhært Gæsablóm (*D. hirta*). Staungullinn fáblöðóttir. Blöðin aflaug, hvöss, tenní, lítið stríhærð. Smáskálparnir skáhallir, leggjóttir.

Rótin nokkuð laug, óskipt. Af henni spretta margir uppréttir, óskiptir, einblöðóttir staunglar. Blöðin þétt saman, við rótina gráleit. Staungulblaðið sitjandi eggmyndað, optast fast við staungulinn fyrir neðan miðju hans. Blómstrin eru í stuttum klasa á staungulendanum. Krónublöðin randskorin. Smáskálprinn nokkurnveginu sléttir.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

- d. Ljósgrátt Gæsablóm (*D. incana*). Staungulblöðin mörg, ljósgrá, sett stjörnumynduðum hárum. Smáskálparnir skáhallir, aflángir.

Rótin laug, greinótt, augótt. Staungullinn uppréttir, greinóttir, gráhærðr, sívalr. Blöðin sitjandi, eggmynduð-lensulík, innskorið-tennótt. Blómstrin þétt saman á staungul- og greina-endunum í hálfskýlumynduðum-klösum. Bikarinn loðin. Krónublöðin hvít, randskorin. Smáskálprinn lítið snúinn, hvass, hefir stutta dupthyrzlu.

2ja ára urt; blómstrar í júlí.

### 3. Þúngurt (*Thlapsi*).

- a. Almenn Þúngurt (*Th. bursa pastoris*)

er stríhærð. Smáskálparnir mýraraspaðamýndaðir, umsnúð-hjartmýndaðir. Rótarblöðin hálfugguð; ísl. Púngarfi, Hjartarfi.

Rótin óskipt, þráðmýnduð. Staungullinn upprètt, greinótt, blöðótt, neðantil sívalr, ofanvert strendr. Rótarblöðin mörg saman, innskoriu, tennt. Staungulblöðin missett, umfaðmandi, hjartmýnduð, neðantil nær því heil á röndum. Blómstrstaunglarnir missettir í klösum, þeir neðri leingri enu hinir. Krónublöðin hvít. Smáskálparnir sléttir, hafa viðvarandi dupthyrzlu.

Eins árs urt; blómstrar nær því allt sumarið.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi hefir styrkjandi og samandragandi kragt. Sè fræi urtariunar blandað í brauðgerð, fær brauðið sætan smekk, en verður þarvið seinna til mæltúgar.

b. Eugja Púngurt (*Th. campestre*). Smáskálparnir kransmýndaðir, stúngnir, ofantil rendóttir. Blöðiu skeytilík, tennt, ljósgrá.

Rótin greinótt. Staungullinn upprètt, greinótt, dúnhærðr, þèttblöðótt. Blöðin missett, sitjandi, umfaðmandi, dúnhærð, á röndum fá og smátennt. Blómstrin lítil, og eru saman í greiuóttum klösum. Krónublöðin hvít, aflaug. Smáskálprinnu nær því krúglótt, í broddinu breiðrandaðr.

2ja ára urt; blómstrar í júlí.

4. Skeiðarurt (*Cochlearia*).

a. Almenn Skeiðarurt (*C. officinalis*).

Rótarblöðin nær því krúglótt. Staungulblöðin aslaung, lítið bugðótt. Skálprinn nær því kúlmýndaðr; ísl. Skarfakál.

Rótin nær því toppmynduð, lítið greinótt, aungótt. Staunglarnir við rótina framáviðliggjandi, í toppinn uppréttir. Á stórum urtum beint uppréttir, greinóttir, strendir, bugðóttir, blöðóttir, slèttir. Blöðin slètt, kjötlig. Rótarblöðin lágleggjðuð, mörg saman, stundum nýrumlkf. Staungulblöðin sitjandi, missett, strend, stundum hafa þau einúngis eina stóra tönn hvörjumegin hliðar, stundum eru þau margtenut. Þau efstu heil á röndum, umfaðmandi. Blómstrin sitja í hálfskýln á staungul- og greina-endunum. Verða leingri og klasamyndaðri eptir blómstrunartímann. Bikarblöðin snubbótt, mjórri eun króunblöðin. Króunblöðin stærri eun bikarinn, umsnúð-eggmynduð, heil á röndum, hvít. Skálprinn hrukkótt. Dupt-hyrzlan viðvarandi.

Eins árs urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi er hið ágætasta meðal móti skyrbjúgi. Hún er þaraðanki uppleysandi, svitadrífandi, þvagleiðandi og blóðhreinsandi. Hún er því góð móti öllu þykku og stöðnuðu blóði. Drífr tíðir kvenna, og hreinsar síra og staðnaða vessa líkamans. Urtin hrá etin er einukar gott meðal móti skyrbjúgi. Dropa af blöðum og blómstrum hennar má þannig tilbúa: Tak af nýum söxuðum blöðum og blómstrum hennar 8 lóð, sterkasta breunivín 24 lóð, blanda saman, og lát standa



við il í viku, síá síðan hið þunna frá og geym. Af dropum þessum takist hálftr spónblað í senn, 4sinnum dagliga. Urtin er eitt hit hollasta kálmeti til nautnar er fást má.

### 5. Strandbúi (*Cakile*).

- a. Þykkblöðótttr Strandbúi (*C. maritima*). Skálparnir eggmyndaðir, 2uggaðir, Ifrævaðir. Blöðin kjötlig, tennt, hálfugguð.

Rótin augótt. Staungullinn uppstígandi, við neðri endann opt niðráviðliggjandi, sívalr, kjötligr, slötttr, bugðótttr. Blöðin missett, stuttleggjuð, þykk, slött, blágrá, þau efstu nær því heil á röndum. Blómstrin í þéttri hálfskýlu á staungul- eðr greina-endunum. Bikararnir neðantil búkmyndaðir. Krónublöðin lifrauð, nokkuð stór, nmsnúiðfleigmynduð.

Eins árs urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Um blómstrunartímann er urtin velluktandi.

2ur Orða (*Siliquosa*), er hafa lánga skálpa.

### 6. Hlaupblaðka (*Cardamine*).

- a. Engja Hlaupblaðka (*C. pratensis*). Blöðin uggótt; uggarnir eðr smáblöðin á þeim neðstu krúglóttir. Á Staungulblöðunum lensulíkir; ísl. Hrafnaklukka, Kattarbalsam, Lambaklukka.

Rótin lítið hnöllótt, hefir marga hliðaránga. Staungullinn upprötttr, rötttr, óskiptr, sívalr, slötttr, neðantil rauðleitr. Rótarblöðin lúngleggjuð, slött.

Stauugublöðin stuttleggjnd, með leusnlikt-strikmynndnum smáblöðum. Blómstrin eru í stannnglendanum í stórri hálfskýlu, hvör þá nrtin tekr að frævast, verðr klasamynduð. Bikarblöðin lítil, snubhótt, eggilíkt-strikmynduð. Króunblöðin stór, útbreidd, ljósrauð, randskorin. Lángiskálpriun uppreistr.

Margra ára nrt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi er magastyrkjandi, blóðhreinsandi, uppleysandi, þvag- og tíðir kvenna leiðandi, ormdrepandi; hún er því góð móti óstyrk magans, skyrhjúgi, kreppasótt, miltis og lifrarbólgu, þvag- og tíða-teppu og ornum í maga. Te af blöðum urtarinnar skal því í ofantöldum tilfellum brúkast, svo te bollum skipti, 4sinnum dagliga. Í samblandi með horblöðku eykst kraptr hennar. Ei er ráðligt að láta óléttar kounr hrúka þessa nrt.

b. Eggblöðótt Hlaupblaðka (*C. bellidifolia*). Blöðin óskipt, eggmynduð, heil á röndum. Blaðstauugullinn þpörtum leingri enn blöðin.

Rótin smágreinótt. Stannglarnir uppréttir, óskiptir, sléttir, nærri blaðlausir. Blöðin breitt-eggmynduð, lík hjarta. Blaðstauugullinn stundum leingri enn stauugullinn. Stauugublöðin sitjandi. Blómstrin fá saman, stundum líka einstök á stauuglinum. Krónurnar hvítar, leingri enn bikarinn. Lángiskálpriun stundum jafulánger stauuglinum.

Margra ára nrt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

c. Stinnhærð Hlaupblaðka (*C. hirsuta*).

Blöðin uggótt, hafa eingin axlablöd. Smáblöðin krínglótt-aflaug, innskorin, leggjótt.

Rótin aungótt, lítið skriðandi. Staungullinn upprètt, greinótt, blöðótt, strendr, hærðr. Greinarnar stuttar. Blöðin ójafnt-ugguð, einhærð. Smáblöðin sem eru á neðstu blöðunum eru kríngulleit. Þau á efstu blöðunum þarámót eggmynduð, lensulík. Blómstrin eru í þéttum klasa í staungulendanum og fá á greinunum. Krónurnar hvítar, litlar. Lángskálprinn uppreistr, hærðr.

Eins árs urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

d. Steinhlaupblaðka (*C. petraea*). Blöðin aflaug, tennt.

Rótin toppmynduð, lítið aungótt. Staungullinn margskiptr. Blöðin mörg saman við rótina, aflaug, snubbótt, 2- eðr 3tennt. Staungulblöðin missett, 2tennt, þau efstu lensulík, heil á röndum. Krónublöðin 4-eggmynduð. Krónurnar hvítar.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

7. Opinblaðka (*Sisymbrium*).a. Mýra-opinblaðka (*S. palustre s. islandicum*). Lángskálparnir niðráviðbeygðir, afláugt-eggmyndaðir. Blöðin hálf-uggótt.

Krónublöðin styttri enn bikarinn.

Rótin óskipt, nær því toppmynduð. Staungullinn upprètt eðr uppstígandi, greinótt, blöðótt, skurðótt, slètt. Blöðin missett, þau neðstu

neðantil uggótt, ofantil hálf-uggótt, eitt endablað er þó stærst, hvaraf blöðin sýnast hörpumynduð. Lepparnir ójafnt-nöbbóttir. Blómstrin í þunn-um klösum. Krónublöðin gul. Láungskálparnir beint útstandandi, slèttir.

Margra ára urt; blómstrar allt sumarið.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- b. Beiska-opinblaðka (*S. amphibium terrestre*). Láungskálparnir niðráviðbeygðir, leggjóttir. Blöðin aflaung, lítið nöbbótt; þau neðri óskipt, þau efri hálfuggótt; ísl. Hrafnaklukka með gulu blómstri.

Rótin með laungum aungum, opt skriðandi. Staunglarnir skriðandi, við neðri endann uppstíga-ndi, linir, bugðóttir, skurðóttir, blöðóttir, slèttir, í toppinn greinuóttir. Blöðin missett, aflaung-lensu-lik; þau neðstu óskipt; þau efstu hálfuggótt. Blómstrin sitja í laungum klösum, er spretta á efri blaðhornunum, eður staungulendanum. Bikar-blöðin gulleit. Krónublöðin umsnúð-eggmynduð, gulleit. Skálpleggirnir lágir, beint útstandandi.

Blómstrar í júl og ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi er uppleysandi, magastyrkjandi, vessaþyunnandi, ormdrepandi. Hún brúkast því móti skyrbjúgi, gigt og ornum. Te af blómstrum eður blöðum hennar drekkist, svo tebollum skipti, 4sinnum dagliga.

8. Gæsamatr (*Arabis*).

- a. Fjalla-Gæsamatr (*A. alpina*). Blöðin aflaung, lensulík, umfangandi, hvasstenut.

Rótin toppmynduð. Staungullinn upprèttur, óskiptr, blöðóttur, smálærðr. Rótarblöðin stundum á stannglum. Staungulblöðin snubbótt, stinnlærð, grágræn. Blómstrin sitja í klasa á staungulendanum. Krónublöðin snubbótt, hvít. Lángskálparnir flatir, þunnir, strikmyndaðir, lítið innáviðbeygðir. Utan á blöðkunnar sæst gjörla hvar fræin spretta.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

## 16. H ó p r.

(*Monadelphia*) samvaxnar.

1sta Orða (*Decandria*), með tíu frjófum durtberum.

1. Storkanef (*Geranium*) einkvænt. Ávöxturinn 5kornóttur, hefir bert ábakaptrbeygt nef.

16. Hópr (*Monadelphia*) samvaxnar.

1sta Orða (*Decandria*) með 10 frjófum durtberum.

1. Storkanef (*Geranium*).

- a. Dökkt Storkanef (*G. fuscum s. montanum*). 2 blómstristaunglar saman, mótsettir blöðunum. Krónublöðin heil á röndum, á bakaptrbeygð; ísl. Stóra-blágresi.

Rótin þykk. Staunglarnir óskiptir, neðan toppmyndaðir, skiptir, uppréttir, sívalir, blöðóttir, hærðir. Blöðin hendilik, margskipt, 7 eðr 8 leppótt, hærð, stinn. Rótarblöðin lánleggjuð. Staungulblöðin missett, þau efstu sitjandi, 3skipt. Blómstrstaunglarnir mótsettir blaðinu. 1blómstraðir. Blómstrblöðin hymnulík, lítil. Bikarblöðin hærð, sporeskjumyndað. Krónublöðin krínglótt, ábakaptrbeygð, dökkrauð, flöt, heil á rándum.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

b. Skóga Storkanef (*G. sylvaticum*).

Blómstrstaunglarnir 2blómstraðir, næstum hálfskýlumyndaðir. Blöðin hafa 7 leppa, eru innskorin-nöbbótt. Fræhúsin hærð. Duptberarnir alilfíkir; ísl. Storkablágresi, Litunargras.

Rótin þykk, hnöllótt. Staungullinn upprétt, greinótt, blöðótt, sívalr, fínhærðr. Blöðin lánleggjuð við rótina. Staungulblöðin missett, sitjandi, mjúkhærð. Blómstrstaunglarnir uppréttir. Blómstrblöðin lensulík, mjög lítil. Bikarblöðin 3sinótt, hafa stutt strí. Krónublöðin stór, lifrauð eðr hvít, æðótt, randskorin, neðantil hærð. Duptþræðirnir hymnulfíkir, rendóttir, neðantil randhærðir.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Kraptr þessarar urtar er barkandi og styrkjandi. Seyði af blöðum hennar inutekið, 1 spónblað í senu, er því gott í lífsýki. Það eyðir og

innvortis blöðrusteini og hvítum klæðaföllum. Útvortis brúkast það að væta í lúnskaf, og leggja yfir illaluktandi og vessafull sár. Með blómstrum hennar má lifrautt lita, sèu þau soðin með álúni. Með blöðunum má lita svart, sèu þau soðin með ati, eðr ryðguðu jární, samt dálitlu af sýru. Seyðinu sè síðan afhellt, og ull þarí á ný soðin.

- c. Engja-Storkanef (*G. pratense*). Blómstrstaunglarnir 2blómstraðir. Blöðin 7skipt, inuskorin; nöbbótt. Fræhúsin öll hærð. Duptberarnir neðantil múraraspaðamyndaðir.

Urt þessi líkist mjög enni undangangandi, en er þó stærri, þéttara dúnhærð, og efstu hárin kirtlum sett. Blöðin djúpskiptari, hvassari, mjórri, leppótt, tennt. Blómstrstaunglarnir eptir blómstrunartímann beygðir á bak aptr. Bikarblaðastríð leingra. Krónublöðin stærri, bláleitari.

Blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

## 17. H ó p r.

(*Diadelphia*) tvískiptar.

Ista Orða (*Octandria*) áttmannaðar.

1. Mjólkur-urt (*Polygala*). Bikarinn hefir 2 vængmyndaða leppa. Krónumerkið sívalt. Belgrinn umsnúð-hjartmyndaðr, 2-rúmaðr.

2ur Orða (*Decandria*) tímannaðar.

2. Flatbelgr (*Lathyrus*). Dupthyrzlan yfirborð slètt, ullhært.

3. Umfeðmíngsgras (*Vicia*). Dupthyrzlan hefir skegg undir arinu.

4. Ertr (*Pisum*). Dupthyrzlan á yfirborðið hryggjótt, ullhærð.

5. Kerlíngartönn (*Lotus*). Belgrinn sívalr, fullr af fræi.

6. Krínglubelgr (*Anthyllis*). Bikarinn uppblásinn, innilokar einn krínglóttan belg.

7. Smári (*Trifolium*). Belgrinn ei leingri enn bikarinn, ein- eðr tví-frævaðr, ekki sundrhlaupandi, affallandi.

17. Hópr (*Diadelphia*) tvískiptar.

1sta Orða (*Octandria*) áttmannaðar.

1. Mjólkur-urt (*Polygala*).

a. Almenn Mjólkur-urt (*P. vulgaris*). Krónurnar í klösum og hafa kamb. Staunglarnir óskiptir, framáviðliggjandi. Blöðin strikmynduð, lensulík.

Rótin greinótt, trèlsk. Af henni vaxa margir útbreiddir, slèttir, sívalir, þèttblöðóttir staunglar, sem neðan eru sameinaðir. Blöðin missett, eðr



útdreifð; þau neðri eggmynduð, minni, heil á röndum, hvöss, lítið innáviðbeygð, slètt. Blómstrlu eru í einum klasa á staungulsendanum. Krónurnar bláar, hvítar, lífrauðar, eðr rauðleitar, hafa innan-til eitt kambmyndað, ljósara blað. 2 bikarblöðin eru stærri enn hin önnur, eins lit og krónan.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Urtin er þvagleiðandi, svitadrífandi og opnandi. Hún er því góð móti vatnsýki, gulu og bólgu í undirlífsins kirtlum. Seyði af rótinni takist, 2 matspæmir í senn, hvöru klukku tíma. Urtin er einnör hin ágætasta fóðr-urt fyrir naut og sauði.

**2ur Orða (*Decandria*) tímannaðar.**

**2. Flatbelgr (*Lathyrus*).**

- a. Gulr Flatbelgr (*L. pratensis*). Klasa-  
leggirnir margblómstraðir. Blöðin unggött,  
og hafa á sér nokkur lensulík smáblöð.

Rótin laung, fín, lítið skriðandi. Staunglarnir veigalitlir, liggjandi eðr uppstígandi, með bindþráða styrk, greinóttir, blöðóttir, slèttir, hvasshyrndir. Blöðin missett, leggjótt. Smáblöðin næstum sitjandi, hvöss, slètt, sínótt, smárauðhærð. Blaðstaungullinn endar í bindþræði, sem er lángur, bæði skiptr og snúinn. Klasaleggirnir 3faldt leingri enn blöðin, og bera 8 til 12 missett blómstur. Bikarinn hærðr. Krónurnar gular. Belgrinn uppreistr.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Urtin er góð fóðr-urt. Í dýrtíð hafa menn brúkað fræ hennar til brauðgerðar með mjöli.

3. Umfeðmíngsgras (*Vicia*).

- a. Músar-Umfeðmíngsgras (*V. cracca*). Klasaleggirnir margblómstraðir. Blómstrin þökt. Smáblöðin lensulík, dúnhærð. Axlablöðin hálfkeytilík, nærri heil á röndum; ísl. Umfeðmíngsgras, Flækja, Samflettingr, Krókagras.

Rótin skriðandi. Staungullinn klifrandi, velgalítill, greinótt, strendr, blöðótt. Blöðin missett í mörgum þörum, jafut uggótt, hafa skiptan bindþráð. Smáblöðin missett, smámjókkandi. Klasaleggirnir í blaðhornunum nærri jafulángir blöðunum. Klasinn lángur, boginn, þéttblómstraðr, svo hvört blómstrið liggr við annað. Blómstrin ísfðu lifrauð. Bikarinn dökkur. Belgrinn slétt.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Urtin er góð fóðr-urt. Fræ hennar með mjöli í brauði er gott og velsmakkandi.

4. Ertr (*Pisum*).

- a. Stranda-ertr (*P. maritimum*). Bláleggirnir flatir ofan. Staungullinn strendr. Axlablöðin skeytilík. Blómstrstaunglarnir margblómstraðir; ísl. Baunagras.

Rótin skriðandi, þykk. Staunglarnir framáviðliggjandi, hvass-4strendir, sléttir, bugðóttir, blöðóttir, rauðleitir. Blöðin ugguð með 2- eðr 3skipt-

um bindþráðum. Smáblöðin eggmynduð, slétt, heil á röndum, snubbótt, missett. Þau yztu minni en þau við neðri endann. Axlablöðin lítið tennt í neðri endann. Blómstrin eru í klösnum, nærri jafulaung blöðunum, margblómstruð í blaðhornunum. Bikarinn slétt. Krónan fagr-lifrauð. Belgirinn samanþrykktr.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi er allgóð fóðr-urt. Blöð hennar hafa í húngrsneyð verið til manneidis notuð.

### 5. Kerlingartönn (*Lotus*).

- a. Almenn Kerlingartönn (*L. corniculatus*). Blómstrhöfuðið niðráviðþrykkt, margblómstrað. Staunglarnir framáviðliggjandi. Belgirnir sívalir, opnir.

Rótin laung, trélik, með hliðar-aungum, hvará eru litlir huútar. Af henni spretta margir útbreiddir, greinóttir, sléttir staunglar. Blöðin missett, stuttleggjuð, 3fest. Smáblöðin eggmynduð, heil á röndum, á neðra borð blágræn. Axlablöðin eggmynduð, nærri eins stór og smáblöðin. Blómstrstaunglarnir eru í blaðhornunum á sívölum leggjum. Undir blómstrhöfðinu er eitt 3fest blað. Blómstrin stuttleggjuð. Krónurnar gular, fyrir blómstrunartímann rauðleitar. Merkið ábakþræbeygt. Belgirnir sléttir. Fræin nýramynduð.

Margra ára urt; blómstar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Urtin er góð fóðr-urt. Með blómstrum hennar má lita falliga gult.

6. Krínglubelgr (*Anthyllis*).a. Gulr Krínglubelgr (*A. vulneraria*).

Blöðin unggótt. Smáblöðin misstór. Höfuðið 2faldd.

Rótin greinótt, trélik. Af henni spretta margir framáviðliggjandi, uppstígjandi, sívalir, fínhærðir, greinóttir, blöðóttir stanugar. Blöðin missett. Smáblöðin aflaung, heil á röndum, missett á neðri blöðunum, fá, hafa eitt endablað, sem er 2faldd stærra en hin önnur. Rótarblöðin stundum einföld. Á efri blöðunum eru smáblöðin nær því jafnstór. Blómstrhöfuðið nærri kúlumyndað, sitr á greina- og staungul-endanum. Undir höfðinu eru hendilík blómstrblöð. Krónurnar fagr-gular. Bikarinnu hymnulíkr, fínhærðr.

Margra ára urt; blómstrar í júní, júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Urtin er góð fóðr-urt. Með blómstrum hennar má lita gult.

7. Smári (*Trifolium*).a. Hvítr Smári (*T. repens*). Blómstrin í skýlumynduðum höfðum. Belgirnir 4frævaðir. Efstu bikartennurnar sléttar. Smáblöðin eggmynduð, aflaung, randskorin, suubbótt. Staungullinn skrífandi; ísl. Smári, Smæra.

Rótin anngótt. Stannglarnir útbreiddir, greinóttir, sléttir, blöðóttir. Blöðin lánleggjuð. Smáblöðin umsuúð-hjartmynduð, dökkgræn, opt með hvítri þverrák. Blómstrhöfuðs leggirnir eru í blað-

hornunum uppreistir eðr uppstígandi, lelugri enn blaðstaunglarnir. Blómstrhöfuðið nær því kúlumyndað. Þær neðri krónur opt niðráviðbeygðar, hvarfyrir höfuðið sýnist að vera þverskipt. Bikararnir sléttir. Krónurnar hvítar, sitja visnaðar á bikarunum. Belgriau aflánger, slètt, 4frævaðr.

Margra ára urt; blómstrar allt sumarið.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi er mýkjandi, drifandi og verkeyðandi. Hún er því góð móti bólgu, ígerðum, brjóstveiki og galu. Te af blöðum hennar drekkist, svo tebollum skipti, 4sinnum dagliga. Af blómstrum og blöðum urtariunnar gjörast mýkjandi grantar, eru þeir eiðkar góðir til að dreifa bólgu, og til að gjöra út meinsemdir. Rótin smáskorin, seydd í mjólk, er góð og hollr matr.

b. Rauður Smári (*T. pratense*). Blómstraxinin þètt saman. Staunglarnir uppstígandi. Krónurnar misjafnt skiptar. Þær 4 bikartennr jafnláugar. Axlablöðin leggjótt.

Rótin greinótt, aungótt; af henni spretta margir neðantil uppstígandi, sívalir, greinóttir, blöðóttir, sléttir staunglar. Blöðin aflaug, þau efstu mótsett, og eru uppundir axininu. Smáblöðin aflaug, eðr eggmynduð-aflaug, heil á röndum, hvöss, slètt, og hafa venjulega, einsog á hinu undaugángandi, 2 hvítar rákir. Axlablöðin eggmynduð, samgróin, hafa stutt, fínt strí á endanum, og eru hymnulík með rauðum æðum. Axinin sitjandi á staungul- og greina-endunum, eggmynduð, sívöl, snubbótt. Bikarinn hærðr. Tennurnar

burstamyndaðar, sú neðsta mikið leingri enn hina. Krónan íblöðótt, lifrauð. Belgrinn krínglótt, slètt.

Margra ára urt; blómstrar á sumrum.

*Nytsemi og verkun:* sama sem undangangandi.

- c. Hara-Smári (*T. arvense*). Axinin loðin nærri sívöl. Bikartennurnar burstalíkar, leingri enn krónan. Smáblöðin umsnúð-eggmynduð, strikmynduð.

Rótin aungótt. Staungullinn upprètt, greinótt, blöðótt, sívalr. Blöðin stuttleggjuð, þètt-hærð. Þau efstu sitjandi í axlablaðinu, strikmynduð, samgróin. Axinin spretta á staungul- og greina-endunum, og eru snubbótt, rauðgrá. Bikartennurnar jafulágar. Krónurnar rauðhvítar. Belgrinn lítill, einfraevaðr.

Eins árs urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:* sama sem undangangandi.

## 19. H ó p r.

(*Syngenesia*) pípumannaðar.

1sta Orða (*Polygamia æqualis*) jöfn sambúð.

1. Ljónstönn (*Leontodon*). Ávaxtarbotninn nakinn. Þelið leggjótt, óskipt. Bikarinn þaktr með línu hreystri.

2. Pètrsurt (*Apargia*). Ávaxtarbotn-

inn nakinn, stúnginn. Þelið fjaðrað, sitjandi, misjafnt skapt. Bikarinn þaktr.

3. Fagrkolla (*Hieracium*). Ávaxtarbotninn nær því nakinn, stúnginn. Þelið óskipt, sitjandi. Bikarinn þaktr, eggmyndaðr.

4. Þistill (*Carduus*). Bikarinn búkmyndaðr, þaktr, settur þyrnilíku hreystri. Ávaxtarbotninn hærðr. Þelið affallandi, hárlíkt eðr fjaðrað.

2ur Orða (*Polygamia superflua*) ójöfn sambúð.

5. Eilífðarblóm (*Gnaphalium*). Ávaxtarbotninn nakinn. Þelið snarpt eðr fjaðrað. Bikarinn þaktr með stinnhymnúttu lituðu hreystri. Randakrónurnar alilíkar.

6. Brekkustjarna (*Erigeron*). Ávaxtarbotninn nakinn. Þelið óskipt. Bikarinn þaktr. Randakrónurnar mjóstrikmýndaðar og margar.

7. Brandbikar (*Senecio*). Ávaxtarbotninn nakinn. Þelið óskipt. Bikarinn sívalr, margblöðóttur, jafnskiptr, umkríngðr af öðrum bikar. Bikarhreysturanna broddur er sem brunninn í endann.

8. Akkillisurt (*Achillea*). Ávaxtarbotninn smáhreystrotr, ekkert þel. Bikarinn eggmyndaðr, þaktr, jafnskiptr. Randa-krónurnar umsnúið-hjartmyndaðar, krínglóttar, hèrum 5.

9. Múkakróna (*Pyrethrum*). Ávaxtarbotninn nakinn. Þelið með röndum. Bikarinn hálfkúlumyndaðr, þaktr, með hvössu, á rönðum stinnhymnóttu hreystri.

### 19. Hópr (*Syngenesia*) pípumannaðar.

1sta Orða (*Polygamia æqualis*) jöfn sambúð.

#### 1. Ljónstönn (*Leontodon*).

a. Almenn Ljónstönn (*L. taraxacum*).

Yztu bikarhreystri beygð á bak aptr. Blöðin hefilmyndað, slètt, tennt; ísl. Ætiffill, Bifukolla.

Rótin laung, toppmyndað, greinótt. Af henni spretta mörg upprètt, slètt, nakin, hol sköpt, úr hvörjum, þá sundrskorin eru, drípr mjólkursaft. Blöðin öll niðr við rótina styttri enn skaptið, gegnum blaðlið er þykk, rauðleit slú. Blómstrið sitr einstakt á skaptendanum, er stórt að reikna móti skaptinn, útbreidt; lokast aptr, þá líðr að kvöldinu. Bikarhreystrið strikmyndað, í broddinu rauðleit. Smákrónurnar gular. Ytri hlið randablómstranna er rauðleit. Þá krónurnar eru allnar, út-



breiða fræin sig með fræ-ullinni ofaná í kúlu-mynd.

Margra ára urt; blómstrar í júní, júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Þessi alþekta urt vex í túnnum og ræktaðri jörðu nærri húsum og girðingum. Blöð urtarinnar safnist áðrenn blómstrin sprénga út. Rótin grafst upp á haustum. Urtin er valgang örfandi, þvagdrífandi, bólgu-eyðandi, mýkjandi, vessaþynnandi. Hún brúkast því móti meinlætum, vatns-sýki, harðlífi, þvagstemmu, skyrhjúgi, bólgu og ígerðum, samt hörunds útbrotum. Hún brúkast: í seyði af blöðum og rót urtarinnar, sem drekkist, svo tebollum skipti, dagliga; í saft sem tilbúið af rótinni og hjartablöðnum, hvaraf takist full teskeið í senn, 3svar dagliga; í mýkjandi grautum til at gjöra út kýli og meinsendir. Þaraðauki eru blöð urtarinnar ný, í mýsu soðin, eitt hið hagkvæmasta fæði skyrhjúgs sjúklíngum, og öðrum sem veikir eru af fordjörfun vessanna, svo sem kláðfeldum og spiteliskum. Blómstrin soðin með vatni og álúni gefa falligan gulan lit.

## 2. Pètrsurt (*Apargia*).

### a. Almennu Pètrsurt (*A. autumnalis*).

Skaptið greinaótt. Blómstrstaungullinn hreystraðr. Blöðin lensulík, tennt, hálf-unguð, lítið snörp; ísl. Fífill.

Rótin afbitin með laungum hliðaraunum. Af henni spretta mörg uppreist, rennótt, snörp, í toppinn skipt sköpt, sem stundum eru fäblöðótt

neðan. Blöðin mörg saman við rótina, og eru útbreidd á jörðina. Blómstrstannglarnir lítið bognir uppstígaði, ofantil þykkvir með missettu alilíku hreystri. Blómstrið einstakt lítið. Bikarinn næstum sívalr, þaktr, fínhærðr. Krónurnar gular. Fræin aflaug, skurðótt.

Margra ára urt; blómstrar í ágúst og september.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

### 3. Fagrkolla (*Hieracium*).

- a. Fjalla Fagrkolla (*H. alpinum*). Blöðin aflaug, óskipt, teunt. Skaptið nær því nakið. Bikarinn hærðr; ísl. Undafífill.

Rótin þykk, skáhöll. Skaptið upprétt, rétt, óskipt, sívalt, hært. Blöðin aflaug, lensulík, leggjuð. Á skaptinu er 1, stundum mörg, heil á röndum, lensulík blöð. Blómstrið sitr á skáptendanum. Bikarinn er hálfkúlumyndaðr, með þéttum, dökksvörtum hárum. Krónan gul.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

- b. Hærð Fagrkolla (*H. pilosella*). Blöðin sporeskjumynduð, heil á röndum, á neðra borð fýld. Skaptið nakið. Urtin hefir skrifðandi reinglur; ísl. Undafífill.

Rótin tréllík, með hliðarauðum. Af henni spretta margskonar hliðarstaunglar, sem bera blöð en eingin blómstr, ogsvo mörg uppreist, óskipt, sívöl, finhærð, í blómstruð sköpt. Blöðin snubbótt, stuttleggjuð, á neðra borð græn, á efra borð

hvítfýld. Bikarinn svart- og hvíthærðr. Krónurnar ljósgular. Þær yztu neðraborðs rauðleitar.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

*Nytsemi og verkun:* hefir barkandi krapt.

- c. Lensublöðótt Fagrkolla (*H. auricula*). Blöðin heil á röndum, lensulík. Skaptið nakið, 2- eðr 3blómstrað. Reinglurnar skrífandi; ísl. Undafífill.

Rótin skáhöll, aungótt. Skaptið uppreist, nakið, fáblómstrað. Blöðin uppreist, snubbótt, randhærð. Reinglurnar lángr, þettblöðóttar. Blómstrin þett saman, á stuttum staunglum. Bikarinn þettthærðr. Krónurnar ljósgular, líkjast ennar undangángandi, en eru þó minni.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- d. Afbitin Fagrkolla (*H. præmorsum*). Blöðin eggmyndað, lítið teunt. Skaptið nakið, hefir 1 klasa; efri krónurnar bera fyrr blómstr enn hinar; ísl. Undafífill.

Rótin afbitin, hefir marga hliðaránga. Skaptið npprett, sívalt, reunnótt, stutt, síuhært, í efri endann skipt. Klasinn toppmyndaðr. Blöðin snubbótt, leggjuð, snörp, bleikgræn, hafa fáar einstakar tennr. Blómstrstanuglaruif bera lítil alilik blöð; neðri greinarnar 3blómstraðar. Bikarinn slètt. Blómstrin gul, þett saman.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- e. Húsa Fagrkolla (*H. murorum*). Staung-

ullinn hærðr. Blómstrin í toppi. Blöðin eggmynduð, djúptennt; ísl; Undafífill.

Rótin aungótt. Staungullinn upprètt, sívalr, óskiptr, suarpr, hærðr. Blöðin með dökkum blettum. Rótarblöðin leggjuð, eggmynduð, tennt, hærð. Staungulblöðin minni, missett, fá, sitjandi. Blómstr-staunglarnir þètt-gráhærðir. Blómstrblöðin alílk, lítil. Bikarblöðin strikmynduð, stíunhærð. Hárin hafa optar á sér litla kirtla. Krónurnar gular.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

#### 4. Þistill (*Carduus*).

- a. Akrþistill (*C. arvensis*). Blöðin hálf-ugguð, þyrnótt. Staungullinn toppmyndaðr, skiptr. Bikararnir eggmyndaðir, óljóst-þyrnóttir. Þelið fjaðrað.

Rótin greinótt, lítið skriðandi. Staungullinn upprètt, lítið sívalr, jafn. Blöðin missett, með misstórum leppum, á röndum mjög þyrnótt. Blómstrin uppreist, leggjótt. Bikarhreystrið þètt, þökt á röndunum, lítið ullhærð. Krónurnar ljóslifrauðar.

Magra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Þel eðr ull urtarinnar má brúka til að fylla með dýnur og annað þess-slags.

- b. Margblöðótt þistill (*C. heterophyllus*). Blöðin umfaðmandi, lensulík, randhærð, heil, leppótt, á neðra borð fýld. Blómstrið einstakt, leggjað.

Rótið skriðandi. Staungullinn uppréttr, rötttr, sívalr, skurðótttr, lítið ullaðr. Blöðin breið, lensulík, hvöss, nöbbótt, á efra borð slétt, dökkgræn; á neðra borð hvítleit, ulluð. Rótarblöðin leggjótt, skipt í efri endann. Staungulblöðin umfaðmandi, missett. Blómstrin sitja einstök á staungulendanum, á laungum og sívölum, fyrir blómstrunartímann áviðlútandi, ullhærðum staungli. Stundum spretta og fáeinir blómstrstaunglar frá efri blaðöxlunum. Blaðhreystrin aðþrykkt, lítið þyrnótt. Krónurnar dökkklífrauðar. Rauðafelið snarpt, það sem í miðju er, er fjaðrað.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Blöð þessarar urtar brúkast í Noregi samblönduð tóbaki í tóbaksreyk. Saft af blöðum hennar tilbúin er góð að hreinsa með gömul sár. Í Rússlandi er gult lítað með ullinni.

2ur Orða (*Polygamia superflua*) ójöfn sambúð.

5. Eylífðarblóm (*Gnaphalium*).

- a. Fjalla Eylífðarblóm (*G. alpinum*). Staungullinn niðráviðliggjandi, óskiptr. Klasinn fáblómstraðr. Blöðin strikmynduð, beggjamegin fýld; ísl. Fjandafæla.

Rótið aungótt. Af henni spretta margir skriðandi við neðri endann, síðan uppreistir, fáblöðóttir, sívalir, dúnhærðir staunglar. Blöðin mörg saman við rótið, strikmynduð-lensulík. Á staunglinum missett, alilík. Blómstrin sitja í 2- eðr 4-

blómstruðum klasa á staungulendanum, og eru kúlulík, hvít og randleit.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

- b. Skóga Eylífðarblóm (*G. sylvaticum*). Staungullinn upprètt, óskiptr. Blómstrin eru í axini. Blöðin lensulík, við neðri endann mjórri, ulluð á báðum hliðum; ísl. Grájúrt.

Rótin anugótt. Staungullinn fýldr, sívalr, blöðótt. Blöðin sitjandi, missett, hvöss. Axinið á staungulendanum samanstendr af einstökum blómstrum, er spretta í efri blaðhornunum. Bikarhreystrið þétt, þökt, í broddinn dökksvört. Krónurnar hvítleitar.

Margra ára urt; blómstrar í ágúst.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

- c. Rættvaxið Eylífðarblóm (*G. rectum*). Staungullinn upprètt með margblómstruðum toppi. Blöðin strikmynduð, lensulík, á efra borð nakin.

Rótin trèlík, með mörgum hliðaraungum. Staungullinn upprètt, sívalr, óskiptr, ullhærðr, blöðótt. Blöðin missett, hálfumfaðmandi, við neðri endann bylgjött, heil á röndum, á neðra borð fýld. Axið samanstendr af mörgum smáaxium, sem eru í efri blaðhornunum. Bikarhreystrið dökkleit.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

- d. Keldu Eylífðarblóm (*G. uliginosum*).

Stauugullinn marggreinótt, útbreiddr.

Blómstrin þétt í staunguleudunum.

Rótin greinótt, aungótt. Staunglarnir upp-  
réttr, útbreiddir, greinóttir, sívalir, allir hvítull-  
aðir. Neðri greinarnar jafnlángar staunglinum.  
Blöðin missett, sitjandi, strikmynduð. Á báðum  
endum mjórri, ulluð. Blómstrin lítil, hnikil-  
eðr kúlumynduð í efri blaðhornunum. Bikarhreystri-  
gulglansandi, hvöss. Krónurnar gráleitar.

Eins árs urt; blómstar í ágúst og septbr.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

#### 6. Brekkustjarna (*Erigeron*).

a. Fjalla Brekkustjarna (*E. alpinum*).

Stauuglarnir einblómstraðir. Bikarinn lítið  
loðinn. Randakrónurnar útstandandi; ísl.

Jakobsfífill, Smjörgras.

Rótin aungótt. Staungullinn (stundum vaxa  
margir frá einni rót) uppréttr, réttr, strendr,  
blöðótt, hærðr, óskiptr, í hvörs efri enda sprettr  
1, stundum 2 blómstur. Blöðin missett, sitjandi,  
strikmynduð, snubbótt; hærð á röndum, sínótt,  
þau neðri lensulík. Blómstrin nokkuð stór. Rand-  
akrónurnar ljósrauðar, skerborðsblómstrandir. Krón-  
urnar gular.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Þessi urt er græðandi, uppleysandi og styrkj-  
andi. Hún er því góð móti gulni, liðaverkjum eðr  
íktisýki, hún örðar tíðablóð og stillir uppsöln. Bakstr  
af urtarinnar blöðum og mjólk dreifir bólgu í

kvænnabréjóstum, ogsvo annari bólgu. Seyði af urtariunnar blöðum takist inn, 2 matspænin í senn, hvörn 3ja klukkutíma.

### 7. Brandbikar (*Senecio*).

a. Almennr Brandbikar (*S. vulgaris*).

Blómstrin fyrir utan randakrönnur. Blöðin hálfuggótt eðr bugðótt, umfaðmandi, tennt.

Rótin greinótt, aungótt. Staungullinn randleitr, við neðri endann uppréttr, greinótt, blöðótt, sléttr, eðr lítið ullaðr, strendr. Blöðin missett, opt hálfuggótt, snubbótt, á efra borð slétt, á neðra borðið ullhærð. Þau neðri leggjuð. Blómstrin eru toppmynduð í staungul- og greina-endunum. Blómstrstaunglarnir lítið ullaðir, rennóttir. Bikarnir kúlumyndaðir, sívalir, sléttir. Hreystin strikmynduð, hvöss í broddinn, svört. Allar litlu krómurnar pípumyndaðar, gular, jafnláugar bikarnum. Þelið snarpt.

Eins árs urt; blómstrar leingi á sumrum.

*Nytsemi og verkun:*

Með urt þessari má lita gult.

### 8. Akkillisurt (*Achillæa*).

a. Almenn Akkillisurt (*A. millefolium*).

Blöðin 2faldt-hálfugguð, hærð. Lepparnir strikmyndaðir, tenntir, með broddi. Staunglarnir skurðóttir; ísl. Jarðhumall, Vallhumall.

Rótin skriðandi. Af henni spretta margir uppréttir, greinóttir, strendir, hærðir staunglar. Blöð-



in þéttleppótt, hvassuöbbótt, einkum á neðra borð, hærð. Blómstrin eru í hálfskýlu í staungul- og greina-endunum, hvít, lítil, þétt. Bikararnir eggmyndaðir. Randakrónurnar hlerumbil 5.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi er styrkjandi, mýkjandi, saman- dragandi, uppleysandi, blóðhreinsandi, bætir sinat- eygjur og stríðleika líkamans. Hún er því góð móti allslags blóðlátum, innantökum, þvagteppu, uppþembíngi, matarólyst, hósta, gulu, og allslags innvortis bólgu. Te af urtarinnar blöðum og blómstrum drekkist, svo tebollum skipti, 3svar dagliga. Dupt af rótiinni er gott að strá í illa- luktandi, slæm kaun. Af blöðum urtarinnar má búa til salve þannig: Tak af blöðunum smásöx- uðum 12 lóð, af nýu ósöltuðn sauðasmjöri 24 lóð; sjóð þetta saman um stund, síðan hið þunna frá og kreyst vel úr, og geym síðan. Þetta smýrsl er hið bezta meðal að bera á verki, stirðar sínar og tók. Urtarinnar blöð þurkuð og steytt í dupt, mega og blandast með smjöri, 4 lóð móti 12 lóð- um smjörs, eru þá smýrsl þessi einkar góð til að græða sár og öll útbrot hörundsins.

### 9. Múkakróna (*Pyrethrum*).

#### a. Luktarlaus Múkakróna (*P. inodorum*).

Blöðin sitfandi, uggótt, hárilík, margskipt. Staungullinn opinn, greinótt. Frækronan heil á röndum; ísl. Baldursbrá.

Róti þunn, toppmynduð. Staungullinn upp-

réttr, útbreiddr, greinótt, blöðótt, strendr, slètt. Smáblöðin margskípt, mjög fín. Blómstrin einstök í greina-endunum, stór. Bikarlireystrin stór, dökk á röndum, hymnulík. Randakrónurnar afláugar, hvítar, 3tenntar. Skerborðið ávalt, með gulum krónum.

Eins árs urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi vex hér í landi á húsum, í kál-görðum og ræktaðri jörðu. Hún er svitadrifandi, ormdrepandi, tíðirleiðandi, hjartastyrkjandi; hún stillir niðrfallssótt og aðrar snateygjur. Blómstr urtarinnar brúkast í te, hvaraf drekkist 1 peli í sennu, 2svar-sinnum dagliga. Te þetta drukkið að kvöldi dags leiðir svita; það er og einkar gott að þvo með limi þá, sem kláðfeldir eru. Mýkjandi urtagrantar af henni, útvörtis álagðir, gjöra út meinsemdir, eyða bólgu; lagðir við kviðina leiða þeir tíðablöð. Blómstr urtarianar marin og lögð yfir fylli, eyða henni, en opt verður um að skipta.

b. Stranda-Múkakróna (*P. maritimum*).

Blöðin 2faldt-ugguð, kjötlig, ávöl á efra borð, á neðra borð hryggjótt. Frækrónan flípótt.

Rótin trèlsk, greinótt. Staunglar spretta margir frá einni rót, og eru útbreiddir, greinóttir, slèttir, rennóttir. Blöðin missett. Smáblöðin snubbóttari og styttri enn á undangangandi. Bikarinn slètt. Hreystrin svört á röndinni. Skerborðið stórt, ávalt, gult. Randakrónurnar hvítar, snubbótt 3tenntar.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

## 20. Hópr.

(Gynandria) kvenubú.

1sta Orða (*Diandria*) tvímannaðar.1. Hornberi (*Orchis*). Hunángshyrzlan hornlík.2. Púngvör (*Satyrium*). Hunángshyrzlan líkist 2 uppblásnum, litlum blöðrum.3. Lappavör (*Ophrys*). Hunángshyrzlan lítið hryggjött, niðráviðbeygð.20. Hópr (*Gynandria*) kvenubú.1sta Orða (*Diandria*) tvímannaðar.1. Hornberi (*Orchis*).a. Blettótt Hornberi (*O. maculata*).  
Hnúskarnir útskagandi, hendilíkir. Hunángshyrzlu-vörin 3flípótt, flöt. Hornið styttra enn ávaxtarhyrzlan. Krónublöðin opin; ísl. Brönugrös, Hjónagras, Elskugras, Friggjargras, Graðrót, Vinagras.

Staungullinn þunnr. Rótarblöðin breið, lensulík, snubbótt. Staungulblöðin mjórri, hvassari, öll svart-blettótt. Blómstrin eru í stuttn, uppmjóu, strendu axini. Blómstrblöðin lítil. Krónurnar ljósranðar, með dökkrauðum blettum.

Marga ára urt; blómstrar í júní og júlí.

Nytsemi og verkan:

Rót urtarinnar hefir mýkjandi, nærandi og

stillandi krapt. Hún er því góð móti lífsýki og blóðsótt. Hún brúkast þannig: Rót sú er sökkur, sè vandliga þurkuð, síðan steytt í dupt; af dupti þessu tekur maður þriðja part úr lóði, sem látist í leirpott, þar á sè hellt einum pela af vatni, og vermist svo hægt og hægt, við lítinn eld, og hrært sè vel í, til þess verður að jöfnu mauti; þarí látist lítið eitt af sykri, og af mauti þessu takist 2 fullir matsþæmir 4sinnum dagliga. Maut þetta með hunáungi er og eitt lið bezta meðal fyrir brjóstið móti og læsi.

- b. Þunnu axini settr Hornberi (*O. mascula*). Hunángshyrzlu-vörin 4klofin, hríngnökkbótt. Hornið snubbótt. Þau efstu krónublöð beygð á bak apr, 3sinótt.

Rótiú samaustendr af 2 stórum, eggmynduðum huúskum. Staungullinn upprètt, sívalr, blöðótt, slètt. Blöðin mjó, slíðrandi, lensulík, slètt. Blómstraxinið þunnt, langt. Krónurnar lifrauðar, hafa hvítleita vör.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- c. Mjóvörótt Hornberi (*O. hyperborea*). Hunángshyrzluhornið jafnlangt ávaxtarhyrzluinni. Vörin strikmynduð, heil á röndum, afkubbuð.

Rótiú er skipt í ýmsa lúnga, þunna, toppmyndaða parta. Staungullinn upprètt. Rótarblöðin sverðlík, nær því jafnlaung staunglinum. Það efsta lítið. Blómstrin sitja í þunnu, aflaugu axini. Blómstrblöðin jafnlaung blómstrinu, strik-

mynduð, lensulík. Krónan rauðleit. Ytri krónublöðin opin.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

d. Breiðblöðóttur Hornberi (*O. latifolia*).

Hunángshyrzlan hefir toppmyndað horn og 3klofna vör. Blómstrblöðin 2faldt leingri enn blómstrin.

Rótarhnúskarnir ójafnir, hendilíkir, skiptir. Stannglarnir uppréttir, sívalir, sléttir, holir. Blöðin breið, umfaðmandi, slíðrandi. Axinið þétt, hvast, margblómstrað. Blómstrblöðin lensulík, hvöss, blaðlík. Krónurnar lifrauðar. Hliðarkrónublöðin opin. Vörin neðanvert ljósleit, með rauðum blettum.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

e. Þrískiptur Hornberi (*O. Königii*). Hunángshyrzluhornið styttra enn ávaxtarhúsið.

Vörin skipt í misstóra, heilrandaða flipa.

Líkist mikið mjóvöróttu Hornberanum, en þekktist þó frá hönum við það, að rótin hefir fleiri ánga, blöðin eru breiðari og axinia þéttari samman.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

## 2. Púngvör (*Satyrium*).

a. Græn Púngvör (*S. viride*). Rótarhnúskarnir hendilíkir. Blöðin eggmynduð, snubbótt. Hunángshyrzlu-vörin strikmynduð, 3skipt. Miðleppriun mjög lítill.

Rótarhnúskrinu útskagandi, hendilíkr. Staungullinn uppréttur, sívalur, sléttur. Blöðin breið-eggmyndað, snubbótt, sléðrandi, dökkgræn; þau efstu lensulík. Blómstrblöðin græn, leingri en blómstrin. Blómstraxinið þétt, afláugt. Krónublöðin græn, dökkleit í broddinum. Vörin niðrháugandi, gulgræn.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

b. Hvít Púngvör (*S. albidum*). Rótarhnúskarnir mynda hueppi. Blöðin lensulík. Hunáungshyrzluvörin hefir 3 leppa, hvörra leingstra sá sem í miðrið er; ísl. Brönuugrös eður Braunuugrös.

Rótarhnúskarnir í þörum saman, þunnir, hvassir. Staungullinn líkist undangángandi. Blöð þessara eru mjórrí og ljósgrænari. Axinið afláugt, sívalt. Blómstrblöðin jafnalaung ávaxtarhyrzlunni. Krónurnar litlar, gulleitr.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

c. Dökk Púngvör (*S. nigrum*). Rótarhnúskarnir hendilíkir. Blöðin strikmyndað. Hunáungshyrzluvörin umsnúin, óskipt.

Staungullinn sem á undangángandi. Blöðin saman við rótina, helfugs styttri en staungullinn. Staungulhlöðin styttri, alilík. Axinið þétt, snubbótt, eggmyndað, kúlulíkt. Blómstrblöðin leingri en ávaxtarhyrzlan, alilík, dökkrauð. Krónurnar dökkrauðar.

Margra ára urt; blómstrar í ágúst.

Nytsemi og verkun: óþekkt.

3. Lappavör (*Ophrys*).

- a. Reinglurætin Lappavör (*O. corallorhiza*). Rótarhúðskarnir bugðótt-greinóttir, útskagandi. Skaptið slíðrað. Hunángthyrzluvörin óskipt.

Rólin hvít. Skaptið bugðótt, við neðri endann upprétt, sívalt, gulleitt, lítið gagnsært, með missettu, lángslíðrandi hreystri. Axinið fäblómstrað. Blómstrið strjált, stuttleggjað, lítið, fagr-lifrautt. Efri krónublöðin samanbeygð. Fræhúsin niðráviðbeygð.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun*: óþekkt.

- b. Dökk Lappavör (*O. nidus avis*). Rótarhúðskarnir augótt-bindnum líkir. Skaptið slíðrað. Hunángthyrzluvörin klofin.

Skaptið rött, sívalt í toppinn, strendt, slètt, holt, dökkgult, líkt missett-snubbóttu hreystrinu. Axinið langt, strjált, Blómstrblöðin lensulík, hálfu styttri enn ávaxtarhúsið. Blómstrin stuttleggjuð, dökk. Krónublöðin opin.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun*: óþekkt.

- c. Tvíblöðótt Lappavör (*O. ovata*). Rótarhúðskarnir augóttir. Á staunglinum eru 2 eggilík, sporeskjumynduð blöð. Hunángthyrzluvörin klofin, strikmynduð.

Rótarinnar húðsk-áugar langir, öll urtin græn. Staungullinn röttur, sívalr, fínt dúnhærör. Á honum spretta 2 mótsett, sínótt blöð, neðar enn á miðjunni. Blómstraxinið langt, sívalt. Blómstrin

stuttleggjuð. Krónublöðin opin, græn, hálfu styttri en vörin. Fræhúsið allánga, kúlumyndað.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

## 21. H ó p r.

(*Monoecia*) einbýli.

1sta Orða (*Monandria*) einmannaðar.

1. Kransblað (*Chara*). Kallkynið hefir eingann bikar eðr krónu. Dupthnapparnir eru undir ávaxtarhúsinu. Á kvennurtinni er bikarinn 4blöðóttur. Arið 3- eðr 5-klofið. Eitt margfrævað ber.

2. Vatnsstjarna (*Callitriche*). Kallblómstrið hefir eingann bikar, en 2 krónublöð. Kvennblómstrið eins, en hefir ogsvo 2 dupthyrzlur og 4 fræ.

2ur Orða (*Triandria*) þrímannaðar.

3. Brúsa höfuð (*Sparganium*). Blómstrin hópsett, á kallblómstrinu er bikarinn 3-blöðóttur, eingin króna. Kvennblómstrið eins, en hefir þurran, einfrævaðan steinávöxt.

4. Stör (*Carex*). Kall- og kvenn-



blómstrin sumpart saman, sumpart aðskild í þöktu axini, hafa einga krónu, en einn 1blaðkaðan bikar. Kvennblómstrið hefir 2 axini, og 1 fræ, sem er innilukt í búkmynd-aðri hymnu.

3ja Orða (*Tetrandria*) fjórmannaðar.

5. Birki (*Betula*). Á kallblómstrinu eru undir sèrhvörju 3klofna streingja hreystriinu þrjár 4skiptar krónur. Kvennblómstrin hymnulík, en hafa 2 dupthyrzlur og samanþrykkt fræ.

6. Netla (*Urtica*). Á kallblómstrinu er bikarinn 3blöðóttur, eingin króna. Í ávaxtarhyrzlunnar sæti er bikarmynduð hunángshyrzla. Á kvennblómstrinu er bikarinn 2-blöðóttur, undirsitjandi, eingin króna, eitt glansandi fræ.

4ða Orða (*Polyandria*) með 8 duptberum og þaryfir.

7. Hornurt (*Ceratophyllum*). Bikarinn margskiptr, eingin króna. Kallblómstrið hefir 16 til 20 duptbera. Á kvennblómstrinu er örið sitjandi. Eitt hymnótt fræ.

8. Þúsundblað (*Myriophyllum*). Á kallblómstrinu er bikarinn 4blöðóttur. 4 krónublöð. 8 duptherrar. Á kvennblómstrinu eru 4 sitjandi axin. Bikarinn og krónurnar 4blöðóttar. 4 hymnulík fræ.

## 21. Hópr (*Monoecia*) einbýli.

1sta Orða (*Monandria*) einmannaðar.

### 1. Kransblað (*Chara*).

a. Almenn Kransblað (*C. vulgaris*). Hefir einga þyrna, er reunnótt. Blöðin alíflík, líðótt.

Urtin öll niðrsökkinn og hulinn jarðskorpu. Stannugullinn sívalr, greinóttur, meyr. Blöðin alíflík, hvöss, líðótt, eru í kransi, hërum 8 í hvörjum kransi. Á efstu blöðnum sitja þau annars litlu blómstr, hvörra 4 umkringja ávaxtarhúsið, fyrir neðan hvört er ein lítil rauð kúla, sem almenn meinað að vera dupthnappinn.

Eins árs urt; blómstrar í júlí.

b. Hvasst Kransblað (*C. hispida*), er skurðótt. Blöðin alíflík, líðótt. Smáblöðin kransmynduð. Stannugullinn með litlum burstamynduðum, ábakaptrbeygðum broddi.

Hún er leingri og þykkvari en undangangandi, og á blöðnum sitja önnur minni blöð. Stannugullinn lítið snúinn, einkum í efri endann, settir smáburstum.

Eins árs urt; blómstrar í júlí.

## 2. Vatnsstjarna (*Callitriche*).

- a. Vorvatnsstjarna (*C. verna*). Hefir aðgreind kall- og kvennblómstur.

Rótin augótt. Stanngullinn þráðmyndaðr, veigalífill, mislángur. Blöðin mótsett, sitjandi, heil á röndum, slétt, gagnsær, stundum strikmynduð, stundum breið-aslaung, eru þétt saman að ofan, í broddinn nær því þökt. Blómstrin eru í blaðöxlunum. Kallblómstrið efst. Dupleppapparnir gulir.

Eins árs urt; blómstrar í maí og júní.

*Nytsemi og verkun*: óþekkt.

- b. Haust-Vatnsstjarna (*C. autumnalis*) hefir 2 kynja blómstur.

Hævið þekktist hún frá uudangángandi, og svo við að blöð hennar eru mjó-strikmynduð; ítem að hún blómstrar seinna sumars eðr í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun*: óþekkt.

## 2ur Orða (*Triandria*) þrímannaðar.

### 3. Brúsa höfuð (*Sparganium*).

- a. Sveimandi Brúsa höfuð (*S. natans*). Blöðin niðráviðliggjandi, flöt. Sameginlegi blómstrstaungullinn óskiptr. Kallblómstrin mynda einstakt höfuð.

Urt þessi er lítil. Staungullinn uppréttr, sívalr, slétt, blöðóttr, ofantil greinóttr. Blöðin slíðrandi, graslík og liggja vatnsflöt. Optast einungis eitt kallblómstrhöfuð, sem er á staungulendanum.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Með urt þessari má barka skinn.

4. Stör (*Carex*).

- a. Tvíþýlis-Stör (*C. dioica*). Kall- og kvenn-axinín eru á 2 sundrskildum urtum. Fræhúsin eggmyndað, sínótt, á röndum fínt-nöbbótt.

Rótin skriðandi, með laungum aungum. Stráið upprétt, 3strendt, burstalíkt, neðantil blöðótt. Blöðin burstalík, 3strend, hvöss, slíðrandi, hálfustytttri enn stráið. Kallaxinið strikmyndað. Kvenn-axinið fyrst strikmyndað-eggilíkt, síðan einúngis eggmyndað.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:* góð fóðr-urt.

- b. Eggmyndað Stör (*C. capitata*). Axinið eggmyndað, ofanvert kallblómstrað. Fræhúsin opin, þökt.

Rótin aungótt. Stráið upprétt, við neðri endann nærri sívalt, blöðótt, ofanvert 3strendt. Blöðin nærri jafnlaung stráinu, 3strend, hvöss, snörp. Axinið er á strásendanum eggmyndað, sívalt, fáblómstrað, og hefir hreyst, sem er heilt á röndum.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:* góð fóðr-urt.

- c. Flóar-Stör (*C. pulicaris*). Axinið ofan-til kall- eðr kvenn-blómstrað. Fræhúsin útspennt, ábakaptrbeygð, hvöss á báðum endum.

Rótin aungótt. Stráin upprétt, þráðmyndað,

slétt, neðan blöðótt. Blöðin lensulík, nærri jafnlaung stráinu, rennótt á efra borð. Arið vex á strásendanum, strikmyndað, uppreist. Kallblómstranna hreystri aðþrykkt.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:* góð fóðr-urt.

- d. Sand-Stör (*C. arenaria*). Á neðri smáaxininum spretta kvenn-, hinum efri kallblómstur. Fræhúsin hymnulík, reudótt; neðri blómstrblöðin blöðnmlík.

Rótin skrifðandi, mikið laung, með dúnhærðum augum og dökkhreystruðum liðum. Á sérhvörjum þessara vex bogið, uppstígandi, hvaststrendt, við rótina blöðótt strá. Blöðin við neðri endanu slöðrandi, strikmyndað, hvöss, flöt, uppsett, á röndum snörp, nær því jafnlaung stráinu. Axinið eggmyndað-aflángt, auðsjáanliga af missettum, þéttstandandi, breiðeggmyndaðum smáaxinum. Blómstrblöðin eggmyndað-lensulík, dökkleit með grænum kjöl, og endast með laungum, hvössum broddi. Þau neðri leingri, þau efri styttri enn smáaxiniu. Bikarhreystrið eggmyndað-lensulíkt. Fræhúsið klofið í broddinn.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:*

Urtin hefir blóðhreinsandi, svita- og þvagleiðandi krapt. Hún er góð fóðr-urt.

- e. Tóu-Stör (*C. vulpina*). Axinið 2faldt samansett, samanhneppt, snubbótt. Fræhúsin útspennt. Hreystriú hvöss. Smástreundurnar samanþrykktar, hvassar.

Rótið annagótt. Stráíð upprétt, stínt, með fljúgum, snörpum hliðum, blöðótt, þykkt, slétt. Blöðin breið, dökkgræn; þan efstu ná uppýfir axinið. Axleggriinn þynnri enn stráíð. Axinið afláugt, snubbótt; stundum stendr lítið axin á einum legg fyrir neðan hið stærra. Smáaxinin eggmynduð, neðan kall-, í broddinu kvenn-kyns. Blómstrblöðin mjó, stínn, útstandandi. Hreystrin eggmynduð, stínn, dökkhymuótt, grænhryggjótt. Fræhúsið eggmyndað, hvast, með lítið ávölum hliðum.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:* sama sem undangangandi.

- f. Hvassblöðótt Stör (*C. muricata*). Axinið afláugt, nærþví 2faldr samansett. Fræhúsin útskagandi, hvöss, klofin, ofanvert á röndum nöbbótt.

Rótið annagótt. Stráíð upprétt, hvass-3strendt, ofan snarpt, neðan blöðótt. Blöðin mjó, strikmynduð, leingri enn stráíð, ljósgræn, á röndum snörp, ogsvo á kjölum. Axinið stutt, þunnt, neðantil opt með millibilum. Smáaxinin sívalt-aflaung, snubbótt. Á þeim spretta kall- og kvenn-blómstr, og eru kallblómstrin ofar. Blómstrblöðin eggmynduð, leusulsk, fínt-hvest. Fræhúsa-röndin ofantil smá-nöbbótt.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:* góð fódur-urt.

- g. Stuttblöðótt Stör (*C. curta s. canescens*), hefir sporeskjumynduð, strjál axin.

Hreystrið eggmynduð, hvöss, hymnulík,  
styttri eun það tilhvesta fræhús.

Rótið aungótt. Stráið 3strendt, upprétt, jafut,  
blöðótt við neðri endaun. Blöðin mjó, strikmynd-  
uð, hvöss, jafnlaung stráinu. Smáaxinin mjó-egg-  
mynduð, missett, ljósgrá. Blómstrblöðin lítil að  
undanteknu blaðinu, sem er hjá litla neðsta axin-  
inu. Ávöxturinn eggmyndaðr, samanþrykktr.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

- h. Litil hvassblöðótt Stör (*C. m. loliacea*) hefir minna, einfaldt, samansett axin,  
sem ogsvo er eggmyndað, en svo útskag-  
andi fræhús. Blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun: góð fóðr-urt.*

- i. Fínstaungluð Stör (*C. elongata*). Smá-  
axinin aflaug, sitjandi, strjál. Fræhúsin af-  
laung, hvöss, snubbótt, strend, sínótt, lítið  
beygð á bak aptr, með óskíptum muuna.

Rótið skríðandi, þykk, með hliðaraungum.  
Stráin upprétt, 3strend, neðantil blöðótt, við róti-  
na sett mjóu, leusulíku, dökku hreystri. Blöðin  
mjó-strikmynduð, lítið rennótt, styttri eun stráið.  
Smáaxinin 8 til 12, missett. Hreystrið styttri eun  
fræhúsin sem eru strjál.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

- k. Rjúpastör (*C. lagopina s. leporina*). Smá-  
axinin 3, þétt. Hreystrið lítil. Fræhúsin  
nær því kúlamynduð, hvöss-nefjótt, með

snubbóttum, heilrönduðum strendum, og 2 flípóttum munna.

Rótin lítið skriðandi, aungótt. Af henni vaxa nokkur ófrjóf, blöðótt rôtarskot. Stráið uppreist, bugðótt, 3strendt, blöðótt. Sméaxinin umsnúið-eggmynduð. Blómstrblöðin hálfu styttri en axinin, lensulík, dökkleit. Hálfu styttri eru hreystri en fræhúsin.

Margra ára urt.

1. Steina-Stör (*C. saxatilis*) hefir hlerumbil 3, eggmynduð, missett, að undanteknu því neðsta, sitjandi axin. Kallaxinið afláugt. Hreystri eggmynduð-snubbótt. Fræhúsin eggmynduð, í broddinu óskipt; ísl. Rauðbrestíngur.

Rótin skriðandi. Af henni vaxa ýmiskonar blöðótt, ófrjóf rôtarskot. Stráið áviðbogið, 3strendt, neðantil blöðótt. Blöðin strikmynduð, hvöss, styttri en stráið. Kallaxinið sprettr á strásendanum, og er lítið leingra en kvenuaxinin, sem eru 2 eðr 3, snubbótt, svört. Neðsta axinið hefir við legginu 1 blað jafnlángt axininu. Fræhúsin svört, aflaung, eggmynduð.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- m. Stinn Stör (*C. rigida*). Blómstrblöðin sliðrlaus. Axinin eggmynduð, þau efstu sitjandi. Blöðin lítið ábakaptrbeygð, stinn. Fræhúsið lítið samanþrykkt.

Þessi stör líkist mjög einni undangangandi,



líkliga sömu tegundar, utan hún er stlauari, og axleggriun mikið styttri enu stráíð. Blöðin breiðari.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

- n. Gul Stör (*C. flava*). Blómstrblaða slíðrin stytt, nær því jafnlaung axleggnum. Kvennaxin sívöl. Fræhúsin nefjött, bogamynduð, beygð á bak aptr. Stráið jafnvaxið.

Rótin skriðandi. Stráið uppreist, rétt, hvass-3strendt, neðantil blöðótt. Blöðin uppreist, breið-strikmyndað, slíðrandi, lítið leingri enu stráíð, ljósgræn. Blómstrblöðin líkjast hinum blöðunum; það neðsta nærri jafnlángt þeim; þau efstu lítið beygð á bak aptr. Kallaxinið strikmyndað, uppreist. Kvennaxinin 2 eðr 3, hvörra hið neðsta er stuttleggjað. Fræhúsin leingri enu hreystrin, gul.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

- o. Fíngirilík Stör (*C. pedata*). Axinin nær því sitjandi, fáblómstruð, opin. Blómstrblöðin stutt. Fræhúsið bogið. Blöðiu mjó.

Rótin aungótt. Af heuni spretta mörg bogin, upprétt, þræðilík, nærri sívöl, blaðlaus strá, sem neðantil eru í dökkum slíðrum. Blöðin eru niðrvið rótina, jafnlaung stráinu, strikmyndað, snörp á röndum, slétt á kjölnum, mjó. Kallaxinið sitr efst. Kvennaxinið 2leggjað, það efra hærra en hitt, þau eru sitjandi, fáblómstruð, opin. Blómstrblöðin stutt, skáhallt-afkubbuð, snubbótt. Hreystrin dökkrauð, niðrþrykkt, afkubbuð. Fræhúsið bogið, 3strendt, fínhært, kyllamyndað.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

- p. Hvöss Stör (*C. acula*). Blómstrblöðin skeiðalaus. Axinin þráðmynduð. Fræhúsin sporeskjumynduð, snubbótt, óskipt í broddinu; ísl. Tjarnastör.

Rótin skriðandi. Stráið, upprétt, hvest, snarpt, 3strendt, fyrir blómstrunartímenn lútandi, eptir hann stíuurt. Blöðin fagrgræn, styttri enn stráið. Blómstrblöðin lík hinum blöðunum; það neðsta jafnláugt efstu axinnum. Axinin laung og mjó; þau 2 efstu kvennkyns, þau neðstu leggjúð. Á kvennaxinablómstrinnu vaxa kallblómstur. Hreystriin svört. Fræhúsin affallandi, leingri enn hreystriin.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

- q. Hárleggjuð Stör (*C. capillaris*). Blómstrblaðaslíðrin hálfu styttri enn axleggiruir. Kvennaxinin lín, lútandi. Fræhúsið hvast.

Rótin með fínum og laungum aungum. Stráið upprétt, þunnt, nærri sívalt, neðan blöðótt. Axinin þunn, fáblómstruð, dökkgul, og vaxa á laungum, þræðilskum, lútandi leggjum, opt 2 eðr 3 af einu slíðri. Hreystriin hvítstrend, eggmynduð, styttri enn fræhúsin.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

- r. Skarn-Stör (*C. limosa*). Blómstrblöðin nærri slíðrlaus. Kvennaxinin eggmynduð, hángandi. Fræhúsið sporeskjulíkt, samþrykkt.

Rótin skriðandi. Stráin uppstígandi, neðan rótum skjótandi, 3strend, snörp, frá miðju niðreptir blöðótt. Blöðin mjó, strikmynduð, alílik, neðantil hreystruð, styttri enn stráið. Kallaxinið

strikmyndað, lensulíkt, uppreist. Kvennaxinin (stundum eru þau 2) lánleggjuð, breidt-eggmynduð, nærri hjartmynduð, með breiðu og dökkgulu strendu hreystri, og uppreista, alilíku blómstrblaði, jafnlaung staunglinum. Fræhúsin lítið leingri enn hreystrin.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

8. Bleik Stör (*C. pallescens*). Axinleggja slóðrin stutt. Axinin sívöl, leggjótt; þau blómstr-berandi niðrhángandi. Fræhúsin sporeskjumynduð, uppblásin, snubbótt.

Rótin aungótt. Stráið uppreist, 3strendt, ofan snarpt, neðan blöðótt. Blöðin bleikgræn, mjó, strikmynduð, jafnlaung stráinu. Blómstrblöðin laung, blöðum lík. Kallaxinið uppreist, strikmyndað, lensulíkt. Kvennaxinið næstum eggmyndað, bleikgult, með broddóttu hreystri. Fræhúsin bleikgræn.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

1. Axbinðinis - Stör (*C. pseudocyperus*). Axleggirnir nær því slíðrlansir. Kvennaxinin sívöl, leggjjuð, hángandi. Hreystrin strikmynduð með strfi. Fræhúsin lánuefjótt, útskagandi, klofin í broddinu.

Rótin með lauugum aungum. Stráið upprètt, hvast, snarpt, 3strendt, blöðótt. Blöðin breið-strikmynduð, á röndum smá-uöbbótt, á efra borð snörp, ljósgræn. Neðri blómstrblöðin eru sömu myndar, og nærri eins stór og hin blöðin. Kallaxinið uppreist, strikmyndað, dökkgult. Kven-

axiðin græn, lítið þykkvari, eru nálæg hvört öðru á þunnum, snörpum leggjum.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

- u. Blöðrustör (*C. vesicaria*). Kallaxiðin sívöl. Kvennaxiðin aflaug, stuttleggjuð. Leggirnir skíðalausir. Fræhúsið uppblásið, 2klofið, nefjött. Stráið hvass-3strendt.

Rótin skriðandi. Stráið upprétt, rétt, snarpt á strendunum. Blöðin mjó, strikmynduð, hvöss, uppreist, lín í efri endann, á röndum snörp. Blómstrablöðin laug, líkjast hinum blöðunum. Kallaxiðin 2 eðr 3, þunn, hvöss. Kvennaxiðin 2 eðr 4, sem eru þunu fyrir blómstrunartímanu. Hreystriðin beggjamegin lensulík, hvöss. Fræhúsin opin, gul, leiðgri enn hreystriðin, slótt, slótt.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

- v. Trjónu-Stör (*C. ampullacea*). Axinín sívöl. Kvennaxiðin laug, leggjótt. Fræhúsin blöðrúf, kúlumynduð, með klofnum, opnu nefi. Stráið sljótt, 3strendt.

Urt þessi líkist mikið næst undangangandi, en hefir fleiri eðr 3 til 4 kallaxini. Kvennaxiðin laug og leggir eru nokkuð fráleit. Fræhúsið hefir leiðgri nef og sljóttstrendt strá.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

- x. Hærð Stör (*C. hirta*). Axinín aflaug. Kvennaxiðin uppreist, strjál, leggjótt. Hreystriðin hafa strí. Fræhúsin aflaug, eggmynduð, loðin, hvöss, með útskagandi munni.

Rótin laug, skriðandi. Stráið upprétt eðr

uppstígandi, 3- og hvass-strendt, blöðótt. Blöðin hvöss, strikmynduð, uppreist, styttri enn stráíð, hærð á neðra borð og á slíðrunum. Blómstrblöðin líkjast hinum blöðunum. Kallaxinin optast 3 og þétt saman, lensulík, dökk. Kvennaxinin strjál, græuleit, ei þéttþökt.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

y. Svört Stör (*C. atrata*). Axinin leggjuð. Þau blómstrberandi uppreist; þau fræberandi niðrhángandi. Fræhúsin eggmynduð, hvöss, í broddinum 2teunt.

Rótin svört, augótt. Stráið uppreist, hvass-3strendt, neðantil blöðótt. Blöðin þétt saman við rótina, nærri jafnlaung stráinu. Axinin 3 eðr 4, afslung, dökk; það neðsta hefir reifar jafnláugar legnum. Hreystriinn svört.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

z. Fjallastör (*C. montana*). Kallaxinið sitr nálægt kvennaxininu, hvörutvæggi eggmynduð í efri endann, á nærri blaðlausu strái.

Rótin augótt, skriðandi. Stráin uppstígandi. Blöðin mjó, mjúk, bleikgul. Axinbreystrið slétt, hymnulíkt, hvast. Fræhúsin loðin.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

þ. Sétlituð Stör (*C. fuliginosa*). Slíðrin hálfu styttri enn axleggriinn; efsta axinið kall- og kvenn-blómstrað. Kvennaxinin láugleggjuð, lútandi. Fræhúsin lensulík, með klofnum munn og leingra enn hreystriin.

Rótin augótt. Stráið upprétt, 3strendt, blöð-

ótt. Blöðin strikmynduð, styttri en stráið, lángslíðrandi. Axlinn lensulík, dökkleit. Þau neðstu blómstrblöð blaðilík. Hreystir og fræhúsin dökk-svört. Það efsta kvennaxin hefir stundum kall-blómstr í broddinum.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- æ. Dökkleit Stör (*C. atrofusca*). Axlinn eggmynduð. Leggirnir lágir, á bak aptr beygðir. Blómstrblöðin midt slíðrandi, í broddinn blaðilík. Fræhúsin eggmynduð, hvöss, með stuttu, klofna nefi.

Rótin augótt. Stráið upprétt, neðan blöðótt, sljóf-3strendt. Blöðin fá, lángslíðrandi, strikmynduð, lensulík. Kallaxinið eggmyndað-aflángt, snubbótt. Kvennaxinin 2, hvorra hið neðra er stærra, með laungum legg, sem er umslíðrað af blaðilíku blómstrblaði. Það efra þarámóti slíðrað án blaðs. Fræhúsin hvass-strend.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

### 3ja Orða (*Tetrandria*) fjórmannaðar.

#### 5. Birki (*Betula*).

- a. Hvítt Birki (*B. alba*), hefir eggmynduð, hvöss, nöbbótt, slétt blöð; ísl. Birki, Björk, Rifhrís.

Er trè, sem hefir nokkurnvegin réttan bol, með hvítum berki, hvörs yzta hymna er mikið þunn, og flýsjast auðveldliga af, og laungum, þunnum, í efri endann lítið dúnuðum, hángandi kvist-

um. Blöðin missett, leggjuð, nær því múraraspaða-mynduð, ójafnt - nöbbótt. Streingirnir sávalir, leggjóttir, hángandi. Kvennstreingirnir minni enn kallstreingirnir. Fræin vængjuð á röndunum.

Blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:*

Trè þetta hefir styrkjandi, þvagdrífandi, blóð-hreinsandi, samandragandi og barkandi krapt. Af nýsprottnum og þurkuðum blöðum þess gjörist te. Af berkinum gjörist seyði, hvaraf mátuligt er að taka 2 matspæni í senn. Púlver af berkinum er gott móti megu- og krapta-leysi, og matar-ólyst; þaraf takist full teskeið í senn, 3svar dagliga, í spæni, fullum af mysu. Af trè þessu fæst og það í útlöndum alræmda birkivatn. Það skeðr á þennann hátt: á vorum fyrrum laufin sprínga út, tekr maðr þá yztu húð af, sem svari ríxorts-stórum bletti á fullvaxinni, þó ei gamalli hríslu; borar síðan með stuðulnafri neðanfrá skáhalli upp-ávið. Í þetta gat setjist pípa úr arnar eðr álftar-fjöðrum. Undir vatn það sem renur, setr maðr, og láti síðan vatnið á flöskur, og leggi til þess sykr eðr húnáng, hèrumbil 5ta part, og geymir síðan, svo leingi eigi fúlmar. Saft þessi inutekin, 2 teskeiðar í senn, 2svar til 4sinnum dagliga, er þvagleiðandi, styrkjandi, samandragandi, ormdrep-andi, blöðrusteini eyðandi; ítem góð móti skyr-bjúgi, holdsveiki, kláða og gulu. Birkivatnið seydt í tin- eðr leirpotti, við mjög hægán eld, verðr að saft mjög líkri sýrópi, og sem hefir líka krapta vatninu; þaraf takist 1 full teskeið. Börkrinn

stórt mulin og á hann sett vatn, sem standi hér-um 14 daga nærri il, litar skína, sem er situlaust, lifrautt, sè það í löginu lagt, og látið liggja nokkra daga, þartil nógu dökkt verður. Birkiblöð, nýsoðin með vatni og álúni, gefa gulan lit.

- b. Dvergabirki (*B. nana*). Blöðin krúglótt, hríngnöbbótt; ísl. Fjalldrapi.

Er runni, að nokkruleiti uppréttr, að nokkruleiti framáviðliggjandi, 2skipt-greinótt, með dökk-rauðum berki og dúnhærðum kvistum. Blöðin missett, stuttlleggjuð, slétt, stíun, minni enn 2skild-ingr. Kall- og kvenn-streingirnir stuttlleggjaðir, uppreistir, eggmyndað-sívalir, og eru einstakir í blaðhornunum. Fræin flöt.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

## 6. Netla (*Urtica*).

- a. Brennu-Netla (*U. urens*). Blöðin mótsett, sporeskjumynduð, 5sinótt. Klasarnir einfaldir.

Rótin aangótt. Staungullinn uppréttr, greinótt, með hvítum, brennandi hárum. Blöðin leggjótt, hvassnöbbótt, snörp, stíun og raudhærð. Axialblöðin snörp, beygð á bak aptr. Blómstrkransarnir í blaðhornunum, nær því jafnlángir staunglinum. Kvenubikarinn samanhrykktr.

1 árs urt; blómstrar í júní, júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- b. Tvíþýlis-netla (*U. dioica*). Blöðin mótsett, hjartmynduð. Blómstrklasarnir greinóttir í þorum saman, kall- og kvennblómstr-



in sundrskilln sltt á hvörri urt; ísl.  
Brennunetla, Notrugras.

Rótin greinótt, skrífandi, seig. Stannglarnir  
uppréttir, greinóttir, reunnóttir, með hvítum hár-  
um. Blöðin leggjuf, nöbbótt, með hvítum, brenn-  
andi hárnum. Axinblöðin eggmynduf, uppreist.  
Blómstrklasarnir leingri enn á undangangandi.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi hefir þvagleiðandi og uppleysandi  
kraft. Hún brúkast því móti tíðateppu og vot-  
um hósta. Af seyði rötariunnar, sem blandað sð  
með 8da parti af húnáangi, takist 2 spónblöð í  
senn, 4sinnum dagliga. Blöð urtarinnar hafa á  
efra borðinu stíngandi brodda, með þeim er eink-  
ar gott að stínga allvana og tilfinningarlausa limi  
líkamans.

4ða Orða (*Polyandria*) með 8 dupthberum  
eðr fleiri.

## 7. Hornurt (*Ceratophyllum*).

a. Þyrni-frævuð Hornurt (*C. demersum*)  
hefir þyrnóttann ávöxt.

Staungullinn lánger, þráðmyndaðr, blöðóttur,  
sumpart sveymandi, sumpart niðrsokkin. Blöðin  
eru í krönsnum í kríngum staungullinn, 8 í hvörj-  
um kransi, 2skipt, samansett með strikmyndndum,  
ofantil reunnóttum eðr tenntum leppum, sem á þeim  
efri eru þflumyndaðir. Blómstrin sitjandi, einstök,

í blaðhornunum. Ávöxturinn aflánger, hefir 1 þyrnir í efri og 2 í neðri endaun.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

8. Þúsundblað (*Myriophyllum*).

- a. Axinblómstrað þúsundblað (*M. spicatum*). Blómstrin með millibilum axmynduð, blaðlaus.

Staunglarnir lágir, þráðmyndaðir, niðrsokknir og sveymandi, greinóttir, blöðóttir, einkum ofan. Blöðin 4sett, kransmynduð, kambmynduð, uggótt, með opnum, slöttum, alilíkt-strikmynduðum smáblöðum. Axinin rétt-þráðmynduð í staungul- og greina-endanum, eru fyrir ofan vatnið og bera blómstrið í krönsum, sem eru með litlum eggmynduðum blómstrblöðum. Krónublöðin ljósrauð, hol, stærri á kall- enn kvenn-blómstrunum, sem sitja neðst og hafa ullhærð ör.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

- b. Kransblómstrað þúsundblað (*M. verticillatum*). Blómstrkransarnir í blaðhornunum.

Líkist mikið undangángandi, en hefir þó þéttari blöð, sem eru 5sett, hvörra efri, sem eru hjá blómstrunum, eru minni og dökkgræn, ekki svo smáskipt. Ítem hefir þessi urt minni hvítleit blómstrblöð, og blómstrunarformið er öðruvísi.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

## 22. H ó p r.

(Diæcia) tvíbýli.

1sta Orða (*Diandria*) tvímannaðar.

1. Víðir (*Salix*). Blómstrin í einum streing. Kallblómstrið hefir við neðri endann 1 hunángskirtil; 1 til 5 duptbera. Kvennblómstrið hefir 2 ör; og 1rúmað 2blaðkað fræhús. Ulluð fræ.

2ur Orða (*Triandria*) þrímannaðar.

2. Krækilýng (*Empetrum*). Bikarinn 3skiptr. 3 krónublöð. Kallblómstrið hefir 3 alltað 9 duptbera. Kvennblómstrið hefir 9 ör, og eitt 9frævað ber, sem er fyrir ofan blómstrið.

3ja Orða (*Octandria*) áttmannaðar.

3. Rósajurt (*Rhodiola*). Bikarinn 4skiptr. 4 krónublöð. 4 randskornar hunángshyrzlur. Kvennblómstrið hefir 4 dupthyrzlur. 4 margfrævuð fræhús.

4ða Orða (*Monadelphia*) samvaxnar.

4. Einir (*Juniperus*). Á kallblómstrinu er einn hreystraðr streingr; eingin króna; 3

duptberar. Kyennblómstr-streingrinn samanstendr af fáum hreystrum, sem fyrst eru kjötlig og síðan gróa saman í eitt þrífævað ber.

## 22. Hópr (*Diæcia*) tvíþýli.

1sta Orða (*Diandria*) tvímannaðar.

### 1. Víðir (*Salix*).

- a. Dvergavíðir (*S. herbacea*). Blöðin krínglótt, nöbbótt, slètt, netmynduð, æðótt, á báðum hliðum glansandi. Fræhúsið slètt; ísl. Grasvíðir, Kotúngslauf.

Rótin djúpt niðr, með fínum aungum. Bólrinn greinóttur, opt framáviðliggjandi, rötum skjótandi. Blöðin stuttleggjótt, fín-nöbbótt, stinn, sitja í greinatoppnum. Streingirnir í greina-endunum fáblómstraðir, eggmyndaðir. Hreystrin rauð á röndum. Fræhúsin eggmynduð, lensulík.

*Nytsemi og verkun:* góð fóðr-urt.

- b. Bláberjavíðir (*S. myrtiloides*). Blöðin eggmynduð, hvössa.

Er hríslulík trèurt, með greinóttum, görðóttum bol. Greinarnar rauðleitar; þær efstu ljósrauðar. Blöðin eru í greinatoppinum, þètt saman; á efri hlið græn, á neðri hlið gráleit, á röndum beygð a bak aptr. Á þeim vöxnu dökkrauð.

Blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- c. Blágrár Víðir (*S. glauca*). Blöðin egg-

mynduð-afflaung; á neðra borð fín, ullhærð;  
ísl. Grávíðir, Kotúnsvíðir, Tág.

Er hrísla. Bólrinn og greinarnar görðóttar, dökkrauðar, slèttar. Blöðin stuttleggjuð, snubbótt, slètt, lítið hærð; græn á efra borð, hvít neðan. Streingirnir eggmyndað-leggjóttir á greina-endunum, hvítir og svo þèttullaðir, að valla sjást hreystrin, Blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

d. Ullblöðóttir Víðir (*S. lanata*). Blöðin beggjamegin ullhærð, krínglótt, hvöss.

Er lítill runni með hvítleitum greinum. Blöðin snubbótt, ávið krínglótt, með litlum broddi, þètt-, hvít- og láng-ulluð. Streingirnir á greina-endunum, þykkir, sívalir, snubbóttir, með fínum hárum. Blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

e. Lapplenzkr Víðir (*S. lapponum*). Blöðin lensulík, loðin.

Bólrinn greinóttir, dökkur. Blöðin þètt saman í greina-endunum, hvöss; á efra borð dökkgrá, á neðra borð hvítleit. Kveunstreingirnir aflángir þá eru í blóma, en sívalir þá frævast. Kallstreingirnir minni, afláng-sívalir. Blómstar í júní.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

f. Sandvíðir (*S. arenaria*). Blöðin nær því heil á röndum, eggmynduð, hvöss; á efra borð lítið, á neðra borð mikið þètt-ullhærð.

Er runni með þykkum, ullhærðum, rauðleitum greinum. Blöðin leggjuð; á efra borð dökk-

græn, neðantil hvít. Kvennurtarblöðin mjórri; á neðra borð silkihærð. Fræhúsið hært.

Blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- g. Geitarvíðir (*S. caprea*). Blöðin eggmynduð, hvöss, nöbbótt, bylgjótt, á neðra borð fýld. Axlablöðin nær því túnglmynduð. Fræhúsin búkmynduð; ísl. Selja.

Urt þessi er stundum hríslulík, stundum sem trè. Greinarnar jafnar, gráglansandi, dökkleitar. Blöðin stuttleggjuð, meir eðr minna aflaug, eðr krínglótt, stundum hvöss, stundum snubbótt, á nývöxnu greinunum stærri enn á þeim eldri; á röndum hríngbugðótt, bylgjótt, í broddinn nöbbótt; á efra borð jöfn, neðan gráfýld. Axlablöðin krínglótt, túnglmynduð, beygð á bak aptr, hríngbugðótt, smáfýld. Streingirnir stórir, þykkir, spretta fyrri enn blöðin. Hreystin umsnúið-eggmynduð, hærð. Fræhúsin leggjjuð, hærð. Örin nærri óskipt.

Blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Víðir þessi er bezta trè til smá- og fagr-smíðis.

- h. Netblöðóttir Víðir (*S. reticulata*). Blöðin sporeskjumynduð, krínglótt, heil á röndum, slétt, netmynduð, æðótt; á neðra borð blágrá. Fræhúsin ullhærð.

Er lítil hrísla. Rótin lítið skriðandi. Bólrinn framáviðliggjandi, greinótt, útbreiddur, sívalur, þykkir eptir hæðinni; rauðleitr í broddinn. Blöðin lángleggjuð, stór, snubbótt, lítið raudskorin á röndum, beygð á bak aptr, með rauðleittum, net-

mynduðum æðum á neðra borðið. Streingirnir á staungul- og greina-endunum, lágleggjadir.

Blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

- i. Gráviðar-Víðir (*S. fusca*). Blöðin lítið tennt, eggmynduð; á efra borð dökk, smáhærð; á neðra borð glansandi fýld.

Ræturnar mjög láugar. Bólrinn uppréttr, greinótt. Kvistirnir grádúnaðir, lágir. Blöðin stuttleggjuð, myndast ýmisliga, eru stundum aflaug, stundum krúglótt. Streingirnir eru missettir á kvistunum, og eggmyndað-aflángir, loðnir. Ávaxtarhyrslan lensulík, stuttleggjuð, silkihærð. Blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

- k. Glansvíðir (*S. myrsinætes*). Blöðin sporskjumboð, nöbbótt, slètt, æðótt, á báðum hliðum glansandi. Kvistirnir stinnhærðir. Fræhúsin alilík, dúnhærð.

Er hrísla. Bólrinn greinótt. Greinarnar út-skagandi, hefir glansandi, þètt blöð, er sitja visin á greinum. Axblöðin nöbbótt, slètt. Streingirnir eggmyndaðir, aflángir á kvista-endunum.

Blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

- l. Hríslótt Víðir (*S. arbuscula*). Blöðin lensulík, smátennt, fyrir utan axlablöð. Kvistirnir dúnhærðir; ísl. Beinvíðir.

Er lítið hríslótt trè, með opnum, uppreistum greinum, er hafa dökkan börk. Blöðin missett, stuttleggjuð, þunn, beggjamegin slètt. Blaðstaunglarnir þunnir, linir. Blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

- m. Lárberja blöðóttir Víðir (*S. pentandra*). Er 5mannaðr. Blöðin sporeskjumynduð, lensulík, slètt. Ávaxtarhyrzlan slètt, nær því sitjandi.

Er trè. Greinarnar glansandi, slèttar. Blöðin hvöss, stuttleggjuð, smánöbbótt; á nöbbunum límgug; á báðum hliðum græn, slètt. Blaðstaunglarnir kirilóttir við neðri enda blaðanna. Streingirnir eru á kvista-eundanum. Kallstreingirnir litlir, sívalir, niðráviðbeygðir, gulir; kvennstreingirnir leingri og þynnri, með dökku hreystri. Duptberarnir venjuliga 5, stundum 7. Ávaxtarhyrzlan lensulík. Blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:*

Víðir þessi er styrkjandi, barkandi, móttstendr forrotnun, skyrbjúgi, ornum og köldu. Hann er því góðr móti allslags óstyrk, matarólyst, forrotnunar köldu, blóðlátum, lífsýki, blóðsótt. Seyði af berkinum takist 2 matspænin í senn, 4sinnum dagliga. Dupt af berkinum takist 1 teskeið í spæni fullum af mysu, 3svar dagliga. Af berkinum má dropa tilbúa þannig: tak af berkinum smámuldum 4 lóð, af bezta brennivíni 16 lóð, lát svo standa við il í viku, síá síðan það þunna frá. Af dropum þessum takist 60 í senn, 4sinnum dagliga, í spæni fullum af vatni. Með víðirberki má barka skinn, með sama hætti sem bírkiberki.

- n. Skríðandi Víðir (*S. repens*). Blöðin sporeskjumynduð, lensulík, með litlum



broddi; á efra borð slètt, á neðra borð  
silkihærð, blágrá. Bólrinn niðráviðþrykktr.

Bólrinn framáviðliggjandi, greinótttr, lítið  
skrífandi, dökktr. Greinarnar þéttar, nærri sam-  
flæktar, ljósleittr, slèttar, ofantil silkihærðar.  
Blöðin þétt saman, silkihærð á röndum, beygð á  
bak aptr. Kvistirnir settir missettum, aflángt-  
eggmynduðum, snubbóttum streingjum. Hreystrín  
umsnúið-eggmynduð, lítið innþrykktr, rauðleitt. Fræ-  
húsin lensulík, fínhærð, leggjúð. Blómstrar í júní.  
*Nytsemi og verkun:* sama sem næstundangangandi.

## 2ur Orða (*Triandria*) þrímannaðar.

### 2. Krækilýng (*Empetrum*).

a. Dökkt Krækilýng (*E. nigrum*). Bolirnir  
framáviðliggjandi; isl. Krækilýng, Lúsa-  
lýng.

Rótin með laungum augum, skrífandi. Bol-  
urinn greinótttr, rótum skjótandi. Greinarnar upp-  
reistar, dökkrauðar. Blöðin stundum dreif, stund-  
um kransmynduð, opin, stuttleggjuð, mjó-aflaug,  
snubbótt, þykk, á röndum beygð á bak aptr, hærð,  
á flatvegnum slètt. Blómstrin sitja staungullaus í  
efri enda þeirra árgömlu greina í blaðhornunum.  
Krónublöðin lítil, aflaug, rauð. Duptharnir  
lángir. Dupthyrzlan stutt, dökkrauð. Örið 9geisl-  
að. Berið kúlumyndað, svart, með 9 fræum, sem  
sitja í hring. Stundum hefir sama urtin bæði  
kall- og kvenublómstr, eru þá kallblómstrin ofar  
enn hin. Blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:*

Ber urtarinnar eru kælandi, og lítið saman-  
dragandi. Lögur berjanna seyddr er því góðr  
móti lifsýki, sèu af hönum teknir 2 matspænin í  
senn, hvörn annann tíma. Mauk tilbúið af berj-  
unum, blandað með vatni, er góðr drykkir móti  
þorsta og hita landfarsóttar-sjúkra. Af lög berj-  
anna má vfni líkan drykk tilbúa á norskan hátt,  
með því móti, að lögurina sè látinn á heldan  
eikarkút, síðan sè af nýbökuðu bakstrofus brauði  
bráðheit sneið tekin, í skyndi brotin og þannig í  
lögina látin, gegnum botngatið eðr sponsið, það  
sè síðan tilbyrgt; kemr þá gánger í, hvör þá varað  
hefir um hríð mínkar, verðr þá lögurinn klárari  
og veldrekkandi. Þess tel eg vissa von, að lögur  
þessi, lítið soðinn með horblöðku, og síðan á flösk-  
um geymdr, mundi leingi halda sèr óskemdr, og  
þannig verða eitt ágætt meðal móti skyrbjúgi og  
þvagstemmu. Sè ullar og líntægi fyrst soðið með  
vatni og álúni, og þareptir þurkað, síðan seydt  
með vatni og berjum þessum mörðum, fær það  
lifrauðan lit.

3ja Orða (*Octandria*) áttmannaðar.3. Rósajurt (*Rhodiola*).

- a. Ilmandi Rósajurt (*R. rosea*) hefir  
þökt, umsnúið-eggmynduð, kjötlig blöð.  
Blómstrin eru í einum skúf; ísl. Burul,  
Burkni, Höfuðrót, Hellnuhnoðra-  
rót, Greiðurót.  
Rótin þykk, kjötlig; af henni spretta margir

uppréttir, óskiptir, glörvalt blöðóttir staunglar. Blöðin sitjandi, slétt; í efri endann lítið nöbbótt. Blómstrskúfarnir á staungulendanum. Blómstrin gul. Kveankrónurnar minni enn kallkrónurnar. Duptberarnir jafnlángir krónunum.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi vex í klettaskornum, einkum móti norðri eður frá sólu, og hefir stóra rót. Hún hefir barkandi, styrkjandi, forrotnun móttstandandi, vessa-leysandi krapt. Hún er því góð móti lífsýki og blöðsótt, styrkir veikar sínar, og er eiukar góð í illaluktandi og slæm sár, líka móti guln og öðrum innvortis meinum. Af seyði rótarinnar má taka í senn 2 matspæni, 3svar dagllga. Rótin ný smásöxuð, og hnoduð með nýu sandasmjöri, er gott í holdfúa sár. Hún hreinsar og græðir. Af dupti rótariunnar takist lítil teskeið, 3svar dagllga. Með gulu blómstrunum og rótinni má gult lita, ef soðið er með litlu af álúni. Eiunig er seyði rótarinnar þénauilgt til skinnabörkunar.

4ða Orða (*Monadelphia*) samvaxnar.

4. Einir (*Juniperus*).

a. Almennr Einir (*J. communis*). Blöðin

5sett, opin, brodduð, þyrnótt, leingri enn berið; ísl. Einir, Einirber.

Er hrísla, sem hefir rétta stinnan og marggreinóttan bol, með sléttum berki. Blöðin ævarandi græn, nálmynduð, blágrá, þéttast í kvista-broddinum. Blómstrin eru í litlum, sitjandi, egg-

mynduðum streingjum í blaðhornunum. Berið kúlumynduð, dökkleitt, verður ei fullvaxið fyrirrenn ári eptir að urtin hefir blómstrað. Blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:*

Lauf og ber þessa trjávaxtar eru svita- og þvagleiðandi, vindeyðandi, magastyrkjandi, uppörfandi, forrotnun mótstandandi. Þau brúkast því móti vatnssýki, þvagstemmu, skyrbjúgi, tíðateppu, vindi og óhægðum í inniblum, andarteppu, máttleysi og liðaverkjum. Seyði af laufi einirsins má brúka í matspón í senn, hvört dagsmark. Te af blöðunum drekkið, er svari í pela, 3svar dagliga. Einirlauf eru einkar góð í gufubað móti aflleysi og liðaverkjum. Það er ogsvo gott í vot fótaböð, móti tíðateppu. Berin og laufin eru eitt hið hollasta reykelsi, einkum þá næmar sóttir gánga.

## 23. H ó p r.

(*Cryptogamia*) H u l d u b á.

Ista Orða (*Filices*) Breknur.

1. Eltíng (*Equisetum*). Á laufinu er einn streingr. Kríngum fræin eru 4 rykkir, durtberandi durtþræðir.

2. Asmund (*Osmunda*). Axinið greinótt. Fræhúsin nakin, kúlumynduð.

3. Höggormstúnga (*Ophioglossum*).

Axið í 2 röðum. Fræhúsið innþrykkt í axinið.

4. Úlfsfótr (*Lycopodium*). Fræhúsin samanþrykkt, einstök, í blaðhornunum.

5. Burkni (*Polypodium*). Blómstrin í krínglóttum dreifðum blettum, bæði með og fyrir utan reifar.

6. Smáblóm (*Asplenium*). Blómstrin í dreifum strikum. Reifarnar opna sig við laufa rifin.

7. Fiskiæti (*Isoetes*). Sameginlegi ávaxtarbotninn fyrir innan neðri enda laufsins. Fræin snörp.

#### 2ur Orða (*Musci*) Blaðmosar.

3. Rauðmosi (*Sphagnum*). Fræhúsmunninn jafn. Hettan þverskorin, umkríng fræhúsið við neðri endann.

9. Hármunni (*Phascum*). Fræhúsið lokað, með ævarandi aptrlæstu loki.

10. Brunnamosi (*Fontinalis*). Fræhúsið innilokað í hreytruðum mósabíkar.

11. Buxviðr (*Buxbaumia*). Fræhúsin skáhöll, búngótt á aðra, en flöt á hina síðuna.

12. Skuggahnappur (*Splachnum*). Fræhúsið sívalt, sitjandi á stórum viðbætir. Hettan affallandi.

13. Jómfrúarhár (*Polytrichum*). Fræhúsið sitjandi á litlum viðbætir. Hettan ullhærð.

14. Endahnappur (*Bryum*). Hettan jöfn. Ávaxtarleggrinn í staungul- og greinaendunum.

15. Hlíðarhnappur (*Hypnum*). Hettan jöfn. Ávaxtarleggrinn sprettr á mosabíkar, á staungul-hlíðunum.

16. Stjörnumosi (*Mnium*). Kvennurtarinnar botél aflaug, perulík. Munnarnir 2; hinnytri tennt; sá innri hymnulíkr, leppóttur. Kallblómstrið stjörnumyndað í efri endann. Hettan slétt, alílk. Lokið hvast.

17. Berjamosi (*Gymnostomum*). Kvennurtarinnar munnur utan tanna. Kallurtarinnar blómstr stjörnumyndað á aðskildum staunglum. Botelið eggmyndað.

18. Krónumosi (*Tetraphis*). Munnurinn einstakur, víðr, 4klofinn, stjörnumyndaðr. Botelið aflángt, nærri jafnbreitt, rétt.

19. Grimmja-mosi (*Grimmia*). Bot-  
 èlið með einföldum munna, mestan part  
 tennt, eggmyndað. Staungullinn greinótttr.

20. Rakmosi (*Orthotrichum*). Fræ-  
 húsið aflángt. Munninn 2faldr; sá ytri með  
 16 ábakaptr vundnum tönnum; sá innri og-  
 svo með einsmörgum.

21. Bartram-mosi (*Bartramia*). Bot-  
 èlin kúlulík. Munnurinn 2faldr; sá ytri  
 tennt. Tennurnar hvassar; innri munnurinn  
 hymnótttr, rykktr. Kvenn- og kallblómstrin  
 samsitjandi. Lokið hvast. Hettan alílk.

### 3ja Orða (*Hepaticæ*) Laufamosar.

22. Júngermann-mosi (*Jungerman-  
 nia*). Fræhúsið 4klofið. Ávaxtarleggrinn vex  
 á pípumynduðum mosabikar.

23. Marchantsmosi (*Marchantia*).  
 Kallblómstrið sitjandi, nakið. Kvennblómstr-  
 ið umsnúið-eggmyndað. Fræhúsin eru við-  
 fest leggjaðann, sameginligan, í efri endann  
 gapandi ávaxtarbotn. Hjá fræunum spretta  
 kúfúngsmynndað - snúnir, fjöðurkraptaðir  
 þræðir.

24. Hornmosi (*Anthoceros*). Ávöxturinn stríkmyndaður, alilíkr, hálf-tvíblöðkóttr, slíðraður við neðri endann af einum afkubbuðum, einblómstruðum bikar.

25. Blasmosi (*Blasia*). Kallblómstrið sitjandi, nær því kúlumyndað, sokkið ofaní laufið, skáhalt-eggmyndað, einrúmað. Endi þess er sem gapandi pípa.

26. Rikkja-mosi (*Riccia*). Fræhúsið niðrsokkið í laufið, er kúlumyndað, einrúmað með affallandi pípu.

#### 4ða Orða (*Algæ*) þarrar.

27. Vatnshymna (*Ulva*) er gagnsær, blaðlík hymna. Blómstrin eru smákorn, sem einkanligast eru á röndunum.

28. Þarri (*Fucus*). Blómstrin eru í hópsettum, ávölum blöðrum í sjálfum laufunum.

29. Vatnssilki (*Conferva*) er hárumlíkir þræðir á innri hlið með smákornum.

30. Dúnul (*Byssus*) er fínir, samflettadur þrædir. Blómstrin smákorn.

31. Mósi (*Lichen*). Ávaxtarbotninn ým-



isliga myndaðr, sitr annaðhvort á skorpu eðr laufmynduðum líkömum.

### 5ta Orða (*Fungi*) Sveppar.

32. Blaðsveppr (*Agaricus*). Hattrinn á neðra borð blöðkum settr, sem eru hvör við aðra.

33. Pípusveppr (*Bolitus*). Hattarins neðra borð holótt.

34. Rykkíngar-sveppr (*Helvella*). Hattrinn rykktr, óreglulega skiptr, niðrávið-beygðr.

35. Bikarsveppr (*Peziza*). Hattrinn hálfkúlumyndaðr, holr.

36. Kylfusveppr (*Clavaria*) með einsettri eðr greinótttri kylfu.

37. Riksveppr (*Lycoperdon*) er sívalr, krínglótttr, fullr af mjörlíliku fræi.

38. Skjálfandi (*Tremella*) er líkr soðhlaupi, og er óreglulega myndaðr. Æxlunar verkfærin ósjáanlig.

39. Mygla (*Mucor*) eru smáblöðrur með leggjum.

23. Hópr (*Cryptogamia*) Huldubú.

Ista Orða (*Filices*) Breknur.

1. Eltíng (*Equisetum*).

- a. Algeing Eltíng (*E. arvense*). Ófrjófu staunglarnir allir greinóttir. Greinarnar snarpar. Blómstrstaungullinn óskiptr. Slíðrin strjál, breitt innskorin; ísl. Eltíng, Góubitill, Gvondarber, Grómbitill, Sætutág, Sultarepli, Skollafótr.

Rótin skriðandi. Blómstrstaunglarnir gulleitir, með stórum, skurðóttum slíðrum, og á enda þeirra einstökum, dökkum, aflaungum streing. Þeir ófrjófu þynnri, ljósgrænari, með miðni slíðrum. Greinarnar kransmyndaðar, snarpstrendar.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi er barkandi, þvagleiðandi. Hún er því góð móti lifsýki og þvagteppu, samt blóðlátum. Seyði af urtinni drekkist, svo tebollum skipti, 3svar dagliga. Sè lúskaf eðr njarðarvöttur vætr í seyði þessu og stúnginn í nef manni, stillist nasablóð. Urtin er lèlig fóðr-urt fyrir nautpening og fè, en úngum hestum eykr hún fjör, en ei krapta.

- b. Skóga-Eltíng (*E. sylvaticum*). Greinarnar samsettar, bylgjótt beygðar, niðrávið-beygðar, snarpar.

Rótin skriðandi. Urtin öll græn. Staungullinn rèttr, liðóttur, skurðóttur, snarpr. Greinarnar

kránsmyndaðar, að öðruleiti líkar staunglinum. Einn liðrinn umfaðmar hinn annann svoleiðis, að efri endi neðra liðsins er utanum neðri part hins efra með óskiptum, dökkum hymnulaufum. Streingirnir einstakir á staungulendanum, uppreistir, eggmyndaðir, snubbóttir, dökkleitir.

Margra ára urt; blómstrar í maí og júní.

*Nytsemi og verkun:* . . . . .

Urt þessi er góð og þéttanlig að barka með skinn. Sömuleiðis að fægja með horn, bein og málma.

c. Keldu Elting (*E. palustre*). Blómstrastaunglarnir strendir, greinóttir, hafa upp-  
rættar, snarpar greinar.

Róttin skriðandi. Staungullinn settr þéttum, þunnum, liðóttum, óskiptum, grænum greinum. Slíðrin hvít á röndum. Streingrinn í staungulendanum dökkleitr.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

d. Tjarna Elting (*E. fluviatile*). Ófrjófu staunglarnir þétt- og snarp-greinóttir; þeir blómstrandi óskiptir. Slíðrin þétt, á röndum burstamynduð, margskipt.

Urt þessi þekkist frá einni undangangandi, við að hún er hærri, þykkri, og hefir þykkun, aflángan, gulleitan, snubbóttan streing á staungulendanum. Ófrjófu-staunglarnir hvassir, með margföldum, þunnum, og, þá fullvaxnir eru, langum greinum. Slíðrtehnurnar svartar. Blómstrar í maí.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- e. Skarneltíng (*E. limosum*). Þær fáu staungulgreinar jafnar. Streingrinn á staungulendunum.

Líkist mjög undangángandi, og álízt af sumum urtávísnum að vera sömu tegundar, en má þó þekkjast frá henni við að staungullinn er þynuri, liðirnir smærri, slíðrtennurnar styttri, færri greinar á blómstr- og eiugar á ófrjófu-staunglunum.

3. Margra ára urt; blómstrar í maí.

- f. Fægíngar-Eltíng (*E. hyemale*). Staungullinn nakinn, snarpr, neðantil fágreinótt. Slíðriu neðantil hvítleit, ofan svört. Streingurinn í staungulendunum; ísl. Eskigras, Góceitill.

Urt þessi þekkist frá enni undangángandi við að hún hefir blágráan lit, stutt, strjál slíðar, og er snörp. Þegar staunglarnir ekki hafa streing á endanum, eru þeir hvassir.

*Nytsemi og verkun:*

Með urt þessari má vel fægja horn, bein og málma.

## 2. Osmund (*Osmunda*).

- a. Túngl-Osmund (*O. lunaria*). Lauflíð ugghótt, neðantil axinberandi. Smáblöðin túnglmynduð, hrínguöbbótt; ísl. Túnglurt.

Rótin auggótt. Lauflíð leggjótt, slétt, misakandi, misjafnt-uggað, gulgrænt. Axiníð leggjáð, uppreist, greinótt. Greinarnar í 2 röðum. Á röndum þeirra sprettu ljósdökk, slétt fræhús.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

3. Höggormstúnga (*Ophioglossum*).

- a. Almenn Höggormstúnga (*O. vulgatum*). Skapthið einfaldt. Axinið í 2 röðum. Lanfið eggmyndað, æðalaust.

Róttin auggótt. Urtin samanstendur af einstöku, leggjuðu, dökkgrænn blaði, sem er heilt á röndunum; við neðri enda sprettur uppreist, leggj-að, stríkmyndað, einnar síðu, tvíraðað axini. Axleggjinn leingri, eður jafnlánger blaðstaunglinum.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun*: sæmilig fóðr-urt.

4. Úlfsfótr (*Lycopodium*).

- a. Fjalla Úlfsfótr (*L. alpinum*). Blöðin í 4 röðum, þökt, hvöss, hryggjótt. Blómstrblöðin eggmyndað-lensúlík, flöt. Smágreinarnar uppréttar; ísl. Jafni.

Staunglarnir framáviðliggjandi, skrifðandi, þunnir, lítið blöðóttir, mislángir. Greinarnar uppréttar, þétt-blöðóttar. Blómstrgreinarnar missettgreinóttar. Blöðin slétt. Blómstraxinið ogsvo stutt. Blómstrblöðin breið neðan, hvöss að ofan. Fræhusin nýrumlík, gal.

Margra ára urt; blómstrar í ágúst.

- b. Almennr Úlfsfótr (*L. clavatum*). Blöðin dreif, ofantil breiðmyndað. Blómstrblöðin breið, hymnúlík. Blómstrgreinarnar neðantil flatar, þnrstakkar; í efri endanum 2- eður 3skiptar; ísl. Jafni, Jafnabróðari.

Staunglarnir framáviðliggjandi, útbreiddir á allar síður, greinóttir, rötum-skjóttandi. Blómstr-

greinarnar uppreistar; þær ófrjófu liggjandi. Blöðin þètt, þökt, nálmynduð, endast í þráðmynduðum bursta. Uppreistu greinarnar endast í flötum, burstalíkum, uppreistum legg, á hvörjum vaxa 2 eðr 3 sívöl axin. Blómstrblöðin gul. Fræhúsin í blaðhornunum sitjandi, einstök, gul. Fræin brenni-teinsgul, fín.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Báðar (þessi og undangangandi) urtir eru þerrandi, verkeyðandi, barkandi, uppleysandi; þær brúkast móti iðraverki, uppþembíngi, blóðsótt og lífsýki. Seyði af þeim drekkist, svo hálfpelum skipti, 3svar dagliga. Smáskornar og eltar saman við smjör, eðr salve af þeim tilbúið, er gott að draga í lèreft, og leggja yfir líf barna sem uppblásið er. Mosar þessir báðir lita gult, með því móti, að birkiblöð sèu fyrst seydd í vatni, þartil láti maðr síðan Jafna eðr Jafnabróðir smáttskorinn, og sjóði þarí ull til orðin er falliga gul.

c. Áttsettr Úlfsfótr (*L. selago*). Blöðin dreif, hvít, nakin á röndum, lénsulík, öll eins sköpt, átt Röðuð. Staungullinn 2skiptur, upprèttir; ísl. Vargslappi, Skollafíngur.

Rótin með laungum aungum. Staunglarnir upprèttir, eðr uppstígandi, greinóttir, snubhóttir, þykkir. Blöðin þètt, dökkgræn. Fræhúsin í blaðöxlunum, úyrumlík.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- d. Fimmsettr Úlfsfótr (*L. annotinum*). Blöðin dreif, lítið nöbbótt, nakin á röndunum, 5sett. Blómstrblöðin breið, afkubbuð. Blómstrgreinarnar æðótt-liðóttar.

Staunglarnir skriðandi, blöðóttir. Blómstrgreinarnar uppréttar, 2skiptar, hafa lið fyrir hvört ár. Blöðin lensulík, jafnt-útstandandi. Blómstrblöðin þétt, þökt, gulleit. Fræhúsin nýrumlík, gul. Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- e. Flatr Úlfsfótr (*L. complanatum*). Blöðin 2sett, samgróin. Bláðið á efra borðinu einstakt. Axinin í þörum, leggjuð.

Staungullinn framáviðliggjandi, flat-sívalr, greinótt. Greinarnar 2skiptar, flatar. Blöðin þökt, hvöss. Staungulblöðin eggmynduð, lensulík. Blómstrblöðin breið, ljósgul. Á enda blómstrgreinanna er lánger, þunnur, gulleitr leggr, sem í efri endanu er skiptr, og ber 2 sívöl axini.

Margra ára urt; blómstrar í júlí og ágúst.

*Nytsemi og verkun:*

Með blöðum urtar þessarar má gult lita, hafi maðr lýng með.

- f. Efa-Úlfsfótr (*L. dubium*) hefir óskipt, upprétt, flatþrykkt skot. Blöðin samfýld, hryggjótt, missett, tveggja hliða þökt. Skotin þétt, hvöss á báðum endum.

Margra ára urt. *Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- g. Randhærðr Úlfsfótr (*L. selaginoides*). Blöðin dreif, randhærð, lensulík. Blómstrblöðin opin.

Rótin smáaungótt. Af henni spretta margir niðráviðliggjandi, greinóttir staunglar, sem neðan-til hafa minni blöð enn ofan. Blöðin innávið-beygð í broddinn, ljósgræn, glansandi. Fræhúsin eru í blaðhornunum, og þekkjast þarvið að þau efstu eru einföld og þau neðstu hafa 4 frækorn.

Margra ára urt; blómstrar í ágúst.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

### 5. Burkni (*Polypodium*).

- a. Stóruggaðr Burkni (*P. filix mas*). Smá-blöðin snubbótt, nöbbótt. Staungullinn smá-hreystrótt. Blómstrblettirnir krínglóttir, með stórum, nýrumlíkum reifum; ísl. Burn, Burkni, Tóugras.

Rótin stór; vatnsflöt, hreystrótt. Laufin umhverfis, lensulík, uppreist. Blöðin missett, lensulík, með laungum broddi. Smáblöðin slétt, nöbbótt, einkum í broddinn, í blaðendunum samgróin. Á hvörju smáblaði eru stórir blómstrblettir í 2 röðum, 3 eðr 4 í hvörri röð. Reifarnar sem hylja þessa bletti, eru skammvinnar, klofnar öðrumegin.

Margra ára urt; blómstrar í júlí, ágúst og september.

*Nytsemi og verkun:*

Urt þessi er barkandi og ormdrepandi. Seyði af rótinni nýrri drekkist 1 tebolli í senn, kvöld og morgna. Brend til ösku, gefr hún mikið lútarsalt, og brúkast því af Euskum til sápuvjörðar. Með urtinni og rót hennar má og barka skium með sama hætti og birkiberki. Með blöðum hennar má grænt lita. Urtin er góð fóðr-urt.



b. Smáuggaður Burkni (*P. filix femina*).

Smáblöðin hálfugguð, nöbbótt, broddlaus.

Laufleggrinn jafn. Reifarnar nýrnhlíkar.

Rótiu þykk, hreystrótt, vaðusflöt; á henni vaxa mörg umhverfis breið-lensulík, dökkgræn lauf. Blöðin missett, lensulík, hvöss. Smáblöðin allanng, niðráviðhlaupandi, þéttsett litlum blómstrblettum, sem hafa reifar.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

c. Meyr Burkni (*P. fragile*). Neðri blöðin

strjál. Smáblöðin hálfugguð, innskorin,

nöbbótt. Laufleggirnir vængjaðir.

Rótiu hreystrótt, skrifðandi, margangótt. Af henni spretta mörg umhverfis, 3ja hliða, lensulík, slött, dökkgræn lauf. Staungullinn dökk, glansandi, slött, meyr. Blöðin lítið missett. Smáblöðin hjartmyndað, eðr umsuúð-eggmynduð-lensulík. Blómstrblettirnir kúlmynadaðir, litlir, hvít-leitir.

Margra ára urt; blómstrar í júní og júlí.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

d. Brunna Burkni (*P. fontanum*). Laufið

strikmyndað, lensulíkt, hvasst. Smáblöðin

hjartmyndað, snubbótt, hálfuggótt, hríng-nöbbótt, á efra borð slött.

Rótiu með þéttum og laungum aungum; af henni spretta mörg uppreist, mjó lauf. Staunglarnir lítið boguir, neðantil settir stórum hreystrum. Smáblöðin missett, þétt samau, á efra borð ljósgræn, á neðra borð með þéttum blómstrblettum.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- e. Almennur Burkni (*P. vulgare*) með aflaungum, lítið nöbbóttum, snubbóttum leppum.

Rótin hreystrótt, vatnsflöt, skrifðandi, sett dökku hreystri og dökkum hárum. Af hennu spretta mörg uppreist, slétt, leggjuð, lensulík, neðst ugg-uð lauf. Fliparnir umskiptandi, þeir neðstu lítið innskornir við neðri endann eframegin. Blómstr-blettirnir sitja einraðaðir, beggjamegin sinarinnar á flipunum.

Margra ára urt; blómstrar allt sumarið.

*Nytsemi og verkun:*

Í Noregi eta menn rót urtar þessarar; líka er hún þar möluð til mjöls og höfð til brauðgerðar. Hún hefir og mýkjandi og slímhreinsandi krapt.

- f. Loðinn Burkni (*P. ilvense*). Laufin uggótt, hafa á sér aflaung, hálfugguð, snubbótt, á neðra borð loðin smáblöð. Lepparnir eggmyndaðir, heilir á röndum. Blómstr-blettirnir þéttir á röndunum.

Rótin þétt, aungótt; á henni vaxa mörg uppreist, lánleggjuð, umhverfis lensulík lauf. Staunglarnir, einkum á nývöxnum urtum hærðir. Smáblöðin mótsett; þau neðstu strjál.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- g. Túngluggóttur Burkni (*P. lonchitis*). Smáblöðin túnglmynduð, ranðhærð, teunt. Staunglarnir hreystróttir.

Laufin uppreist, lensulík, með mörgum aggum. Smáblöðin stuttleggjuð, þètt, hvassnöbbótt, neðan hríng-flipótt; þau efstu blómstrberandi. Blómstrin í gulum óregluligum blettum.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

h. Þriðblöðóttur Burkni (*P. dryopteris*).

Laufin 3faldr-ugguð. Blöðin opin, niðrávið-beygð. Smáblaðalepparnir snubbóttir, lítið hríngnöbbóttir.

Rótin þræðilík, þunn, skríðandi, hreystlaus. Laufstaungullinn þunnur, lánger, slèttur, einsog laufið, skiptist fyrst í 3 leggi, hvörjir aptr eru 2uggóttir. Laufið umhverfis nærri jafut, 3ja hliða, þunnt, ljósgrænt. Smáblöðin aflang, sitjandi, mótsett, þau neðstu samgróin. Blómstrblettirnir litlir, eru nær því á röndunum.

Margra ára urt; blómstrar í júlí.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

i. Mýra-Burkni (*P. thelypteris*). Laufblöðin hálfugguð, lítið hríngnöbbótt; þau neðstu ugguð, standa í kross. Blómstrblettirnir samanhlaupandi.

Rótin laung, skríðandi; á henni spretta mörg uppreist, umhverfis breið-lensulík lauf, undir hvörjum er langur leggr. Blöðin mótsett-lensulík, hvöss, slètt, með eggmynduðum leppum, sem eru á neðra borð þèttsettir blómstrblettum. Þegar þeir eru fullvaxnir orðnir, beygjast þeir á bak aptr á röndunum.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- k. Safnaðar Burkni (*P. phegopteris*). Blöðin 2 inuskorin. Þau neðstu smáblöð niðráviðbeygð, og sitja saman við neðra enda staungulsins. Stærri blöðin hvöss í efri endanu, þau miðni snubbótt, aflaug, heil á röndum.

#### 6. Smáblóm (*Asplenium*).

- a. Norðrlenzkt Smáblóm (*A. septentrionale*). Laufið hálfuggað, 3skipt. Smáblöðin eðr lepparnir missett-strikmyndaðir, í broddinn trosnaðir.

Rótin þétt, svört, með laungum aungum. Á henni spretta mörg uppreist, í efri endanu niðráviðbeygð, lánleggjuð, dökkgræn, slétt, neðanvert mjórri lauf. Blómstrstrikin þétt, dökk og hylja allt neðra borðið.

Margra ára urt; blómstrar allt sumarið.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

#### 7. Fiskiæti (*Isoetes*).

- a. Sjó-Fiskiæti (*I. lacustris*). Laufin alilík, hálf-sívöl. Fræhúsin krúglótt, 2rámuð.

Rótin hnöllótt, með mörgum laungum aungum. Laufin uppreist, lík sefi, þétt saman, hvöss, liðótt, slétt, fjórrámuð, neðantil hvítleit, umfaðmandi fræhúsið, sem er fullt af mörgum litlum hvítum fræum.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

#### 2ur Orða (*Musci*) Bláðmosar.

#### 8. Rauðmosi (*Sphagnum*).

- a. Almennur Rauðmosi (*S. cymbifolium* s.

*palustre*). Greinarnar niðráviðbeygðar, uppblásnar. Blöðin eggmynduð, snubbótt, búkmynduð; ísl. Barnamosi.

Urtin öll hvít eðr rauðleit. Mosastanugullinn uppréttr, settr mörgum þettblöðóttum, broddþannum greinum. Blöðin þett, hvört ofaná öðru, í broddina lítið innáviðbeygð, á efra borð hol. Ávaxtarleggurinn á staungul- og greina-endunum, hefir á efri enda aflángt, kúlumyndað fræhús með flötu loki.

Margra ára urt; blómstrar í júní.

*Nytsemi og verkun:*

Menn segja, að mosi þessi sé góður að leggja í skó við fótasviða og fótadofa; hann er og hentugur að troða með húspil, og svo til þettingar. 5 eru héraðauk tegundir sama kynferðis, sem eru hvör annari svo líkar, eðr lítið mismunandi, að ei virðist þörf þær sérilagi að útmála.

#### 9. Hármunni (*Phascom*).

- a. Skaptlaus Hármunni (*Ph. acaulon*) hefir lánan legg. Fræhúsið kringlótt. Blöðin lítið eggmynduð, hvöss.

Eins árs urt; blómstrar í nóvember.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

2 eru héraðauk tegundir sama kynferðis, sem eru mjög líkar þeirri fráskírðu.

#### 10. Brunnamosi (*Fontinalis*).

- a. Lángur Brunnamosi (*F. antipyretica*). Staungullinn greinótt. Blöðin eggmynduð,

hvöss, hryggjótt, þökt, 3röðuð, hafa umsnúð-eggmyndað hliða fræhús.

Staunglarnir greinóttir, blöðóttir, fljótandi, línir. Blöðin dökkgræn, heil á röndum. Fræhúsin nær því sitjandi umkríng á mosabíkarunum. Lokið alilíkt, fleigmyndað, snubbótt. Ber ávöxt á sumrum.

*Nytsemi og verkun:*

Mosi þessi, sem leingi heldr í sér deiglu, er góðr til að varna bruna með.

b. Litli Brunnamosi (*F. minor*) með ugghmynduðum, hvössum blöðum. Fræhúsin eru í toppinum. Líkist að öðru þeim undangangandi, en er minni.

c. Hærðr Brunnamosi (*F. capillacea s. squamosa*) er lánleggjaðr, með mjóum, lensulíköm, dökkgrænum blöðum.

11. Búxviður (*Buxbaumia*).

a. Blöðótttr Búxviður (*B. foliosa*) er legglaus, hefir skaptlausan fræhuapp, sem er umkríngðr hvössum blöðum.

Eins árs urt; blómstrar í október.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

12. Skuggahnappur (*Splachnum*).

a. Eggmyndaðr Skuggahnappur (*S. ampullaceum*). Viðbætirinn umsnúð-uppmjór, sykróppmyndaðr, snubbótttr, grændökkrauðr, þéttari enn fræhúsið. Blöðin lensulík, hvöss, nöbbótt.

Stauuglarnir þéttir, uppréttir. Blöðin þétt, hryggjött, þau neðri mjórri. Fræhúsleggrinn leingri enu stauugullinn, bugðóttur, rauðleitr. Fræhúsið lítið, gulleitt, sívalt. Viðbætirinn perulíkr, rauðleitr. Eins árs urt; ávaxtast í júní og júlí.

*Nytseni og verkun:* óþekkt.

- b. Klukkulíkr Skuggahnappur (*S. urceolatum*). Leggrinn greinóttur. Blöðin aflaug, rekumynduð.
- c. Flöskulíkr Skuggahnappur (*S. vasculosum*) með flöskulíku, eður nær því huplótta fræi, eður ávaxtarhúsi. Viðbætirinn rauður, stór. Blómstrstauugullinn stuttur.
- d. Mosa-Skuggahnappur (*S. muscioides*). Leggrinn einsettur. Blöðin lensulík, hærð, líkist mikið klukkulíka skuggahnappnum, en er minni.
- e. Rauður Skuggahnappur (*S. rubrum*). Blöðin eggmynduð. Blómstrskýlan purpura-rauð, ávöl á aðra, en flöt á hina hljóðna.

### 13. Jómfrúarhár (*Polytrichum*).

- a. Almenn Jómfrúarhár (*P. commune*). Stauugullinn óskiptr. Blöðin strikmynduð, lensulík, fín-nöbbótt. Fræhúsið uppreist, ferhyrnt. Viðbætirinn sívalr.

Rótin með laugum, þéttum augum, skriðandi, hærð. Stauugullinn uppréttur, röttur, blöðóttur. Blöðin dökkgræn, stinn, opin, slétt. Blómstrið tvíþýlis á stauugulendanum, og sýnist þá kallbúið mynda skerborði líka stjörnu. Kvenfræhúsið sitr

á dökkum legg, hefir rauðleitan minnu og gulleitt lok. Hettan 2föld, sú minni hymnulk, sú ytri þétt-gulleit, hærð.

Margra ára urt; blómstrar í júní, ávaxtast í september.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

b. Fjalla Jómfrúarhár (*P. alpinum*). Staungullinn greinóttir. Blómstrstaungullinn í endanum. Blöðin heil á röndum, mjó. Fræhnapprínu eggmyndaðr. Hettan loðin.

c. Krukkulíkt Jómfrúarhár (*P. urnigerum*). Staungullinn greinóttir. Bláðstaunglarnir millum blaðanna. Botellið sívalt, einginn viðbætur. Hettan loðin.

d. Vængjað Jómfrúarhár (*P. aloides*). Blöðin 2ja hliða útstandandi. Botellið einnar síðu.

#### 14. Endahnapp (*Bryum*).

a. Þak-Endahnapp (*B. rurale*). Staungullinn greinóttir. Blöðin snubbótt, beygð á bak áptr, hærð í broddinn, þau efstu stjörnu-mynduð. Fræhúsin eggmynduð, sívöl.

Staunglarnir þétt saman, greinóttir, blöðóttir. Blöðin dökkgræn, heil á röndum, aflang. Leggirnir í staungulendunum eðr á hliðunum, þá staungullinn verður leingri. Fræhúsið uppreist.

Margra ára urt; ávaxtast í apríl.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

b. Beygðr Endahnapp (*B. flexuosum*). Blómstrstaungullinn marghlykkjóttir. Blöðin



hárumlík. Botèlið tennt. Tennurnar 2-klofnar, stuttar, nokkuð innáviðbeygðar.

- c. Litaður Endahnappur (*B. extinatorium*). Staungullinn nær því einfaldr, eður lítið greinótttr. Blöðin lensulík. Botèlin aflaung, uppreist. Hettan gul-glausandi með alilíkum broddi.
- d. Alilíkr Endahnappur (*B. subulatum*). Staungullinn lítið skiptr. Blöðin lensulík. Botèlin uppreist, alilík. Hettan slètt.
- e. Dránga-Endahnappur (*B. scoparium*). Staungullinn upprètttr, greinótttr. Blöðin lensulík, lsfðu. Blómstrstaunglarnir í efri enda staungulsins.
- f. Bylgjótttr Endahnappur (*B. undulatum*). Botèlin aflaung, uppreist. Blómstrstaunglarnir einsettir. Blöðin lensulík, hryggjótt, bylgjótt, tennt.
- g. Missettr Endahnappur (*B. heteromallum*). Botèlin rètt, lítil. Hettan allík. Staungullinn rètttr. Blöðin hárlík, lsfðu.
- h. Mosa Endahnappur (*B. hypnoides*). Staungullinn greinótttr. Hliðargreinarnar stuttar. Blómstrstaunglarnir ógsvæ stuttir. Botèlin eggmynduð. Hettan uppmjókkandi. Urtin öll loðin.
- i. Sylfr Endahnappur (*B. argenteum*). Botèlin hángandi. Mosastaungullinn sívalr, þaktr, slètttr.
- k. Dupt-Endahnappur (*B. pulveratum*). Botèlin sitjandi, lítið lútandi. Blöðin hærð, hárumlík.

1. Snubbótttr Endahnappur (*B. pyriforme*). Botèlin upprètt, eggmynduð. Hettan alilik. Mosastaungullinn greinalaus. Blöðin eggmynduð, hvöss.

15. Hliðarhnappur (*Hypnum*).

- a. Toppgreinótttr Hliðarhnappur (*H. proliferum*). Staungullinn 3faldr-uggaðr. Blöðin hjartmynduð, aðþrykkt, 1- eðr 3sinótt, lin, heil á röndum, lokið alilíkt; ísl. Gamburmosi.

Staunglarnir framáviðliggjandi, þrykktir niðr að jörðu. Blöðin þètt, þókt, litíð hol. Mosabikarinn alilíkr. Leggirnir rauðir, margir saman. Fræhúsið sívalt.

Margra ára urt; ávaxtast í maí.

*Nytsemi og verkun:*

Mosa þennan má brúka í dýnur, og að troða í rifur á þillrúsum.

- b. Lensublöðótttr Hliðarhnappur (*H. taxifolium*). Staungullinn einsettr, greinalaus. Bláðið lensulíkt, einsett, uggótt, frá hvörs neðri enda blómstrstaungullinn sprettr. Botèlið lútandi; ísl. Gamburmosi.

*Nytsemi og verkun:* sama sem undangángandi.

- c. Tenutr Hliðarhnappur (*H. denticulatum*). Staungullinn greinalaus. Blómstrstaungullinn geingr út frá rótinni. Blöðin 2sett. Botèlin með snubbóttu loki.

- d. Þrísettr Hliðarhnappur (*H. triquetrum*). Greinarnar niðráviðbeygðar. Blöðin

eggmynduð-útbreidd, áhakaptrbeygð í 3 röðum.

- e. Breknublöðóttir Hliðarhnappur (*H. filicinum*). Staungullinn greinóttur, fjöðurlíkr. Greinarnar lítið aðskildar. Blöðin eggmynduð, hvöss, 1síðu.
- f. Veggja Hliðarhnappur (*H. parietinum*) er mjög líkr toppgreinótta hliðarhnappnum, nema að greinarnar hafa niðráviðbeygðan brodd.
- g. Aflánger Hliðarhnappur (*H. praelongum*). Staungullinn niðráviðliggjandi lánger. Greinarnar aðskildar. Blöðin eggmynduð, rétt, hvöss, sitja í 2 eða 3 röðum. Botðlin lútandi.
- h. Trèmyndaðr Hliðarhnappur (*H. abietinum*). Greinarnar sívalar, einfjaðraðar, uggóttar. Blöðin lítil, eggmynduð, með krók á endanum.
- i. Mænirs Hliðarhnappur (*H. crista castrensis*). Greinarnar þéttar, uggóttar, með eggmynduðum, lítið niðráviðbeygðum lútandi enda. Botðlin lútandi.
- k. Cyprusblaðaðr Hliðarhnappur (*H. cupressiforme*). Staunglarnir smáuggóttir. Blöðin 1síðu, niðráviðbeygð, í efri endann alilíkr. Botðlin umsnúið-eggmynduð, áviðböginn eða slútandi.
- l. Krókmyndaðr Hliðarhnappur (*H. aduncum*). Staungullinn greinóttur, 1síðn.
- m. Þveingmyndaðr Hliðarhnappur (*H.*

*scorpioides*). Staungullinn niðráviðliggjandi. Greinarnar þykkar, aðskildar, ofantil beygðar. Blöðin hvöss, sitjandi, ísfön.

- n. Aþtráðakbeygðr Hliðarhnappur (*H. squarrosus*). Staungullinn skriðandi. Greinarnar útbreiddar. Blöðin eggmynduð, í efri endann alilík, ábakaptrbeygð í hring.
- o. Upprèttur Hliðarhnappur (*H. dendroides*). Staungullinn upprèttur. Greinarnar í einsettu bindini, í efri enda hans. Botèlin upprètt.
- p. Stuttgreinóttur Hliðarhnappur (*H. curtispiculum*). Greinarnar stuttar. Blöðin eggmynduð, hvöss, útstandandi. Botèlin stuttleggjuð, lútandi. Munnurinn með stuttum tönnum, með einu hári við hvörja tönn.
- q. Hreinn Hliðarhnappur (*H. purum*). Greinarnar dreifar, hvassar í efri endann. Blöðin snubbótt, eggmynduð, aflaug, þökt.
- r. Glær Hliðarhnappur (*H. illecebrum*). Greinarnar snubbóttar, rættar. Blöðin eggmynduð, stíngandi.
- s. Hvass Hliðarhnappur (*H. cuspidatum*). Staunglarnir lágir. Blöðin aðskild, hvöss. Greinarnar upprættar, hvassar, 2ja hliða. Botèlin niðráviðbeygð.
- t. Silkilíkr Hliðarhnappur (*H. sericeum*). Staungullinn skriðandi. Greinarnar bognar, þættar, sitjandi. Blöðin alilík, lángydd. Botèlin rætt.
- u. Glansandi Hliðarhnappur (*H. nitens*).

Staungullinn rætttr. Greinarnar stuttar, þétt saman, ofanverdt gular, neðantil daukkrauðar. Blöðin alilik, ofantil glausandi.

#### 16. Stjörnumosi (*Mnium*).

- a. *Brunna Stjörnumosi (M. fontanum)*. Staungullinn neðantil einfaldr, ofantil hujá-beygðr. Frælnapparnir með finum leggjum, stjörnulíkir. Botèlin nær því kúlumynduð.
- b. *Vatns Stjörnumosi (M. hygrometricum)*. Utan staunguls. Rótarblöðin eggmynduð, hvöss. Botèlið snúið, stórt, nær því hjartmyndað, rennótt.
- c. *Krókbeygðr Stjörnumosi (M. hornum)*. Staungullinn einsettr. Blöðin í efri endanu sagtennt. Blómstrstaunglaruð krókbeygðir.
- d. *Hrár Stjörnumosi (M. crudum)*. Staungullinn einsettr. Blöðin lensulík, gagnsær, glausandi. Hettan beygð á bak aptr.
- e. *Uppmjór Stjörnumosi (M. pyriforme)*. Botèlið sívalt, nær því hjartmyndað. Lokið snubbótt. Blöðin hárumlík, al-mynduð. Staungullinn einsettr, mjór.
- f. *Blóðbergs Stjörnumosi (M. serpyllifolium)*. Blöðin gagnsær, aflaug, bylgjótt.

#### 17. Berjamosi (*Gymnostomum*).

- a. *Afkubbaðr Berjamosi (G. truncatum)*. Botèlin kúlumynduð. Lokið hvasst. Blöðin lensulík.

18. Krónumosi (*Tetraphis*).

- a. Gljáandi Krónumosi (*T. pellucida*), með eggmynduðum, gagnsærum blöðum. Greinalaufin staungullaus. Botèlin í toppinum.

19. Grimmjamosi (*Grimmia*).

- a. Toppmyndaðr Grimmjamosi (*G. apocarpa*). Botèlið í toppinum með litlu laufi, nær því skaptlaust. Blöðin lensulík, hvöss.

20. Rakmosi (*Orthotricum*).

- a. Strikmyndaðr Rakmosi (*O. striatum*). Blöðin lensulík. Botèlin aflaug.

21. Bartram-mosi (*Bartramia*).

- a. Epllíkr Batram-mosi (*B. pomiformis*). Blöðin hárlík. Botèlið kúlumyndað.

3ja Orða (*Hepaticæ*) Laufamosar.

22. Júngermannmosi (*Jungermannia*).

- a. Flatr Júngermannmosi (*J. complanata*). Staunglarnir skriðandi, flatir. Bæði blöðin sjálf og axlablöðin krínglótt, þétt, þökt. Fræhúsblöðkurnar lensulíkar.

Staungullinn greinóttur, blöðóttur, útbreiddur, dökkur, einsog öll urtin er. Mosabikariinn aflánger, samauþrykktr. Blómstrstaungullinn stuttur. Ávaxtast síðla sumars.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

- b. Sívalr Júngermannmosi (*J. julacea*). Blöðin þökt, smáklofin, valla sýnilig með

beru auga. Blómstrin sitja á blómstrstaunglinum.

- c. Snubbóttur Júngermannmosi (*J. asplenoides*). Blómstrin í efri enda greinanna. Greinarhar jafnbreiðar.

Stauugullinn greinóttur. Blöðin eggmyndað, eður nærri krúglótt, í efri endanu snubbótt, lítið hærð.

- d. Tvíyddur Júngermannmosi (*J. bicuspidata*). Blöðin 2tennt. Blómstrin í staungullhliðunum.

- e. Hvítleitr Júngermannmosi (*J. albicans*). Blöðin hvöss, aflaug, niðráviðbeygð. Blómstrin í efri enda stauugulsins.

- f. Umsnúinn Júngermannmosi (*J. resupinata*). Blöðin smánöbbótt, þökt, krúglótt. Blómstrin sitja á hliðum stauugulsins, eður neðantil á sívölum greinum.

- g. Útvíðkaður Júngermannmosi (*J. dilatata*). Stauugullinn skrífandi, marggreinóttur, útbreiddur. Greinarnar breiðar í efri endanu. Blöðin krúglótt.

- h. Hærður Júngermannmosi (*J. ciliaris*). Stauugullinn skrífandi. Blöðin sitja í 2settum röðum, á neðri hlið loðin, hærð.

- i. Afblöðóttur Júngermannmosi (*J. epiphylla*). Blómstrstaungullinn uppstígandi frá einu litlu blaði, sem er útbreidt á höfuðblaðinu án stauuguls.

- k. Feitur Júngermannmosi (*J. pingvis*). Höfuðblaðið afláengt, flippótt, limugt. Blómstrstaungullinn sprettur á röndinni.

1. Þríklofinn Júngermannmosi (*J. furcata*). Utan staunguls. Smáblöðin jafnbreidd, í efri enda 3klofin, snubbótt.

m. Kletta Júngermannmosi (*J. rupestris*). Greinarnar sívalar. Blöðin alilíkt, snúa einu veg. Blómstrstaunglarnir stuttir.

23. Marchantsmosi (*Marchantia*).

a. Almennr Marchantsmosi (*M. polymorpha*). Laufin snubbótt, flípótt. Kallbikarinn skjöldmyndaðr, Kvennbikarinn ávalr.

Laufin flöt-útbreidd, grænglausandi með skakkerkyrindum æðum; á neðra borð dökkleitt, þéttsett fínum rótaraungum. Á efra borðinu finnast nokkurskonar niðráviðmjókkandi, á röndum hríngnöbbóttar holur, á hvorra botni finnast nokkur græn korn, sem álitast að vera skot eðr laukr, hvarvið urtin æxlást. Í blaðleppahornunum eru leggjúð blómstr, hvaraf kvenukynið er geislað. Kallkynið þarámót hríngnöbbótt. Margra ára.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

24. Hornmosi (*Anthoceros*).

a. Stúnginn Hornmosi (*A. punctatus*). Laufið rykkt, leppótt. Fræhúsið upprètt, strikmyndað, alilíkt.

Laufin útbreidd í hríng, flöt, aðþrykkt jörðunni, dökkgræn með hækkaðri rönd. Kallblómstrin bikarmynduð, innþrykkt í laufið, með leppótttri rönd. Fræhúsið upprètt, 2blaðkað. Blöðkurnar utanvert ávalar.



Eins árs urt; blómstrar síðla sumars.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

25. Blasmosi (*Blasia*).

- a. Lítil Blasmosi (*B. pusilla*). Laufla snubbótt, flípótt, á röndum rykkt. Ávextirnar uppreistir á laufröndunum.

Laufla sem á undangangandi, þó flatar, lítið þökt, kjöttlig á neðra borðið. Randirnar og broddrinu smákúlusettr, nærri við sína miðjuna eru einrúmuð, eggmynduð fræhús.

Eins árs urt; blómstrar síðla sumars.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

22. Rikkjamosi (*Riccia*).

- a. Kristalls Rikkjamosi (*R. cristallina*). Fræhúsið sett smáum vörðum.

48a Orða (*Algæ*) þarrar.

27. Vatnshymna (*Ulva*).

- a. Stór Vatnshymna (*U. latissima*). Laufið einstakt, flatt, breidt, á röndinni bylgjótt; ísl. Fergin.

Er ljósgræn að lit, hymnulík, glausandi, slétt. Þurkuð er hún gulleit, mjög hymnulík. Eins árs.

*Nytsemi og verkun:*

Þarsem gnægð fæst af hymnu þessari, mætti hún vel brúkast til áburðar í mykjastað; í Færcyum hefir hún í harðindum verið til matar höfð.

- b. Nabla Vatnshymna (*U. umbilicalis*). Laufið flatt, skjöldmyndað, einblaðað, skinnlíkt.

Er bugðótt, slött, lítið rykkt hymna, sem á miðjunni er föst á steinum.

*Nytsemi og verkun:*

Í Skotlandi er hymna þessi etin, soðin með ediki og pipar, hún er og söltuð niður í flát, er tekin í marz-mánuði.

c. Pípótt Vatnshymna (*U. intestinalis*) er pípótt eður uppblásin, líkist uppblásnum lánga, er sem grænleit hymna.

d. Samanþrykkt Vatnshymna (*U. compressa*). Líkist næstundangángandi, við að hún er pípótt, en er marggreinuð. Greinarar mjóar, jafnbreiðar.

e. Margskipt Vatnshymna (*U. lactuca*). Hymnulík, fíng- eður hjartmyndað-skipt, neðan til mjórr.

f. Lensulík Vatnshymna (*U. lanceolata*) er lensulík og slöttliggjandi.

g. Laung Vatnshymna (*U. linza*) er aflaug og uppblásin.

h. Rykkt Vatnshymna (*U. plicata*) er hymnulík, föst á miðjunni, staungullaus, samanlögð í margfaldar rykkfugar.

i. Fræ-Vatnshymna (*U. sobolifera*) er þveingilik, pípumynduð, allavega sett mjóum þveingjum.

28. Þarri (*Fucus*).

a. Nöbbóttur Þarri (*F. serratus*). Laufið flatt, 2skipt, nöbbótt, tennt, með vörtumynduðum blómstrum á broddinum.

Rótin skjöldmyndað, föst á steinum. Laufið flatt, staungulmyndað við neðri endann, síðan dökkleitt, skinnlíkt, hefir eitt höfuðrif, gegnum öll sundrskiptin.

*Nytsemi og verkun:* Sauðfè etr þarra þennan.

b. Blöðru-þarri (*F. vesiculosus*). Laufið flatt, hefir 2 rif, heilt á röndum, með blöðrum, sem eru í þörum í hornunum, og vörtu á broddinum; ísl. Klóþáng, Bólupáng, Belgjaþáng, Þunnaþáng.

Rótin lík sem á undangángandi, hvörjum þessi mjög líkist, en mismunar einungis þarvið, að laufin eru mjórri og lítið þykkri.

c. Útþaninn Blöðruþarri (*F. divaricatus*) með 2skiptu, útspenutu laufi. Margra ára.

*Nytsemi og verkun:*

Þessi og undangángandi þángtegundir eru það einukum, af hvörjum til ösku brendum, lútarsalt er tilbúið.

d. Görðóttur þarri (*F. nodosus*). Laufið samanþrykkt, 2skipt. Blöðin heil á röndum, 2ja hliða. Blöðkurnar einstakar, víðar; ísl. Þykkvaþáng, Ætiþáng.

Rótin sem á undangángandi. Blöðin greinótt, uppblásin, með mörgum bólum, hërur á hvörjum 3ja þumlungi, grængul. Blómstrblöðkurnar leggjótta, missettar, umsnúð-eggmyndaðar, gular.

Margra ára.

*Nytsemi og verkun:*

Sauðfè etr þarra þennan. Grænt má og með hönum lita.

e. Strengja-þarri (*F. filum*); samanstendr af sívölum, óskiptum, brjóskilíkum þráðum.

Líkist mjög mjóu : þveingjum, er smáblótttr, finnst vera slepjaðr, hálfágusær, grágulleitr.

Margra ára.

*Nytsemi og verkun:*

Í Noregi eta kýr þáng þetta.

f. Gaffals-þarri (*F. furcellatus*) er þráðmyndaðr, 2skipttr, marggreinótttr, livenessstr.

Er og svo 2skipt-greinótttr, þykkri ofau enn neðan, dökkleitr. Margra ára.

*Nytsemi og verkun:* óþekkt.

g. Sverðblóðótttr þarri (*F. digitatus*).

Laufið heudilíkt. Smáblöðin sverðmynduð. Staungullinn sívalr; ísl. þaungull, Hrossaþaungull.

Hefir þykkau, lánau, jafnau bol, ofautil útbreidd lauf, sem eru dökk, og sem regluliga skiptast við neðri enda í stríkmynduð, lensulík, sundrskipti, eðr smáblöð, sem eru heil á rönduum.

Margra ára.

*Nytsemi og verkun:*

Í Færeyum er þarri þessi til manueidis notaðr; hestar og sauðfè eta hann. Þurkaðan má og brúka hann til eldiviðar.

h. Boga-þarri (*F. esculentus*). Laufið óskipt, sverðmyndað, lensulíkt, langt. Bláðstaungullinn neðantil sívalr, í blaðinu 4 hliða, flatþrykktr; ísl. Muru- eðr Máfukjarni.

Rótin margaungótt. Blaðstaungullinn uppað blaðinu sívalr, ofantil með nokkrum vatnsflötum, aflauugum, lensulíkum, snubbóttum, við neðri endann mjókkandi smáblöðum. Hið stóra blað sverðmyndað-lensulíkt. Ofantil óregluliga unggótt og trosnað, neðantil bylgjótt, smárykkt. Margra ára.

*Nytsemi og verkun:*

Til manneldis má urt þessa einkarvel brúka þannig: maðr afvatuar hana fyrst hèrum 2 dægur, þareptir er hún smátt skorin, sem annað kál, síðan soðin með mjólk eðr mysu eðr vatni, eptir sem hæfa þykir og efni eru á; til grautar er hún þá hollr og nærandi matr. Með varsemi má og staungullinu, sem geingr ígegnum blaðið, hráan eta. Urtin er bezta fóðr-urt, einkum fyrir kýr, bæði hrá, afvötnuð, sem og soðin, þá hún og reynist góð fyrir fè og hesta.

i. Sæti-þarri (*F. saccharinus*). Laufið nærri óskipt, sverðmyndað. Staungullinn sívalr, stuttur; ísl. Beltis-þarri, þarra-belti.

Laufið sem á undangangandi, hefir eingin smáblöð neðantil, á röndunum bylgjótt, dökkgulr, með 2 dökkum, marghlykkjóttum strikum og einum stuttum staungli. Margra ára.

*Nytsemi og verkun:*

Þarra þennan má fullvel eta, sem og sumstaðar tíðkast, t. d. í Færeyum, hvar hann er talinn með beztu borðrèttum; ítem er hann allgóð fóðr-urt.

k. Randhærðr þarri (*F. ciliatus*). Laufin

hymnulík, toppskjótandi, randhærð; ísl. Sölvamæðnr.

Laufin greinótt, dökkljósrauð, fleigmynduð ofantil, leppótt, á röndum kögrlögð. Margra ára.

*Nytsemi og verkun:* Þarri þessi er vel ætligur.

1. Krúsaður þarri (*F. crispus*). Laufin hymnulík, 2skipt. Lepparnir útvíðkaðir.

Líkist undangangandi, en er þó stærri, og í stað kögrsins hefir hann lítil, snubbótt, aflaug blöð á röndunum, er og af hárauðari lit enn hin. Margra ára.

*Nytsemi og verkun:*

Er sem undangangandi vel ætligur, og fenaður allr etr hann.

m. Handmyndaður þarri (*F. palmatus*). Staungullinn stuttr. Blöðin misstór, djúpt klofin. Lepparnir neðanverðt mjóir í broddinn öðrumeginn tenutir; ísl. Söl.

Rótin veigalítill, augótt, skriðandi. Staungullinn þunnur, óskiptur, opt einginn. Af rótinni spretta þétt, og í bindini samanhneppt blöð, 2-3-eðr fleir flípótt, flöt, hymnulík, fín, næstum gagnsær og glansandi, falliga dökkrauð á lit, stundum líka bleik. Margra ára.

*Nytsemi og verkun:* sjá eptirfylgjandi.

n. Sauða-þarri (*F. ovinus*). Staungullinn slètt. Blöðin missett, djúptklofin. Lepparnir neðantil mjóir; í broddinn öðrumeginn tenutir, hinumeginn klofnir; ísl. Söl.

Er nokkuð stór, þunnhymnulíkr, fagr-rauður. Lepparnir fleigmyndaðir, heilir á röndum, nema

í broddinn, neðantil eru lítil, leggjuð, lensulík blöð.

*Nytsemi og verkun:*

Báðar (Þessi og undangangandi) þángartir, mega metast jafnhentugar til manneldis. Þær eru þarfyrir utan, sem lækninga-urtir, kælandi, vallgáng mykjandi, uppleysandi, þvagleiðandi, nærandi, stillandi, svitadrífandi og styrkjandi. Ferskar álagðar dreifa þær hitabólgu og tökum. Soðnar í vatni með litlu af nýu smjöri, til þess verða að grant, og þannig etnar, mýkja þær vallgáng og örfa svita. Þurkaðar, sem vani er til, og etnar, ásamt öðrum þúngum mat, svo sem fiski, styrkja þær magann og meltingar kraptinn, og þannig allan líkamann eptirleiðis. Saltvera sú, er við þau loðir, og sem vör köllum Hneitu, er sem önnur meðal-sölt (*Salia neutra*) uppleysandi, svita- og þvagrás-leiðandi, er því sölva-át einkar gott fyrir þá er þjást af innvortis bólgu og meinkætnum, gulu og vatnssýki, því heldr sem það útheimtir venjuframar drykk, en allr drykkur hefir til ávaxtar þynníngu og frekari úttæmíngu þeirra stöðnuðu og þykku vessa.

o. Uppblásin þarri (*F. inflatus*) með breiðum, lensulíkum blöðum, sem eru stúngin í efri enda, uppblásin, skipt.

p. Horn-þarri (*F. ceranoides*) með lensulíkum blöðum, greinótt. Blómstrunnar verkferin sitja í efri endanum í 2klofnum vörtum. Blöðin stúngin.

q. Toppmyndaður þarri (*F. spiralis*).

Blöðin heil á röndum, stúngin, neðan jafnbreið. Blaðstaungullinn mjórri neðan, þar sem hann stendr líkist hann suðnum toppi.

- r. Lítli-þarri (*F. distichus*). Blöðin heil á röndum, jafnbreið með vörtusetnum og hvössum ávaxtar verkfærum.
- s. Skálm-þarri (*F. siliquosus*). Blöðin lensulík, heil á röndum. Ávaxtar-verkfærin með skapti, aflaug, hvöss. Staunglarnir margir saman, greinóttir.
- t. Fax-þarri (*F. aculeatus*). Staungullinn þræðilíkr, marggreinóttur, með alilíkum, röttum, missettum, og dröfnóttum tönnum; ísl. Fjörufax.
- u. Reima-þarri (*F. loreus*) með þveingilíkum, 2settum, dröfnóttum blöðum. Frjófgunar-verkfærin hærð.
- v. Mosa-þarri (*F. lycopodioides*). Staungullinn þræðilíkr, sívalr, greinóttur, þéttsettr smáum, hárumlíkum blöðum; ísl. Öðuskeljaþálg.
- x. Ullar-þarri (*F. lanosus*). Staungullinn margskiptr, mjög finn sem ull.
- y. Marggreinóttur þarri (*F. fastigiatus*). Staungullinn 2skiptr, með yfrið mörgum, jafnháum, snubbóttum greinum.
- z. Tenntr þarri (*F. dentatus*). Laufin slétt, margskipt. Greiðarnar leppótt-tenntar.
- þ. Fiðr-þarri (*F. plumosus*). Blöðin lensulík, fjöðruð beggja megin.
- æ. Brjósk-þarri (*F. cartilagineus*). Líkist



- að öllu næstundangangandi, utan að blöðin eru þynuri, minni, og fagr-rauðari.
- ö. Marggreinuóttir þarri (*F. gigartinus*). Laufin brjóskilík, margsamsett, uppúr hvörra efri enda spretta mjóir broddar með kúlu-mynduðum líkama á eudannum.
- aa. Vængja-þarri (*F. alatus*). Laufin 2skipt, slétt. Greinarnar eru missettar, niðrhlaupandi, hárauðar á lit.
- bb. Horn-þarri (*F. corneus*). Blöðin þræðilík, jöfn, 2skipt; ísl. þussaskegg.
- cc. Hvítr-þarri (*F. albus*). Laufin mjó, hvít, mjög smáskipt.
- dd. Sveppa-þarri (*F. fungularis*). Blöðin hríngbugðótt, sveppilík, á röndum hymnulík, innskorin, ljósleit.
- ee. Litli-þarri (*F. carvaliculatus*). Staungullinn margskiptur. Laufið efst, 2skipt, efri laugin á aðra síðu ávöl, nær því eggmynduð á hinu síðu íhvolft.
- ff. Útskorinn þarri (*F. excissus*). Staungullinn 2skiptur, greinuóttir. Laufin öðrumegin ávöl, hinumegin íhvolft.
- gg. Blóð-þarri (*F. sanguineus*). Staungullinn sívalr, greinuóttir. Blöðin aflaug, hymnulík, lensumynduð, bylgjótt, heil á röndum.
- hh. Rauðleitr þarri (*F. rubens*). Staungullinn greinuóttir. Blöðin aflaug, hymnulík, stórtennt, rauðleit.
- ii. Hríslóttir þarri (*F. flagelliformis*). Staungullinn og laufið margskipt í þræði. Þræðirnir sívalir, langir.

- kk. Gras-þarri (*F. fæniculareus*). Staungullian þræðilíkr, marggreinóttur, með smáum, eggmynduðum blöðrum, sem eru í efri enda greinanna.

*Nytsemi og verkun þarranna yfir höfuð:*

Fyrir utan það, sem áður er umtalað við einstöku þarra um nytsemi þeirra, eru allir þarrar yfirhöfuð þénanlegir til að berast saman í stór-dýngjur eður hauga, hvarí þeir sæu látnir sína, og síðan færast sem áburður á tún og urtagarða. Líka má af nokkrum þeirra, einkum þeim stærri tilbúa pottösku eður lútarsalt, hvarum gjör má lesa í Íslands lærdómslista Félags 8da bindi. Með nokkrum þeirra má og líta, nefni og þartil Blöðru-þarrann (*Fucum vesiculosum*), er gefr lín- og hampvefnaði, dökkgrænan eður kaffebrúnan lit, sæ það með hönum soðið. Allvíða eru og þarrar til eldiviðar brúkaðir.

29. Vatnssilki (*Conferva*).

- a. Stranda Vatnssilki (*C. littoralis*). Þræðirnir lágir, stinnir, greinóttir, dökk-rauðir.
- b. Tvískipt Vatnssilki (*C. dichotoma*). Þræðirnir 2skiptir, nokkuð þykkir; ísl. þussackegg.
- c. Greinótt Vatnssilki (*C. cancellata*). Þræðirnir stuttir, marggreinóttir, missettir og margskiptir.
- d. Margmynduð Vatnssilki (*C. polymor-*

*pha*). Þræðirnir hnjábeygðir, greinóttir, í bindinum saman.

- e. Kletta Vatnssilki (*C. rupestris*). Þræðirnir marggreinóttir, hnjábeygðir, grænir.
- f. Kúlulíkt Vatnssilki (*C. ægagropila*) samanstandr af mjög fínum, greinóttum hárum, samundnum í hnykilmyndaðan líkama.
- g. Grænt Vatnssilki (*C. æruginosa*). Hárinn með fallegasta grænum lit.
- h. Hreystrað Vatnssilki (*C. squarrosa*) er greinótt, umhverfis sett þöktum og hreystruðum burstum eða hárum.

### 30. Dúnall (*Byssus*).

- a. Húlin Dúnall (*B. cryptarum*) er grá að lit, sítr sem fín hár á klettum.
- b. Mjöl-Dúnall (*B. jolithus*). Líkist rauðu mjöli sitjandi á steinum.
- c. Græn Dúnall (*B. botryoïdes*) finnst grænt á jörðuinni, einkum hvar vatn hefir yfirstaðið á vetrum.

### 31. Mosi (*Lichen*).

- a. Skorpulíkir Mosar (*Crustacei*).

- 1. Mjólkhvítr Mosi (*L. lacteus*) er hvítr með litlum sprángum, og ávölum hvítum vörtum.

Efni hans er mjólkhvítr, þunnur hrúður, sem er fastur á steinum, og settur þöttum vörtumyndum skjöldum.

*Nytsemi og verkun:*

Mosa þennan má brúka til að lita með bæði dökkgult og grænt.

2. Málaramosi (*L. geographicus*) er gulleitr með svörtum smánöbbum og strikum, ei ólíkr málverkum.
3. Blóðmosi (*L. sangvinarius*). Skorpan gráleit með svörtum nöbbum, sem innu eru rauðleitir. Nabbarir eru í fyrstu snubhóttir með lítilli rönd, síðan verða þeir ávalir, og líkjast þá litlum storknuðum blóðdropum.
4. Grámosi (*L. fusco-ater*) er dökkbrúnn með nær því krínglöttum nöbbum. Skorpan smákornótt.
5. Kalkmosi (*L. calcarius*) er kríthvít mosi með ófrjófnum; lítið niðrþrykktum nöbbum; þá hann eldist, verður hann gráleitr.
6. Litunarmosi (*L. tartareus*). Kornid hvít-grænt með gulleitum, heilrönduðum skjöldum.

Er þykkt grátt sprungið hrúðr, með strjálum skjöldum, sem eru bleikleitir.

*Nytsemi og verkun:*

Mosi þessi hefir í sér mikið litgjörðar-efni.

7. Svartleitr Mosi (*L. subfuscus*) er hvít með dökkleitam skjöldum.
8. Ljósmosi (*L. candelarius*) er ljósgulr með gulum skjöldum. Smáblöðin fínrykkt.

b. Þaktir Mosar (*Imbricati*).

9. Steinumosi (*L. saxatilis*) er blágrár,

snárpr; netmyndað-bólótt; á neðra borð  
dökk. Blöðin bugðótt-leppótt, flöt, lítið  
afkubbuð. Skyldirnir dökkleitir; ísl. Lit-  
unarmosi.

Er þykk, útbreidd. Skyldirnir þéttir sam-  
an, um miðjuna stórir, hefir upphækkaða rönd.

*Nytsemi og verkun:*

Þessi mosi hefir á sér margskonar litunar-  
efni, og brúkast því til margvísigrar svertu lit-  
gjörðar.

10. Lèttir Steinmosi (*L. omphalodes*). Blöð-  
in slètt, margklofin, snubbótt, með smáum,  
upphækkuðum, stráðum púntum eðr depl-  
um; undir eðr á röndunum svartleitr að  
ofanverðu grágræn með bléttum.

11. Grænmosi (*L. olivaceus*) með leppóttum,  
sléttum, og dökkgulum blöðum.

12. Falúnsborgar-Mosi (*L. Faluhnensis*).  
Blöðin svört, leppótt, mjó, tvískipt, með  
upphækkaðri, hvassri rönd. Blöðin útbreidd,  
rykkt. Skildirnir svartleitir, heilir.

13. Trèmosi (*L. physodes*). Blöðin leppótt,  
á röndum snubbótt, líkt og uppblásin væru,  
á efra yfirborði hvítgrá, slètt; á neðra borð  
svartblá. Blöðin dökk, hefir gufan lit.

14. Blákolls-Mosi (*L. stygius*). Blöðin  
dökk, margskipt, leppótt, með niðrávið-  
beygðri rönd. Ávaxtarverkfærið með ilivolf-  
um, nöbbóttum, dökkum skálum.

15. Stjórnumosi (*L. stellaris*). Blöðin ösku-  
grá, lítil, aflaug, leppótt, með dökkbláum

skjöldum. Fyrst eru skildirnir litlir, síðan verða þeir stórir, krúsaðir, bláir. b

16. Veggja-Mosi (*L. parietinus*), með krús-  
uðum, gulum blöðum, og eldgulum skjöldum.

*Nytsemi og verku:* . . . . .

Mosi þessi hefir í sér rauð og gul litunarefni.

c. Bláðmosar. (*Foliacei*).

17. Íslands-Mosi (*L. Islandicus*) er græn-  
kaffebrúnn að lit. Smáblöðin uppstigandi,  
margskipt-klofin, rennótt-randhærð. Skild-  
irnir sitjandi flatir, eins litlir og blöðin;  
ísl. Fjallagrös.

Samanstendr af uppreistum, greinóttum, lítið  
smá-fýldum blöðum, sem eru ljósdökk, á rönd-  
num lítið hærð. Skildirnir stórir, venjulega  
dekkri ein blöðin.

*Nytsemi og verku:* . . . . .

Mosategund þessi er alþekt; hún takist helst  
í vætu, þurkist síðan og hreinsist vandliga. Hún  
er styrkjandi, samandragandi, völgang mýkjandi,  
nærandi, blóðhreinsandi, ormdrepandi. Hann er  
því góður móti lunguaveiki og hósta, lífsýki, blóð-  
sótt, harðlífi, innanmeinum, ornum, uppþembingi,  
matleiða og kraptaleysi. Hann brúkast bæði smá-  
skorinn og líka í duppi sem te, eður sem mauk og  
hlaup. Af teinu er gott að drekka hvern litla  
pelaskál í einu. Mauk af hönum getr tilbúist með  
tvennu móti: a) tak 2 lóð af fjallagrasa duppi,  
og sjóð með 1 pela af vatni, til þess jafnþykk  
kvoða er vorðin; eður b) tak smásöxuð fjallagrös  
2 lóð, af vatni 1 pela, og eins mikið af mjólk,

sjóð þetta þartil þykknar, síð síðan hið þunna frá, og er ofantallinn skammt mátuligr að brúka kvöld og morgna, með litlu af nýmjólk útá. Fjallagrös er héraðsæki en hollasta fæða fyrir alla sóttlera menn, sem veigi þola umann mat. Með þeim má og gult lita, séu þar söðin með áluni. Þetta þannig litaða ullarverk verður á síðan rautt, sé það í kúahlæð lagt, sem skipt sé um annannhvörð dag.

18. *Lúngna-Mosi* (*L. pulmonarius*) er stinnur, skinnú líkr, útbreiddr, netmyndað-æðótttr, með bugðótttr, með afkubbuðum leppum, dökkgrænn á neðra borð, galryðlitaðr, stinnhærðr. Skildirnir á blaðröndunum dökkleitr.

Er mikið útbreiddr. Flíparnir afkubbaðrandskornir. Á efra borði hans finnast tíðum litlar hvítar vörtur.

*Nytsemi og verkun:*

Mosa þennan má brúka til að setja öl á; ítem að bærka með skinn; ítem að lita dökkt með

19. *Mjölmosi* (*L. farinaceus*) er stinnur, gráblár, slötttr, leppótt-gréinótttr, með ávolum vörtna. Skildirnir leggjótttr, grábláir. Blöðin þétt, mjó, uppreist, hvítleit, margskipt. Lepparnir hvassir. Vörturnar mjög litlar, hvítleitar.

*Nytsemi og verkun:*

Mosi þessi inniheldr efni til grænnar og dökkar lituargjörðar.

20. *Sníjómosi* (*L. nivalis*) er hvítr, rötttr, greinótttr, með krásnum blöðum, upphækkaðri rönd og litlum holum.

21. *Óskumosi* (*L. fraxineus*) er stinnur, öksu-

grár, hrúkkóttur, með lensulíkum, leppóttum, flötum, uppreistum blöðum. Skildirnir stráðir, á röndum ljósgráir.

Samaustendr af ýmisligum, uppreistum, ljósgráum, stórum blöðum, sem stundum eru heil á röndum. Skyldirnir lítið leggjaðir.

*Nytsemi og verkun:*

Mosi þessi er kvoðulíkur, því vel brúkandi til mannheldis.

22. Skeljamosi (*L. furfuraceus*) er greinóttur, niðráviðliggjandi, með hvössum blöðum, sem neðantil eru með smáholum, ofantil þökt gráu mjöli; neðan dökkblá, í broddinn hvít.

23. Þyrnimosi (*L. prunastris*) er greinóttur á efri síðu, með netlíkum, upphækkuðum strikum. Á neðri hlið holóttur, snjóhvítur.

*Nytsemi og verkun:*

Mosi þessi gefur gulan og dökkan lit.

#### d. Skinnmosar (*Coriacei*).

24. Þorskamosi (*L. aphtosus*) er sléttlagður, með snúðbóttum leppum, grænn, sléttur, með gráum eða svörtum vörtum, líkt sem stráður væri smágrjónum.

*Nytsemi og verkun:* gefur dökkbrúnan farfa.

25. Hundamosi (*L. caninus*) er útbreiddur, hringflípóttur, neðantil kögrlagður - æðóttur. Skildirnir aflángir, uppstígandi, ljósdökkir. Blöðin mikið útbreidd, slétt ofan, á röndum lítið upphækkuð. Skildirnir á flípaendunum sitjandi, nokkuð stórir. Margra ára.



*Nytsemi og verkun:*

Með mosa þessum má dökkt lita; ítem er hann góður að leggja við hundsbit.

26. *Æðamosi* (*L. venosus*) er slétt, nær því eggmyndaðr; á neðri síðu með dökkum æðum, með vatnsflötum skjöldum á endunum, ofanverdt grænn, neðantil hvítr, hærðr, með dökkum æðum. Ávaxtarverkfærið, sívalt, dökkt.

27. *Púngamosi* (*L. saccatus*) er krúglótt, með innþrykktum skjöldum á blaðinu, sem neðantil líkist litlum púng, grænn að lit, með dökkum, íhvolfum skjöldum.

28. *Saffransmosi* (*L. croceus*) er krúglótt, slétt, neðantil aðótt, hærðr, gulsaffranótt, með stráðum skjöldum, á efra borð grænn, á neðra borð eldgulr með dökkum skjöldum.

29. *Umsnúinn Mosi* (*L. resupinatus*) er greinótt, grásvartr með röndum, og nær því hjartmyndaðum skjöldum.

*Nytsemi og verkun:* Mosi þessi gefr dökkau lit.

*e. Naflalíkir Mosar (Umbilicati).*

30. *Trjónumosi* (*L. proboscideus*) er hymnulíkr, netmyndað-hrúkkótt, gráleitr; á neðra borð bleikr, jafn, á röndum hrúgnöbbótt, uggaðr. Skildirnir toppmyndaðir, lítið leggjóttir; ísl. Geitnaskóf.

Samaustendr af stinnu, hymnulíku blaði, sem á neðra miðbiki er fast á steinum, á röndum upphækkaðr, á efra borð sett dökkum skjöldum.

*Nytsemi og verkun:*

Mosi þessi er góður til manneidis.

31. Sviðinn Mosi (*L. deustus*). Beggjamegin nakinn, nær því heill á röndum; er tíðum þaktr svörtu mjöli, hvörsvegna hann sýnist að vera sviðinn eður sem brendr; hefir fá blöð eður er sem krúsaður.

*Nytsemi og verkun:*

Mosi þessi gefr hárauðan lit.

32. Menjumosi (*L. miniatus*) er hnúskóttur, ofantil hvítgrár, neðantil eldgulr.
33. Gærumosi (*L. velleus*) er á efra borð ösku-grár, á neðra borð svartloðinn sem skinn.

*Nytsemi og verkun:*

Mosi þessi er notaulgur til manneidis.

34. Slèttur Mosi (*L. polyphyllus*) er marg-blöðóttur, á báðar hliðar slèttur, í broddinn krúsaður, votr hefir hann dökkgrænan; en þurr dökkann lit, er hann þá meyr.

*Nytsemi og verkun:* Gefr rauðan lit.

f. Skálarmosar (*Scyphiferi*).

36. Hárauður Mosi (*L. cocciferus*). Blöðin smá, lítið þökt, flípótt, hringnöbbótt. Staungullinn bleikgrár, umsnúð - kúlumyndaður. Skálarnar útvíðkaðar, nær því heilar á röndum. Randavörturnar dökkar.

Þekkist frá næsteptirfylgjandi, við að hann hefir fagr-hárauðar, stórar, stuttleggjaðar, eður sitjandi vörtur á skálaröndinni.

*Nytsemi og verkun:*

Með mosa þessum má lita lifraudd, dökkt og grænt.

37. Hríngnöbbóttur Mosi (*L. pyxidatus*). Blöðin smá; lítið þökt; leppótt-hríngnöbbótt. Staunglarnir stuttir; umsnúið-sívalt-uppmjókkandi. Skálarnar útvíðaðar, nærri heilar á röndum. Randavörturnar dökkar. Hefir við neðri endann lítil, duptilflo, þökt, grá blöð; uppúr miðju þeirra vaxa nokkrir uppreistir staunglar, sem ofan eru skálmyndað-útvíðaðir, og stundum spretta af þeim aðrir, sjálf-þeim líkir staunglar.

*Nytsemi og verkun.*

Mosi þessi gefr gulan, grænan og dökkan lit. 38. Veigalítið Mosi (*L. gracilis*) er greinóttur, hefir lítinn ból. Bolinn nokkurnveginn slöttur, hvítleifr.

39. Fíngamosi (*L. digitatus*) er marggreinóttur, með blöðóttum staunglum. Fræbotinn hnúllóttur, purpurarauður.

40. Hornmosi (*L. cornutus*) er greinóttur, með blöðóttum staungli, boginn nær því sem horn.

g. Hríslulíkir Mosar (*Eruticulosi*).

41. Hreindýra-Mosi (*L. rangiferinus*) er brjóskilíkr. Blöðin smá; hríngnöbbótt. Staunglarnir eru pípumyndaðir, ljósgráir, þéttgreinóttir, í broddinn niðráviðbeygðir. Vörturnar kúlumyndaðar, dökkar á greina-endunum; ísl. Tröllagrös, Mókrókar.

Samanstendr af uppreistum, sífólum, marggreinóttum, ljósgráum, hvítleitum ból, hvørs ytri smágreinir eru 2skiptar, settar kúlumynduðum, dökkum vörtum.

## Nytsemi og verkun:

Mosi þessi er ágætt hreindýrafóðr, gefr góða mjólk og smjör; malaðr sem korn má brúka hann í brauð. Hann er góðr móti brjóstveiki; gefr gulan lit.

42. Greinóttir Mosi (*L. uncialis*). Staungullinn greinóttir, auggottr, með stuttum, hvössum greinum; hvítr að lit; ísl. Mókrókr.

43. Almosi (*L. subulatus*) er greinóttir, 2-skiptr með einstökum, alíflíkum greinum, er dökkgrár að lit; ísl. Mókrókr.

44. Föstu Mosi (*L. pascalis*). Staungullinn þéttþaktr mjölilikum blöðum, er þétt liggja hvört við annað að staunglinum, svo greinarnar náumast sjást.

45. Brothættir Mosi (*L. fragilis*). Staungullinn hærðr, með stvölum, snubbóttum og samsitjaði greinum. Utantil er hann settur mjölifsku hröystri.

h. Þræðilíkir Mosar (*Filamentosi*).

46. Ullarmosi (*L. lanatus*) er niðráviðliggjandi, mikið greinóttir, með samfléttuðum, svartleitum greinum, líkist svartri ullu.

47. Smá-ullaðr Mosi (*L. pubescens*). Líkist mikið þeim undangangandi, en er minni og fínari.

48. Stálþræðilíkr Mosi (*L. calybeiformis*) er niðráviðliggjandi, með samfléttuðum svörtum greinum, sem eru langar og sívalar, sem samflæktr stálþráðr væri.

49. Stríhærðr Mosi (*L. hirtus*) er uppreistr,

marggreinóttir, samfléttaðr: Hárin stráð með mjöl.

*Nytsemi og verkun:*

Mosi þessi skal vera góðr móti gulusótt, sè hálftr lóð af hönum soðið í pela af mjólk, og tekið að morgni dags.

i. Límilíkir Mosar (*Gelatinosi*).

50. Svartleitr Mosi (*L. nigrescens*) er útbreiddr, kringlóttir, dökkgrænn, hymnulíkr, með þéttum, dökkrauðum skjöldum.

*Nytsemi Mosanna ýfirhöfuð:*

Yfirhöfuð innihalda flestir Mosar ríkgligt litunar-efni, sumir meira, sumir minna. Þeir hætta litir, sem af þeim fást, eru: rauðr, af meiri og minni fegurð; gúlr, kaffebrúnn og grár. Þann rauða lit gefa einkum fylgjandi:

Litunarmosi (*Lichen tartareus*), Steinmosi (*Lichen saxatilis*), Lèttir Mosi (*Lichen omphalodes*), Blákollsmosi (*Lichen stygius*), Saffransmosi (*Lichen croceus*), Sviðinnmosi (*Lichen deustus*), Bólumosi (*Lichen pustulatus*), hárauðr Mosi (*Lichen cocciferus*), og fl.

Gulan lit gefa sèrilegi:

Málara-Mosi (*Lichen geographicus*), Ljósmosi (*Lichen candelarius*), Trèmosi (*Lichen physodes*), Veggjamosi (*Lichen parietinus*), Skeljamosi (*Lichen furfuraceus*), Íslands-mosi (Fjallagrös, *Lichen islandicus*), Þyrni-mosi (*Lichen prunastris*), og fl.

Kaffebrúnan lit gefa:

Blákollsmosi (*Lichen stygius*), Falúnborgarmosi (*Lichen satuhnensis*), Þyrnamosi

(*Lichen prunastris*), súmsnúinn Mosi (*Lichen resupinatus*), þorskamosi (*Lichen aphtosus*), Hundamosi (*Lichen caninus*), og fl.

Gráan lit gefa:

Blóðmosi (*Lichen sanguineus*), og fl.

Sá almuennasti máti og að minni meiningu sá tiltækiligasti fyrir Íslendinga; minn sá vera: að mosar þeir, er ætlaðir eru til litgjörðar, hreinsist fyrst vandliga frá öllu moski og óviðkomandi hlutum. Þareptir skulu þeir leggjast í nýtt mammaþvag, hvar þeir liggi 2 eðr 3 daga, síðan takist þeir og hroðist vandliga, þartil samhældnir verða sem annað deig og jafnir. Þareptir seu úr delgi þessu kökur gjörðar, að stærð og þykkt eptir hvörs eins yldu. Kökur þessar þurkist síðan við sólarhitu; þartil harðar verða sem brauð. Þegar nú litu skal úr mosakökum þessum, er athitigaverdt að mosalitr bezt bítr á silki og ullartægi, en miðr á lín. Það sem litast á, sè fyrst vandliga þvegið og hreinsað, þarnaest sè það í vatni soðið með álúni, og er náttuligt að taka 4 lóð til þess, eðr lítið meir til 2gja marka af því er litu skal, síðan sè það uppúr tekið og lausliga undið, og sto sundrgreidt, einkum viður og ull. Rör mjög svo á að pottir sá, sem starf þetta framfer á, sè úr tinni eðr látúni, og vel hreinu. Nú sè í öðrum potti tilbúinn liturinn þannig: maðr tekr af mosakökunum jafnvægi litunarefnisins. Mosakökurnar seu smátt muldar, síðan soðnar um hríð, með hægliga miklum legi, annaðhvort af menna þvagi, sem bezt á við rauða litinn, ellegar vatni, eðr þá nýrri mysu, sem betr á mäske við gula litinn, og nær það soðið hefir um

hrið með hægri suðu, skal það áður undirbúna litunarefni þarí látað, og skal sjá til að rámt sé vel um. Nú sé allt látið krauma um hrið, og sé á meðan jafnaðarliga íhræft, þartil litrinn tekist hefir sem maður vill, síðan sé það tekið uppúr, eigi afvatnað, en heingt uppí þerrir á sólarlausan stað.

Eigi er nú þess að dylja, að útskýring þessi er að mörgu ónæg, þarð um litunargjörð með Steinmósa Íslendfuga, mætti rita heillánga bók, enda vantar Íslendfuga flest það, er þenar til hjálparmeðala við litunargjörð þessa, og hvareptir fegurð litanna þó, að miklu leiti fer, hvará meðal og tel leir- og tin- eður látúns-katla, álún, salmiak, pottösku, vínstein, og vítríól; en þeir sem eignast geta hluti þessa svo töluvert sé, munu ogsvo efni og hentugleika hafa til að gjöra frekari tilraunir.

### 5ta Orða (*Fungi*) Sveppar.

#### 32. Bláðsveppur (*Agaricus*).

##### a. Blöðku Bláðsveppur (*A. campestris*).

Hattrinn ávalr, hreystraðr, hvítleitr, með kjötílskum hymnum; ísl. Ætisveppur.

Áðrenn hann útbreiðir sig, er hann hvít kúla á stærð við krúegg; þá hann hefir útbreidt sig, er hattr hans hálfkúlumyndaðr. Eptir að hann er fallvaxinn orðinn, missir hattrinn sínn hvíta lit, verður hann þá flatar, og blöðkurnar dökkleitar.

*Nytsemi og verkun:*

Sveppur þessi er almennur etinn í sósum eður ídrepum til sælgætis.

##### b. Mýkju Bláðsveppur (*A. fimentarius*).

Hattrinn klukkumyndaðr, gagnstær, dökkgrár.

á röndum beygðr á bak aptr. Blöðkurnar fyrst hvítar, síðan verða þær svartar. Fótrinn holr, neðan til þykkur.

- c. Klukkumyndaðr Blaðsveppr (*A. campanulatus*). Hattrinn klukkumyndaðr, rennóttur, gagnsær. Blöðkurnar dökkgráar eðr svartar. Fóturinn lángur svartur.

### 33. Pípusveppr (*Boletus*).

- a. Nautapípu-sveppr (*B. bovinus*) hefir staf. Hattrinn sléttur, röndóttur, ávalr, með ójöfnum holum, dökkgulr. Stafrinn gulr, ofantil þykkur; ísl. Kúalubbi.

Hattrinn breiðr; kjöt hans bleikrautt. Stafrinn stuttur, á neðra borð gulr, ávalr, á miðjunni rauðleitr, urtmyndað-rákóttur.

### Nytsemi og verkun:

Sumstaðar er sveppur þessi af mönnum etiinn; þá kýr eta mikið af honum, verður mjólk þeirra minni og lakari.

- b. Gulleitr Pípusveppr (*B. luteus*). Hattrinn stór, gulr, útbreiddur. Pípunar krínglóttar. Fóturinn hvítur; ísl. Reiðikúla.

### 34. Rykkíngar-Sveppr (*Helvella*).

- a. Svartur Rykkíngar-Sveppr (*H. atra*). Hattrinn 2flípóttur. Flíparnir óregluligir, svartir. Fóturinn stór, þykkur.
- þ. Grænn Rykkíngar-Sveppr (*H. aruginosa*). Hattrinn óregluliga myndaðr, fagrgrænn.

### 35. Bikarsveppr (*Peziza*).

- a. Klukkumyndaðr Bikarsveppr (*P.*



*lentifera*) er klukkumyndaðr, fullr af aslaungum, sívölum blöðrum.

Sveppr þessi er lítill, umsnúinn-klukkumyndaðr, útvortis lítið fýlðr, innvortis jafngrábráun. Á botni hans eru 4 til 8 litlir, hvítir, aflángt-sívalir, sundrlausir líkamir; finnst á haustum.

*Nytsemi og verkun: óþekkt.*

b. Hjálmmyndaðr Bikarsveppr (*P. scutellata*) er slétt, með íhvolfri; hærðri rönd.

c. Sívalr Bikarsveppr (*P. vupularis*) er klukkulíkr, nær því krínglóttur, með nöbbóttum strendum, líkist öglasi.

d. Beltis Bikarsveppr (*P. zonalis*). Hattrinn útbreiddr, hýminulíkr, síuóttur, rákóttur, með hringum.

### 36. Kyllfusveppr (*Clavaria*).

a. Gljáandi Kyllfusveppr (*C. coralloides*) er marggreinóttur, með þéttum, ólíkt sköptum greinum, er gulr, þó optar hvítur að lit.

b. Mosa Kyllfusveppr (*C. muscoides*) er marggreinóttur, með gulum, ólíkt sköptum, hvössum greinum.

### 37. Ryksveppr (*Lycoperdon*).

a. Almennur Ryksveppr (*L. bovista*) hefir rót, er kúlumyndaðr, ofanverti trosuadr, gapandi; ísl. Gorkúla, Físísveppr.

Er nokkuð stór, dökkur, hefir stuttan staf, neðantil rykktr, áður hann fullþróskastr er hann kúlumyndaðr, hvítur, neðan grænn. Eptir að fullvaxinn er, verður hann hálfkúlumyndaðr, og er fullr af fínu, dökkleitu duppi.

*Nytsemi og verkun:*

Sveppr þessi takist í október mánuði, látist á heitan og þurran stað, hvar hann vel þorni, síðan sè hann útá jörð lagðr, og fótum troðinn, að það yfirgnæfanliga ryk, sem í honum er, útrýmist. Við verk þetta loki maðr vandliga augunum, að ekkert af rykinu néi í þau að komast, sem mjög er skaðligt. Þareptir sèu þeir eptir stærð sinni skornir sundr í 2 eðr 3 parta; þannig tilbúinn er Físisveppr eitt hið kröptugasta blóðstillandi meðal, sè stykki af honum þrykkt á blæðandi æðar.

38. Skjálfandi (*Tremella*).

- a. Vörtumyndaðr Skjálfandi (*T. verrucosa*) er með vörtum, ójafn, dökkgrænn, uppblásinn.
- b. Hálfkrínglóttr Skjálfandi (*T. hemisphærica*) er sem hálfkríngla.
- c. Nostok Skjálfandi (*T. nostoch*) er græuleitr, leppóttr og bugðóttr; ísl. Skýa-fall.

39. Mygla (*Mucor*).

- a. Almenn Mygla (*M. mucedo*). Leggriinn óskiptr, með gráleitri blöðru, eðr kúlu á endanum, sem opnar sig neðantil.
- b. Hunángsmygla (*M. erysiphe*) er hvít með dökkleitur, sitjandi dröfnum eðr blöðrum.

## I. REGISTR

yfir urtanna íslenzku nöfn.

	<i>Blaða.</i>		<i>Blaða.</i>
<b>A</b> chillisurt . . . . .	262	Blasmosi . . . . .	327
Aðalbláber . . . . .	173	Blóðarfi . . . . .	176
Aðalbláberjalýng . . . . .	173	Blóðberg . . . . .	226
Alblað . . . . .	234	Blóðdrekkur . . . . .	119
Andrómeðus-urt . . . . .	184	Blóðrót . . . . .	216
Arfablað, Arfi . . . . .	152	Blóðsóley . . . . .	140, 215
Augnafró . . . . .	230	Blóðrújur . . . . .	194
Augnafræ . . . . .	202	Bólupáng . . . . .	329
Augnagrass . . . . .	231	Brandbikar . . . . .	262
<b>B</b> aldrsbrá . . . . .	263	Brekkustjarna . . . . .	261
Barnamosi . . . . .	315	Bremmuntla . . . . .	287
Bartrammosi . . . . .	324	Brennisóley . . . . .	219
Baunagrass . . . . .	248	Brjóstagrass . . . . .	219
Beinbrjótr . . . . .	157	Brunnamosi . . . . .	315
Beinvör . . . . .	293	Brúsahefuf . . . . .	273
Beitilýng . . . . .	175	Brönugrös eða Braunu- grös . . . . .	265, 268
Belgjaþáng . . . . .	329	Burkni . . . . .	310
Beltisþarri . . . . .	331	Burn . . . . .	310
Berja-arfi . . . . .	197	Búxviður . . . . .	315
Berjamosi . . . . .	323	<b>D</b> igragrass . . . . .	142
Bjarnarbroðr . . . . .	166	Dúnull . . . . .	337
Bífukolla . . . . .	254	Dvergassóley . . . . .	221
Bikarsveppr . . . . .	350	<b>E</b> inir — Einirber . . . . .	297
Birki, Björk . . . . .	284	Engjarós . . . . .	215
Bláber . . . . .	173	Elskugrass . . . . .	265
Bláðsveppr . . . . .	349	Elting . . . . .	304
Bláklukka . . . . .	137		
Blákolla . . . . .	228		

	<i>Blaðs.</i>		<i>Blaðs.</i>
Endahnappr . . . . .	318	Gambrmosi . . . . .	320
Entiana . . . . .	140	Garðasól . . . . .	150
Ertr . . . . .	248	Geitla . . . . .	147
Eskigras . . . . .	306	Geitnanjóli . . . . .	150
Eylifðarblóm . . . . .	259	Geitnaskóf . . . . .	343
Eyrarós . . . . .	170	Geldingahnappr . . . . .	153
<b>F</b> agrblóm . . . . .	168	Gleimdu mér ei . . . . .	133
Fagrkolla . . . . .	256	Góibitill . . . . .	306
Fardagakál . . . . .	164	Gorkúla . . . . .	351
Faxgras . . . . .	95	Græbrót . . . . .	265
Fergin . . . . .	327	Grájurt . . . . .	260
Fjallafífill . . . . .	214	Gráviðir . . . . .	290
Fjallagrös . . . . .	340	Grasviðir . . . . .	291
Fjallasmári . . . . .	135	Greiðurót . . . . .	296
Fjalldrapi . . . . .	286	Grimmjamosi . . . . .	324
Fjalldæla . . . . .	214	Grómbitill . . . . .	304
Fjandafæla . . . . .	259	Græðisúra . . . . .	122
Fífa . . . . .	93	Gullax . . . . .	84
Fífill . . . . .	255	Gullintoppa . . . . .	154
Finnúngt . . . . .	93	Gulltoppr . . . . .	196
Fióla . . . . .	139	Gulmáðra . . . . .	120
Fiskiæti . . . . .	314	Gvöndarber . . . . .	304
Fisissveppr . . . . .	351	Gæsablóm . . . . .	235
Fjögralaufajurt . . . . .	180	Gæsamatr . . . . .	242
Fjögralatufasmári . . . . .	180	Götubrá . . . . .	122
Fjöruarfi . . . . .	197	<b>H</b> anðakambr . . . . .	230
Fjörufax . . . . .	334	Hanasarpr . . . . .	227
Flatbelgr . . . . .	247	Hanatoppr . . . . .	229
Flóarurt . . . . .	179	Hálmr . . . . .	78
Flækja . . . . .	248	Harðásægjur . . . . .	196
Frúrberjakrækla . . . . .	210	Hármey . . . . .	215
Fryggjargras . . . . .	265	Hármunni . . . . .	315
Fréstjarna . . . . .	218	Hegri . . . . .	111
Fuglatúngur . . . . .	122	Heimilisnjóli . . . . .	164

	<i>Blaðs.</i>		<i>Blaðs.</i>
Heimula . . . . .	164	Jafni . . . . .	307
Hellinlagra . . . . .	226	Jakobsfíll . . . . .	261
Helluhnoðri . . . . .	199	Jarðarber . . . . .	211
Helluhnoðrarót . . . . .	296	Jarðhumall . . . . .	262
Hestali . . . . .	77	Íglagras . . . . .	157
Hestaurt . . . . .	115	Jómfrúarhár . . . . .	317
Hjartagras . . . . .	195	Jónsmessugras . . . . .	83
Hjartarfi . . . . .	237	Júfursmein . . . . .	219
Hjónagras . . . . .	265	Júngermann-mosi . . . . .	324
Hlaupblaðka . . . . .	239	<b>K</b> attarauga . . . . .	133
Hleypisgras . . . . .	83	Kattarbalsam . . . . .	239
Hlíðarhnappur . . . . .	320	Kattartúnga . . . . .	123
Höfblaðka . . . . .	223	Kellingartönn . . . . .	249
Höfgresi . . . . .	223	Kisugras . . . . .	135
Holtarót . . . . .	196	Klettafrú . . . . .	187
Holtasóley . . . . .	215	Klöpáng . . . . .	329
Holurt . . . . .	196	Klukka . . . . .	137
Horblaðka . . . . .	136	Kornelviðr . . . . .	125
Hornberi . . . . .	265	Kornsúra . . . . .	177
Hornmosi . . . . .	326	Kotúngslauf . . . . .	290
Hornurt . . . . .	287	Kotúngsviðir . . . . .	291
Hrafnaklukka . . . . .	239, 242	Krákufótr . . . . .	215
Hreindýramosi . . . . .	345	Kransblað . . . . .	272
Hrossaþaungull . . . . .	330	Krínglúbelgr . . . . .	250
Hrúðrurt . . . . .	118	Krókagras . . . . .	248
Hrútaber . . . . .	210	Krónumosi . . . . .	324
Húsapútr . . . . .	114	Krossgrass . . . . .	219
Hveiti . . . . .	114	Krækiber . . . . .	295
Hvingras . . . . .	97	Krækilýng . . . . .	295
Hvönn . . . . .	146	Krækla . . . . .	210
Höfuðrót . . . . .	296	Kúablóm . . . . .	223
Höggormshöfn . . . . .	135	Kúalubbi . . . . .	350
Höggormstúnga . . . . .	307	Kúmen . . . . .	148
Hör . . . . .	154	Kúreki . . . . .	135
<b>J</b> afuabróðir . . . . .	307	Kveisugras . . . . .	136, 140, 202

	<i>Blaðs.</i>		<i>Blaðs.</i>
Kverkagras . . . . .	125, 219	Melgras . . . . .	113
Kylfusveppr . . . . .	351	Mjaðarurt . . . . .	209
Kæsirsgras . . . . .	63	Miljugras . . . . .	96
Königsurt . . . . .	116	Mjólkrurt . . . . .	246
<b>L</b> ambablóm . . . . .	188	Mjölber . . . . .	184
Lambagras . . . . .	196	Mjölurt . . . . .	150
Lambaklukka . . . . .	239	Mókrókr . . . . .	345
Lappavör . . . . .	269	Mentia . . . . .	116
Lifjagras . . . . .	83	Mosi . . . . .	337
Lifrarurt . . . . .	153	Múkahetta . . . . .	202
Ljósberi . . . . .	201	Múkakróna . . . . .	263
Ljónsfótr . . . . .	125	Mulníngr . . . . .	184
Ljónskló . . . . .	125	Mura . . . . .	212
Ljónslappi . . . . .	125	Murukjarni . . . . .	330
Ljónstönn . . . . .	254	Murusóley . . . . .	212
Litunargras . . . . .	244	Músareyra . . . . .	203
Litunarmosi . . . . .	339	Mygla . . . . .	352
Lokasjótr . . . . .	230	Mýrasóley . . . . .	153
Lokasjóðsbróðir . . . . .	229	Mýratág . . . . .	215
Lónasóley . . . . .	223	<b>N</b> ablágras . . . . .	116
Lúngajurt . . . . .	134	Negulrót . . . . .	214
Lúsalýng . . . . .	295	Netla . . . . .	286
Lýng . . . . .	175	Notrugras . . . . .	287
Lækjasóley . . . . .	223	<b>O</b> ddvari . . . . .	176
<b>M</b> aðra . . . . .	120	Ólafssúra . . . . .	181
Marchantsmosi . . . . .	326	Opinblaðka . . . . .	241
Marghyrna . . . . .	176	Osmund . . . . .	306
Marhálmr . . . . .	77	<b>P</b> eningagras . . . . .	230
Mariukjarni . . . . .	330	Pétrssóley . . . . .	215
Mariulumma . . . . .	124	Pétrsurt . . . . .	255
Mariustakkr . . . . .	124	Pipusveppr . . . . .	350
Mariuvöndr . . . . .	140, 170	Púkabit . . . . .	118
Meistarajurt . . . . .	149	Púngagras . . . . .	195
Melasól . . . . .	218		

	<i>Bláðs.</i>		<i>Bláðs.</i>
Púngarfi . . . . .	237	Selgresi . . . . .	123
Púngvör . . . . .	267	Sibbaldsurt . . . . .	155
Púngurt . . . . .	236	Sikisull . . . . .	92
Punthali . . . . .	101	Skarfakál . . . . .	238
Puntr . . . . .	95	Skarnurt . . . . .	232
Purpurablómstr . . . . .	170	Skeiðarurt . . . . .	237
<b>R</b> akmosi . . . . .	324	Skiafall . . . . .	352
Rauðbrestingr . . . . .	278	Skjálfandi . . . . .	352
Rauðmosi . . . . .	314	Skollafingr . . . . .	308
Refshali . . . . .	96	Skollaþótr . . . . .	304
Reiðikúla . . . . .	350	Skollakál . . . . .	150
Reiðingagras . . . . .	136	Skollareipi . . . . .	210
Reir . . . . .	112	Skreppa . . . . .	164
Reirgras . . . . .	84	Skúfgras . . . . .	90
Reirgresi . . . . .	115	Skuggahvapp . . . . .	316
Reynir . . . . .	208	Skurfa . . . . .	205
Rhabarber . . . . .	181	Skæni . . . . .	89
Rifhrís . . . . .	284	Smáblóm . . . . .	314
Rikkjámosi . . . . .	327	Smári . . . . .	250
Rjúpnalauf . . . . .	215	Smeðjukál . . . . .	197
Rjúpnalýng . . . . .	215	Smjörblómstr . . . . .	219
Rósajurt . . . . .	296	Smjörgras . . . . .	261
Rottuhali . . . . .	95	Snjóblómstr . . . . .	188
Rykkingasveppr . . . . .	350	Snókahvönn . . . . .	147
Ryksveppr . . . . .	351	Sóldögg . . . . .	155
<b>S</b> agina . . . . .	129	Sólsekvía . . . . .	214
Samfléttingr . . . . .	248	Sortulýng . . . . .	184
Sandjurt . . . . .	197	Spekingsurt . . . . .	145
Sandlaukr . . . . .	167	Steina-urt . . . . .	199
Sandlætingr . . . . .	138	Steinbrjótr . . . . .	187
Sauðamergr . . . . .	137	Stjörnujurt . . . . .	196
Sef . . . . .	158	Stjörntumosi . . . . .	323
Selja . . . . .	292	Stórablágresi . . . . .	243
		Storkablágresi . . . . .	244
		Storkanef . . . . .	243

	<i>Blæðs.</i>		<i>Blæðs.</i>
Strandarfi . . . . .	134	Vatnsarfi . . . . .	79
Strandbúi . . . . .	239	Vatnsax . . . . .	126
Stúfa . . . . .	99	Vatnshymna . . . . .	327
Stör . . . . .	274	Vatnsnabli . . . . .	145
Sultarepli . . . . .	304	Vatnssilki . . . . .	336
Þúruskreppa . . . . .	165	Vatnsskjarna . . . . .	273
Svefnurt . . . . .	218	Vélantsurt . . . . .	88
Þveifgras . . . . .	104	Vélindisurt . . . . .	219
Sveppar . . . . .	349	Vetrarblóm . . . . .	188
Þýkisgras . . . . .	157, 166	Vetrarlaukr . . . . .	185
Sæhvönn . . . . .	149	Vetrarlilja . . . . .	185
Þældingr . . . . .	167	Vitir . . . . .	290
Þætutág . . . . .	304	Vinagras . . . . .	265
Söl . . . . .	332	Vingull . . . . .	108
Sölvamæðr . . . . .	332	Vorblómi . . . . .	158
<b>T</b> ág . . . . .	291	<b>Þ</b> arabelti . . . . .	331
Tillje . . . . .	129	Þarri . . . . .	328
Tjarnastör . . . . .	280	Þaungull . . . . .	330
Tirsfióla . . . . .	139	Þistill . . . . .	258
Tóugrás . . . . .	95, 310	Þrenningargras . . . . .	140
Tröllagrös . . . . .	345	Þriðlað . . . . .	136
Tröllajurt . . . . .	231	Þunnaþáng . . . . .	329
Túnglurt . . . . .	306	Þussaskegg . . . . .	335
Tvitönn . . . . .	226	Þúsundblað . . . . .	288
Tymian . . . . .	225	Þykkvaþáng . . . . .	329
Töðufinnúgr . . . . .	94	<b>Æ</b> rupris . . . . .	79
<b>Ú</b> lfafótur . . . . .	307	Ætifiðill . . . . .	254
Umfeðmingsgras . . . . .	248	Ætihvönn . . . . .	146
Undafíðill . . . . .	257	Ætisveppr . . . . .	349
<b>V</b> allarsúra . . . . .	165	Ætiþáng . . . . .	329
Vallhumall . . . . .	262	<b>Ö</b> ðuskeljaþáng . . . . .	334
Vargslappi . . . . .	308	Öskugras . . . . .	230



## 2. REGISTR

yfir þau latínsku nöfn kynferðanna.

	Blaðs.		Blaðs.
<i>Achillæa</i> . . . . .	262	<i>Byssus</i> . . . . .	337
<i>Agaricus</i> . . . . .	349	<i>Cakile</i> . . . . .	239
<i>Agrostis</i> . . . . .	97	<i>Callitriche</i> . . . . .	273
<i>Aira</i> . . . . .	101	<i>Caltha</i> . . . . .	223
<i>Alchemilla</i> . . . . .	124	<i>Campanula</i> . . . . .	137
<i>Aleopecurus</i> . . . . .	96	<i>Cardamine</i> . . . . .	239
<i>Alsine</i> . . . . .	152	<i>Carduus</i> . . . . .	258
<i>Andromeda</i> . . . . .	184	<i>Carex</i> . . . . .	274
<i>Angelica</i> . . . . .	146	<i>Carum</i> . . . . .	148
<i>Anthericum</i> . . . . .	157	<i>Cerastium</i> . . . . .	203
<i>Anthyllis</i> . . . . .	250	<i>Ceratophyllum</i> . . . . .	287
<i>Anthoceros</i> . . . . .	326	<i>Chara</i> . . . . .	272
<i>Anthorantum</i> . . . . .	84	<i>Clavaria</i> . . . . .	351
<i>Apargia</i> . . . . .	255	<i>Cochlearia</i> . . . . .	237
<i>Arabis</i> . . . . .	242	<i>Comarum</i> . . . . .	215
<i>Arbutus</i> . . . . .	184	<i>Conserua</i> . . . . .	336
<i>Arenaria</i> . . . . .	197	<i>Convallaria</i> . . . . .	158
<i>Arundo</i> . . . . .	112	<i>Cornus</i> . . . . .	125
<i>Asplenium</i> . . . . .	314	<i>Cucubalus</i> . . . . .	194
<i>Atriplex</i> . . . . .	150	<i>Draba</i> . . . . .	235
<i>Azalea</i> . . . . .	137	<i>Drosera</i> . . . . .	155
<i>Bartramia</i> . . . . .	324	<i>Dryas</i> . . . . .	215
<i>Bartsia</i> . . . . .	229	<i>Echium</i> . . . . .	135
<i>Betula</i> . . . . .	284	<i>Elymus</i> . . . . .	113
<i>Blasia</i> . . . . .	327	<i>Empetrum</i> . . . . .	295
<i>Bolitus</i> . . . . .	350	<i>Epilobium</i> . . . . .	170
<i>Bromus</i> . . . . .	111	<i>Equisetum</i> . . . . .	304
<i>Bryum</i> . . . . .	318		
<i>Buxbaumia</i> . . . . .	315		

	Blatts.		Blatts.
<i>Erica</i> . . . . .	175	<i>Lamium</i> . . . . .	226
<i>Erigeron</i> . . . . .	261	<i>Lathyrus</i> . . . . .	247
<i>Eriophorum</i> . . . . .	92	<i>Leontodon</i> . . . . .	254
<i>Euphrasia</i> . . . . .	230	<i>Lichen</i> . . . . .	337
<i>Festuca</i> . . . . .	108	<i>Ligusticum</i> . . . . .	145
<i>Fontinalis</i> . . . . .	315	<i>Limosella</i> . . . . .	232
<i>Fragaria</i> . . . . .	211	<i>Linum</i> . . . . .	154
<i>Fucus</i> . . . . .	328	<i>Lotus</i> . . . . .	249
<i>Fungi</i> . . . . .	349	<i>Lychnis</i> . . . . .	201
<i>Galeopsis</i> . . . . .	227	<i>Lycoperdon</i> . . . . .	351
<i>Galium</i> . . . . .	120	<i>Lycopodium</i> . . . . .	307
<i>Geum</i> . . . . .	214	<i>Marchantia</i> . . . . .	326
<i>Gentiana</i> . . . . .	140	<i>Menyanthes</i> . . . . .	136
<i>Geranium</i> . . . . .	243	<i>Milium</i> . . . . .	96
<i>Glaux</i> . . . . .	138	<i>Maïum</i> . . . . .	323
<i>Gnaphalium</i> . . . . .	259	<i>Montia</i> . . . . .	116
<i>Grimmia</i> . . . . .	324	<i>Mucor</i> . . . . .	352
<i>Gymnostomum</i> . . . . .	323	<i>Myosotis</i> . . . . .	133
<i>Helvella</i> . . . . .	350	<i>Myriophyllum</i> . . . . .	288
<i>Hieracium</i> . . . . .	256	<i>Nardus</i> . . . . .	93
<i>Hippuris</i> . . . . .	77	<i>Narthetium</i> . . . . .	166
<i>Holcus</i> . . . . .	115	<i>Ophioglossum</i> . . . . .	307
<i>Hydrocotyle</i> . . . . .	145	<i>Ophrys</i> . . . . .	269
<i>Hypnum</i> . . . . .	320	<i>Orchis</i> . . . . .	265
<i>Imperatoria</i> . . . . .	149	<i>Orthotrichum</i> . . . . .	324
<i>Isætis</i> . . . . .	314	<i>Osmunda</i> . . . . .	306
<i>Juncus</i> . . . . .	158	<i>Papaver</i> . . . . .	218
<i>Jungermannia</i> . . . . .	324	<i>Paris</i> . . . . .	180
<i>Juniperus</i> . . . . .	297	<i>Parnassia</i> . . . . .	153
<i>Kænegia</i> . . . . .	116	<i>Pedicularis</i> . . . . .	231
		<i>Peziza</i> . . . . .	350
		<i>Phascum</i> . . . . .	315
		<i>Phleum</i> . . . . .	95

	Blaßs.		Blaßs.
<i>Pinguicula</i> . . . . .	83	<i>Silene</i> . . . . .	196
<i>Pisum</i> . . . . .	248	<i>Sisymbrium</i> . . . . .	241
<i>Plantago</i> . . . . .	122	<i>Sorbus</i> . . . . .	208
<i>Poa</i> . . . . .	104	<i>Sparganium</i> . . . . .	273
<i>Poligonum</i> . . . . .	176	<i>Spergula</i> . . . . .	205
<i>Politrichum</i> . . . . .	317	<i>Sphagnum</i> . . . . .	314
<i>Polygala</i> . . . . .	246	<i>Spiraea</i> . . . . .	209
<i>Polypodium</i> . . . . .	310	<i>Splachnum</i> . . . . .	316
<i>Potamogeton</i> . . . . .	126	<i>Statice</i> . . . . .	153
<i>Potentilla</i> . . . . .	212	<i>Stellaria</i> . . . . .	196
<i>Primula</i> . . . . .	135	<i>Subularia</i> . . . . .	234
<i>Prunella</i> . . . . .	228	<i>Talichtrum</i> . . . . .	218
<i>Pulmonaria</i> . . . . .	134	<i>Tetraphis</i> . . . . .	324
<i>Pyrethrum</i> . . . . .	263	<i>Thlapsi</i> . . . . .	236
<i>Pyrola</i> . . . . .	185	<i>Thymus</i> . . . . .	225
<i>Ranunculus</i> . . . . .	219	<i>Tilia</i> . . . . .	129
<i>Rheum</i> . . . . .	181	<i>Tormentilla</i> . . . . .	216
<i>Rhodiola</i> . . . . .	296	<i>Tremella</i> . . . . .	352
<i>Rhynanthus</i> . . . . .	230	<i>Tridentalis</i> . . . . .	168
<i>Riccia</i> . . . . .	327	<i>Trifolium</i> . . . . .	250
<i>Rubus</i> . . . . .	210	<i>Triglochin</i> . . . . .	167
<i>Rumex</i> . . . . .	164	<i>Triticum</i> . . . . .	114
<i>Sagina</i> . . . . .	129	<i>Ulua</i> . . . . .	327
<i>Salix</i> . . . . .	290	<i>Urtica</i> . . . . .	286
<i>Sanguisorba</i> . . . . .	119	<i>Vaccinium</i> . . . . .	173
<i>Satyrion</i> . . . . .	267	<i>Valeriana</i> . . . . .	88
<i>Saxifraga</i> . . . . .	187	<i>Veronica</i> . . . . .	79
<i>Scabiosa</i> . . . . .	118	<i>Vicia</i> . . . . .	248
<i>Scirpus</i> . . . . .	90	<i>Viola</i> . . . . .	139
<i>Schænus</i> . . . . .	89	<i>Zostera</i> . . . . .	78
<i>Sedum</i> . . . . .	199	<i>Ægopodium</i> . . . . .	150
<i>Senecio</i> . . . . .	262		
<i>Sibbaldia</i> . . . . .	155		

### 3. REGISTR

yfir íslensku kunstorðin.

	Blaðs.	Axið	Blaðs.
<b>A</b> breiða . . . . .	39	er; rétt . . . . .	22
Auga . . . . .	38	samansett . . . . .	21
Aukapartar . . . . .	36	sívalt . . . . .	22
Ávaxtarbotn . . . . .	59	tvi- til sex-sett . . . . .	22
er: almennr . . . . .	59	<b>A</b> xlablöss . . . . .	36
ávalr . . . . .	59	eru: affallandi . . . . .	36
einfaldr . . . . .	59	brunablettótt . . . . .	37
flatr . . . . .	59	burtfallandi . . . . .	36
hærðr . . . . .	59	eir . . . . .	36
kjötilíkr . . . . .	59	mótstæð . . . . .	36
smáholótt . . . . .	59	tvenn . . . . .	36
smáhreystraðr . . . . .	59	undir blaðinu . . . . .	36
styttumyndaðr . . . . .	59	yfir blaðinu . . . . .	36
sveppilíkr . . . . .	59	ævarandi . . . . .	37
toppmýndaðr . . . . .	59		
ullusettr . . . . .	59	<b>B</b> aunablómstr . . . . .	48
Ávaxtarflet . . . . .	59	<b>B</b> elgr . . . . .	42
Ávaxtarhús . . . . .	51	er: einblaðkaðr . . . . .	43
Ávöxtur . . . . .	52	hópsettr . . . . .	43
er: ber . . . . .	52	tvíblaðkaðr . . . . .	43
innilokaðr . . . . .	52	þríblaðkaðr . . . . .	43
<b>A</b> xið . . . . .	21	<b>B</b> eli . . . . .	55
er: blöðótt . . . . .	22	er: bogalíkr . . . . .	56
búkmikið . . . . .	21	eiarúmaðr . . . . .	56
eggilíkt . . . . .	22	hálftrírúmaðr . . . . .	56
einfaldr . . . . .	21	hnúskótt . . . . .	56
einnarsíðu . . . . .	21	kufúngsmýndaðr . . . . .	56
flatt . . . . .	22	líðótt . . . . .	56
hnykilmyndað . . . . .	21	sigðmyndaðr . . . . .	55
kransilíkt . . . . .	22	upphálsian . . . . .	55
millumbilað . . . . .	22	<b>B</b> er . . . . .	54

	<i>Blaðs.</i>	<i>Blað:</i>	<i>Blaðs.</i>
Ber með einu, tveimr		a) einfaldr:	25
eðr mörgum fræ-		aðvaxið . . . .	32
kornum . . . .	54	aðþrykkt . . . .	32
sainansett . . . .	54	aflángt . . . .	26
Bíkar . . . .	41	afbitið . . . .	25
er: affallandi . . . .	41	afkubbað . . . .	25
aptrlokaðr . . . .	41	alilíkt . . . .	27
brjósakilíkr . . . .	42	ávallt . . . .	32
húrtfallandi . . . .	41	ávaxið — sitjandi .	31
einfaldr . . . .	41	bláð hjá blómstri .	30
flatkragaðr . . . .	42	brjóskrandað . . .	28
fyrir neðan sitjandi	42	bugðótt . . . .	28
fyrir ofan sitjandi	42	búngótt . . . .	33
gapandi . . . .	41	býlgjótt . . . .	28
heill á röndum . . .	41	eggmyndað . . . .	26
klofinn . . . .	41	einsett . . . .	31
kórónaðr . . . .	42	eyrt . . . .	26
litaðr . . . .	42	fjærstandandi . . .	31
nálberandi . . . .	42	flatt . . . .	29
óskiptr . . . .	41	fleigmyndað . . . .	26
pipumyndaðr . . . .	41	flipað . . . .	27
sívalr . . . .	42	fræblað . . . .	30
skiptr . . . .	41	gegnumborað . . . .	32
streindr . . . .	42	glansandi . . . .	30
styttr . . . .	42	greinablað . . . .	30
tilbakabeygðr . . . .	42	hálfuggað . . . .	28
trektmyndaðr . . . .	42	hárlíkt . . . .	27
tvívaraðr . . . .	41	heflilíkt . . . .	28
tvöfaldr . . . .	42	heilrandað . . . .	28
uppblásinn . . . .	42	hendilíkt . . . .	27
útflattr . . . .	42	hjártalíkt . . . .	25
visnandi . . . .	42	holótt . . . .	32
Bindini . . . .	23	hríngbugðað . . . .	29
Bindþráðr . . . .	37	hríngnóbbótt . . .	28
Bláð . . . .	25	hrukkað . . . .	29

Blað:	Blaðs.	Blað:	Blaðs.
hvasst . . . . .	25	óskipt . . . . .	28
hvelft . . . . .	30	pipótt . . . . .	33
hymnulíkt . . . . .	30	randhært . . . . .	29
hörpumyndað . . . . .	28	rekumyndað . . . . .	26
jafntliggjandi . . . . .	32	rennótt . . . . .	29
íbjúgt . . . . .	29	rótblað . . . . .	30
í bindinum . . . . .	31	rótumskjótandi . . . . .	32
innbeygt . . . . .	32	rykkt . . . . .	30
innþrykkt . . . . .	25	sagtennt . . . . .	29
kjöttligt . . . . .	32	samanvaxið . . . . .	32
kranslíkt . . . . .	31	samanþrykkt . . . . .	32
kringlótt . . . . .	26	sinótt . . . . .	30
krúsað . . . . .	29	sitjandi . . . . .	31
lángleitt . . . . .	26	skáhallt . . . . .	32
leggjað . . . . .	31	skakkferhyrnt . . . . .	27
lensulíkt . . . . .	26	skeytilíkt . . . . .	25
leppótt . . . . .	28	skipt . . . . .	27
liðótt . . . . .	33	skjöldmyndað . . . . .	31
litast . . . . .	30	sljóft . . . . .	25
missett . . . . .	31	slíðrandi . . . . .	32
mótstætt . . . . .	31	smámjókkandi . . . . .	27
múraraspaðalíkt . . . . .	27	smátennt . . . . .	29
myrkleitt . . . . .	30	smásagartennt . . . . .	29
nagað . . . . .	29	spjótílikt . . . . .	26
nálmyndað . . . . .	27	sporalíkt . . . . .	26
niðráviðsveigt . . . . .	32	staungulblað . . . . .	30
niðrhángandi . . . . .	32	stingandi . . . . .	25
niðrhlaupandi . . . . .	31	strát . . . . .	31
niðrsokkið . . . . .	32	strikmyndað . . . . .	27
nýrumlíkt . . . . .	25	stúngið . . . . .	30
nær því kringlótt . . . . .	26	styrnt . . . . .	31
oddskorið . . . . .	25	sveimandi . . . . .	32
ofanáviðundið . . . . .	32	sverbílikt . . . . .	27
ójafnt . . . . .	25	tennt . . . . .	28
opið . . . . .	32	tvíeggjað . . . . .	32

Blað:	Blaðs.	Blað:	Blaðs.
tvíflípað . . . .	27	d. meir enn 2faldt sam-	
tvíþipótt . . . .	33	ansett . . . .	34
tví-, 3-, 4-, 5-sett	31	eggmyndað lensulíkt	35
tvítennt . . . .	29	næstum eggmyndað	35
túngumyndað . .	33	umsnúð-hjartmynd-	
umfaðmandi . . .	31	að . . . .	35
upprétt . . . .	32	þrisvar þrifest . .	34
úthvesst . . . .	25	þriuggað . . . .	34
þakið . . . .	31	Blaðfjör . . . .	57
þéttstandandi . .	31	Blaðstaungull . . .	13
þristrendt . . . .	27	Blaðra . . . .	37
þrisinótt . . . .	30	Blaðskúfr . . . .	37
þrjú, 4, 5 o. s. frv.		Blómstr . . . .	39
saman . . . .	31	bikarlaust . . . .	40
þritennt . . . .	25	blaðlaust . . . .	40
þyrnumvaxið . .	29	einsett, einfaldt .	40
æðamargt . . . .	30	geislablómstrandi .	40
æða- og sinalaust .	30	hannblómstr . . .	40
ð. einfaldt samansett	33	húnblómstr . . .	40
á víxl uggað . . .	34	hópsett . . . .	40
fimmsett . . . .	33	nakið . . . .	40
fingrað . . . .	33	samansett . . . .	40
kambuggað . . . .	34	skerhorðsblómstrandi	40
mínkandi uggað .	34	túngublómstrandi .	40
misjafnt uggað . .	33	tvíkynjað . . . .	40
mótsett uggað . .	34	Blómstrblettir . . .	24
paruggað . . . .	33	Blómstrblöð . . . .	37
uggað . . . .	33	Blómstrunarform . .	21
uggað með millibil-		Blómstrhöfuð . . .	23
um . . . .	34	Blómstrstaungull . .	20
þrifest . . . .	33	Blómstrskýla . . . .	40
e. tvöfaldt samansett	34	Blöskur . . . .	43
tvísva þrifest . .	34	Bolr . . . .	13
tvíuggað . . . .	34	Botél . . . .	56
		Broddr . . . .	38

	<i>Blaðs.</i>	<i>Fræ:</i>	<i>Blaðs.</i>
Brum . . . . .	35	svarfílikt . . . . .	57
duptílikt . . . . .	36	þykkhymnað . . . . .	58
hlaupílikt . . . . .	36	Fræbelgr . . . . .	52
hrúðrílikt . . . . .	36	Fræblöð . . . . .	57
naflasett . . . . .	36	Fræhúð . . . . .	57
skinnílikt . . . . .	36	Fræhús . . . . .	52
Bugr . . . . .	35	berjumlikt . . . . .	53
Bursti . . . . .	44	broddopnað . . . . .	53
<b>D</b> upt . . . . .	51	ein-, 2-, 3-, marg-	
Duptberi . . . . .	50	rúmað . . . . .	53
Duptþráðr . . . . .	50	fjöðurkraptað . . . . .	53
fleigimyndaðr . . . . .	50	tvi-, 3-, margblaðkað . . . . .	53
fri . . . . .	50	tvi-, 3-, margfræsett . . . . .	53
hárumvaxinn . . . . .	50	tvöfaldr . . . . .	53
hárumlíkr . . . . .	50	yfir þvert skoríð . . . . .	53
jafnlánger . . . . .	50	þrikornótt . . . . .	53
klofinn . . . . .	50	Fræhymna . . . . .	57
liðóttir . . . . .	50	Frærani . . . . .	59
misjafn . . . . .	50	Fræskýla . . . . .	58
samanbeygðr . . . . .	50	Fræ-ull . . . . .	59
samanvaxinn . . . . .	50	<b>G</b> aukablómr . . . . .	48
sporjárnílikr . . . . .	50	Gómr . . . . .	47
út- og inn-beygðr . . . . .	50	Grasker . . . . .	54
þræðilíkr . . . . .	50	Greinar . . . . .	19
Dögg . . . . .	59	ármerktar . . . . .	20
<b>E</b> pli . . . . .	54	dreifðar . . . . .	19
<b>F</b> lat skjöldur . . . . .	60	eins háar . . . . .	19
Flipi . . . . .	35	fjærstandandi . . . . .	19
Fræ . . . . .	57	kranslíkar . . . . .	19
holsiðað . . . . .	57	missettar . . . . .	19
krónað . . . . .	58	móttæðar . . . . .	19
kúfúngsmyndað . . . . .	58	niðrbeygðar . . . . .	19
styttumyndað . . . . .	57	niðrhángandi . . . . .	20
		opnar . . . . .	19



Greinar :	Blaðs.		Blaðs.
samanhnæpptar . . . . .	20	Hunángshreystr . . . . .	49
tvisettar . . . . .	19	Hunángshyrzla . . . . .	49
þéttstandandi . . . . .	19	Hunángshyrzluvör . . . . .	49
þyrnumlikar . . . . .	19	Hunángskyrtilar . . . . .	49
uppréttar . . . . .	20	Hymnuávöxtur . . . . .	52
útspanaðar . . . . .	19	<b>K</b> allblómstr . . . . .	51
Gröf . . . . .	49	Kjarni . . . . .	54
Gyn . . . . .	46	Kjölur . . . . .	48
aptrylokað . . . . .	46	Klasi . . . . .	22
krónað . . . . .	46	einnar síðu . . . . .	22
opið . . . . .	46	Kragi . . . . .	46
skeggjað . . . . .	46	Krans . . . . .	23
Gynkraus . . . . .	46	hálfir . . . . .	24
<b>H</b> álfskýla . . . . .	22	blómstrblöðnum bá-	
Hali . . . . .	59	inn . . . . .	24
Hár . . . . .	39	nakinn . . . . .	24
bindinumlik . . . . .	39	Króna . . . . .	45
klofin . . . . .	39	a. einblöðuð jöfn . . . . .	46
krókmynduð . . . . .	39	ábakbrotin . . . . .	46
Hattr . . . . .	39	eggmynduð . . . . .	47
Hetta . . . . .	50	flatkrögött . . . . .	46
Hettafræ . . . . .	58	hjólmynduð . . . . .	46
Hjálur . . . . .	47	jöfn . . . . .	46
Horn . . . . .	35	klukkumynduð . . . . .	47
Hreystr . . . . .	44	kúkumynduð . . . . .	47
Hringr . . . . .	39	ójöfn . . . . .	46
Húfa . . . . .	49	óreglulig . . . . .	46
Hulstr . . . . .	45	pipamynduð . . . . .	46
hálfskýlandi . . . . .	45	trektmynduð . . . . .	46
einu blómstri sett . . . . .	45	b. einblöðuð ójöfn . . . . .	47
tveim blómstrum sett . . . . .	45	einvöruð . . . . .	47
viðvarandi . . . . .	45	gapandi . . . . .	47
visnandi . . . . .	45	grímuð . . . . .	47
Hunángsholur . . . . .	49	túngumynduð . . . . .	47

Króna: *Bláðs.*

tvívöruð . . . . .	47
c. margblöðuð jöfn . . . . .	48
kattostblöðuð . . . . .	48
krossmynduð . . . . .	48
líljublaðmynduð . . . . .	48
nellikblöðuð . . . . .	48
rósarblöðuð . . . . .	48
d. ójöfn margblöðuð . . . . .	48
Kyrthar . . . . .	38
Kögr . . . . .	24
<b>L</b> eppr . . . . .	35
Lok . . . . .	56
flatt . . . . .	56
hvasst . . . . .	56
kringlótt . . . . .	56
toppilíkt . . . . .	56
uppmjótt . . . . .	56

<b>M</b> erki . . . . .	48
Milligirðing . . . . .	53
Mosabíkar . . . . .	44
Mosastaungull . . . . .	13
Mummr . . . . .	56
<b>N</b> aflastrengir . . . . .	58
Nafli . . . . .	58
Nyt . . . . .	54
Nögl . . . . .	48

<b>O</b> ektivöxtur . . . . .	56
Óektaber . . . . .	57
Óektafræhus . . . . .	57
Óekta steinávöxtur . . . . .	57
Op . . . . .	47
<b>P</b> lata . . . . .	48

*Bláðs.*

<b>R</b> ani . . . . .	57
Reifar . . . . .	44
hálfar . . . . .	44
marghærðar . . . . .	44
minni . . . . .	44
sameiginligar . . . . .	44
Rengla . . . . .	13
Rifis . . . . .	59
Rót . . . . .	10
afbitin . . . . .	11
árlig . . . . .	12
aungótt . . . . .	11
einföld . . . . .	10
greinótt . . . . .	10
hángandi hnúskótt . . . . .	12
hárumlík . . . . .	11
hendilík . . . . .	11
hnúskótt . . . . .	11
hol . . . . .	10
holótt . . . . .	10
hreystruð . . . . .	12
kjötlig . . . . .	10
kornótt . . . . .	12
kúlulík . . . . .	11
laukilík . . . . .	12
liðótt . . . . .	11
ormlík . . . . .	11
ræthángandi . . . . .	12
róulík . . . . .	11
sitjandi hnúskótt . . . . .	12
sivöl . . . . .	11
skáhöll . . . . .	12
skrámótt . . . . .	12
skriðandi . . . . .	12
toppilík . . . . .	11

Rót:	Blaðs.		Blaðs.
trèlik . . . . .	10	Skjöldur . . . . .	60
tveggja ára . . . . .	12	Skúfr . . . . .	23
tvíhnöllótt . . . . .	11	Þrí- til fimm-settr . . . . .	23
tönnótt . . . . .	11	Skýla . . . . .	22
vatnsflöt . . . . .	12	ávöl . . . . .	23
vendilik . . . . .	11	fáleggjuð . . . . .	23
þétt . . . . .	10	flöt . . . . .	23
þræðilik . . . . .	11	geislablómstruð . . . . .	23
þveingilik . . . . .	11	jafnblómstruð . . . . .	23
ævarandi . . . . .	12	kúlulik . . . . .	23
Rótstaungull . . . . .	21	leggjuð . . . . .	23
kögurlagðr . . . . .	21	sitjandi . . . . .	23
Rúm . . . . .	53	slétt . . . . .	23
Rykking . . . . .	49	Slíðr . . . . .	37
<b>S</b> ameiginligr Bikar . . . . .		Silðrhymna . . . . .	37
brenadr . . . . .	43	Smáblað . . . . .	35
einblaðaðr . . . . .	43	Smástaungull . . . . .	20
einfaldr . . . . .	43	Spori . . . . .	49
jafn . . . . .	43	Stafr . . . . .	13
margblaðaðr . . . . .	43	Staungull . . . . .	13
toppmyndaðr . . . . .	43	blaðgeingr . . . . .	15
tvöfaldr . . . . .	43	blaðlaus . . . . .	14
útþaninn . . . . .	43	blöðótt . . . . .	15
þaktr . . . . .	43	broddaðr . . . . .	16
þurrhymnaðr . . . . .	43	dúnhærðr . . . . .	16
Saumur . . . . .	53	eins árs . . . . .	18
Seglhymna . . . . .	39	flathærðr . . . . .	16
Skapt . . . . .	13	fýldr . . . . .	15
Skúlpr . . . . .	55	glansandi . . . . .	15
berilíkr . . . . .	55	greinótt . . . . .	16
blöðkulaus . . . . .	55	hálfisívalr . . . . .	14
hnýtt . . . . .	55	háll . . . . .	15
Skegg . . . . .	50	hálfuleiti hríslótt . . . . .	19
Skel . . . . .	54	heill . . . . .	16
		hlykkjótt . . . . .	13

Staungull:	Blæðs.	Staungull:	Blæðs
holóttr . . . . .	18	skurðóttr . . . . .	15
hreysstraðr . . . . .	15	slóttr . . . . .	15
hrisilíkr . . . . .	17	snarpr . . . . .	16
hrislóttr . . . . .	19	snúinn . . . . .	18
livasshærðr . . . . .	16	snýkjandi . . . . .	13
hymnuklæddr . . . . .	15	sprúnginn . . . . .	15
hærðr . . . . .	16	starhærðr . . . . .	16
keyrilíkr . . . . .	18	stinnr . . . . .	18
kjötilíkr . . . . .	18	streindr . . . . .	14
klífrandi . . . . .	18	stríkaðr . . . . .	15
korkbarkaðr . . . . .	15	strýhærðr . . . . .	16
krækjóttr . . . . .	18	svarðliggjandi . . . . .	17
krössgreindtr . . . . .	17	sveymandi . . . . .	14
laukberandi . . . . .	16	taugóttr . . . . .	18
liðóttr . . . . .	14	trélikr . . . . .	18
limugr . . . . .	16	trénaðr . . . . .	19
linur . . . . .	18	tvíeggjaðr . . . . .	14
loðinn . . . . .	16	tvískiptr . . . . .	17
lotinn . . . . .	17	ullaðr . . . . .	16
margskiptr . . . . .	17	uppréttr . . . . .	17
mergjaðr . . . . .	18	uppstigandi . . . . .	17
mjúkbraddaðr . . . . .	16	vængjaðr . . . . .	15
nakinn . . . . .	14	þéttr . . . . .	18
niðráviðbeygðr . . . . .	17	þrískiptr . . . . .	17
niðrlagðr . . . . .	17	þristreindr . . . . .	14
niðrsokkinn . . . . .	14	þyrnumbúinn . . . . .	16
næstum blaðlaus . . . . .	14	ævarandi . . . . .	18
ósléttr . . . . .	15	Steinávöxtur . . . . .	54
rétttupstigandi . . . . .	17	berjumlíkr . . . . .	54
rótumskjótandi . . . . .	18	hálfþurr . . . . .	54
samanþrykktr . . . . .	14	með 1, 2, 3 kjörnum . . . . .	54
silkihærðr . . . . .	16	Stráðr . . . . .	20
sívalr . . . . .	14	án liða . . . . .	20
skáhallr . . . . .	17	burstalíkt . . . . .	20
skríðandi . . . . .	18	knébeygt . . . . .	20

Stráð :	Blaðs.		Blaðs.
skáhallt . . . . .	20	fjaðrað . . . . .	58
slíðrað . . . . .	20	hært . . . . .	58
Streingr . . . . .	24	óskipt . . . . .	58
þunnr . . . . .	24	smáhreystrótt . . . . .	58
Strý . . . . .	38	strihært . . . . .	58
knébogið . . . . .	38		
snúið . . . . .	38	Æxlunarhjarta . . . . .	57
Stýll . . . . .	51	Æxlunarverkfæri . . . . .	50
skrúfumyndaðr . . . . .	51		
Svipa . . . . .	13	Örið . . . . .	51
		blaðilíkt . . . . .	52
Toppur . . . . .	24	fjaðrað . . . . .	52
blaktandi . . . . .	24	holótt . . . . .	52
Trèstreingr . . . . .	57	hvasst . . . . .	51
		krossmyndað . . . . .	51
Uggi . . . . .	35	kúlumyndað . . . . .	51
		kylfumyndað . . . . .	51
Varta . . . . .	60	málaraburstalíkt . . . . .	51
Viðbætur . . . . .	56	óskipt . . . . .	51
Vinkræklur . . . . .	13	sitjandi . . . . .	52
Vængja-ávöxtur . . . . .	52	skjöldmyndað . . . . .	51
Vængir . . . . .	48	snubbótt . . . . .	51
Vængr . . . . .	59	stréndt . . . . .	51
		tönnótt . . . . .	51
Þel . . . . .	58	þrífliþað . . . . .	51
bikarmyndað . . . . .	58		

## 4. REGISTR

yfir latínsku kunstorðin.

	Blaðs.		Blaðs.
<i>A</i> cinus . . . . .	54	<i>C</i> olumella . . . . .	53
<i>A</i> culeus . . . . .	38	<i>C</i> oma . . . . .	59
<i>A</i> la . . . . .	59	<i>C</i> orculum . . . . .	57
<i>A</i> mentum . . . . .	24	<i>C</i> ornus . . . . .	12
<i>A</i> mpulla . . . . .	37	<i>C</i> orolla . . . . .	45
<i>A</i> ngulus . . . . .	35	<i>C</i> orona . . . . .	50
<i>A</i> nnulus . . . . .	39	<i>C</i> ortina . . . . .	39
<i>A</i> nthera . . . . .	50	<i>C</i> orymbus . . . . .	22
<i>A</i> nthodium . . . . .	43	<i>C</i> osta . . . . .	59
<i>A</i> pophysis . . . . .	56	<i>C</i> otyledon . . . . .	57
<i>A</i> rillus . . . . .	58	<i>C</i> ucullus . . . . .	49
<i>A</i> rista . . . . .	38	<i>C</i> ulmus . . . . .	13
<i>B</i> acca . . . . .	54	<i>C</i> yma . . . . .	23
<i>B</i> acca spuria . . . . .	57	<i>D</i> iscus . . . . .	40
<i>B</i> arba . . . . .	50	<i>D</i> issepimentum . . . . .	53
<i>B</i> ractea . . . . .	37	<i>D</i> rupa . . . . .	54
<i>C</i> alcar . . . . .	49	<i>D</i> rupa spuria . . . . .	57
<i>C</i> alyptra . . . . .	56	<i>F</i> asciculus . . . . .	23
<i>C</i> alyx . . . . .	40	<i>F</i> aux . . . . .	46
<i>C</i> alyx communis . . . . .	43	<i>F</i> ilamentum . . . . .	50
<i>C</i> apitulum . . . . .	23	<i>F</i> los . . . . .	39
<i>C</i> apsula . . . . .	52	<i>F</i> los masculinus . . . . .	51
<i>C</i> apsula spuria . . . . .	57	<i>F</i> oliolum . . . . .	35
<i>C</i> arina . . . . .	48	<i>F</i> olium . . . . .	25
<i>C</i> auda . . . . .	59	<i>F</i> olium caulinum . . . . .	30
<i>C</i> aulis . . . . .	13	<i>F</i> olium florale . . . . .	30
<i>C</i> irrhus . . . . .	37	<i>F</i> olium radicale . . . . .	30

	Blaðs.		Blaðs.
<i>Folium ramicum</i> . . . . .	30	<i>Nectarium</i> . . . . .	49
<i>Folium seminale</i> . . . . .	30	<i>Nectarium labii</i> . . . . .	49
<i>Folliculus</i> . . . . .	52	<i>Nucleus</i> . . . . .	54
<i>Fornix</i> . . . . .	50	<i>Nux</i> . . . . .	54
<i>Fovea</i> . . . . .	49	<i>Operculum</i> . . . . .	56
<i>Frons</i> . . . . .	35	<i>Palatum</i> . . . . .	47
<i>Fructus</i> . . . . .	52	<i>Palæa</i> . . . . .	59
<i>Fructus spurius</i> . . . . .	56	<i>Panicula</i> . . . . .	24
<i>Fulera</i> . . . . .	36	<i>Pappus</i> . . . . .	58
<i>Funiculus</i> . . . . .	58	<i>Pedicellus</i> . . . . .	20
<i>Galea</i> . . . . .	47	<i>Pedunculus</i> . . . . .	13
<i>Gemma</i> . . . . .	38	<i>Pelta</i> . . . . .	60
<i>Germen</i> . . . . .	51	<i>Pepo</i> . . . . .	54
<i>Glandula</i> . . . . .	38	<i>Perianthium</i> . . . . .	41
<i>Glandula nectarifera</i> . . . . .	49	<i>Perianthium proprium</i> . . . . .	44
<i>Glomerus</i> . . . . .	23	<i>Pericarpum</i> . . . . .	52
<i>Gluma</i> . . . . .	42	<i>Pericæthium</i> . . . . .	44
<i>Hilum</i> . . . . .	58	<i>Peristoma</i> . . . . .	56
<i>Inflorescentia</i> . . . . .	21	<i>Petulum</i> . . . . .	45
<i>Involucellum</i> . . . . .	44	<i>Petiolus</i> . . . . .	13
<i>Involuerum</i> . . . . .	44	<i>Pileus</i> . . . . .	39
<i>Lacinia</i> . . . . .	35	<i>Pili</i> . . . . .	39
<i>Lamina</i> . . . . .	48	<i>Pinna</i> . . . . .	35
<i>Legumen</i> . . . . .	55	<i>Pistillum</i> . . . . .	39, 51
<i>Ligula</i> . . . . .	37	<i>Plica</i> . . . . .	49
<i>Limbus</i> . . . . .	46	<i>Plumula</i> . . . . .	51
<i>Lobus</i> . . . . .	35	<i>Pollen</i> . . . . .	51
<i>Loculamenta</i> . . . . .	53	<i>Pomum</i> . . . . .	54
<i>Lomentum</i> . . . . .	56	<i>Pori nectariferi</i> . . . . .	49
<i>Mas</i> . . . . .	51	<i>Pruina</i> . . . . .	59
<i>Membrana interna</i> . . . . .	57	<i>Putamen</i> . . . . .	54
		<i>Racemus</i> . . . . .	22

	Blads.		Blads.
<i>Rachis</i> . . . . .	21	<i>Stipulæ</i> . . . . .	36
<i>Radii</i> . . . . .	40	<i>Stolo</i> . . . . .	13
<i>Radix</i> . . . . .	10	<i>Strobilus</i> . . . . .	57
<i>Rami</i> . . . . .	13	<i>Stylus</i> . . . . .	51
<i>Receptaculum</i> . . . . .	59	<i>Surculus</i> . . . . .	13
<i>Receptaculum commune</i> .	59	<i>Sutura</i> . . . . .	53
<i>Receptaculum proprium</i> .	59		
<i>Rictus</i> . . . . .	47	<i>Thalamus</i> . . . . .	69
<i>Rostellum</i> . . . . .	57	<i>Theca</i> . . . . .	56
<i>Rostrum</i> . . . . .	59	<i>Thyrus</i> . . . . .	24
		<i>Truncus</i> . . . . .	13
<i>Samara</i> . . . . .	52	<i>Tuberculum</i> . . . . .	60
<i>Sarmentum</i> . . . . .	13	<i>Tubus</i> . . . . .	45
<i>Scapus</i> . . . . .	13	<i>Tunica</i> . . . . .	57
<i>Scutellum</i> . . . . .	60		
<i>Silicula</i> . . . . .	55	<i>Umbella</i> . . . . .	22
<i>Siliqua</i> . . . . .	55	<i>Umbella partialis</i> . . .	23
<i>Sinus</i> . . . . .	35	<i>Umbella universalis</i> . .	22
<i>Sorus</i> . . . . .	24	<i>Unguis</i> . . . . .	48
<i>Spatha</i> . . . . .	45	<i>Utriculus</i> . . . . .	52
<i>Spica</i> . . . . .	21		
<i>Spina</i> . . . . .	38	<i>Vaginæ</i> . . . . .	37
<i>Squama</i> . . . . .	44	<i>Valvulæ</i> . . . . .	53
<i>Squamæ nectariferæ</i> . . .	49	<i>Velum</i> . . . . .	39
<i>Stamen</i> . . . . .	50	<i>Verticillus</i> . . . . .	23
<i>Stigma</i> . . . . .	51	<i>Vexillum</i> . . . . .	48
<i>Stipes</i> . . . . .	13	<i>Volva</i> . . . . .	39



## 5. REGISTR.

yfir nytsemi og verkun urtanna.

	<i>Blæðs.</i>	<i>Blæðs.</i>
<b>A</b> bleysi lækna, 89, 287, 298.	146, 149, 164, 199, 226, 238, 240, 263, 275, 285, 340.	
Andarteppu lækna . . . 298.		
Augnaveiki lækna . . . 220.	Bólgu linar og dreifir, 83, 152, 247, 255, 262, 264, 333.	
Augusviða-bætir . . . 231.		
Augum skaðlig . 153, 352.	Bólgu innvortis linar, 240, 263.	
Augu vot-bætir . . . 231.		
<b>B</b> arkandi urtir, 79, 120, 124, 125, 164, 174, 176, 177, 185, 209, 210, 212, 214, 216, 217, 224, 231, 244, 257, 285, 294, 297, 304, 308.	Brauð má gjöra af, 142, 113, 213, 248, 285.	
Bláan lit gefa . . . 138.	Brenna má sneð, 220, 224.	
Blóðgáng stillir . . . 120.	Brjóstveiki lækna, 158, 186, 212, 220, 251, 266, 346.	
Blóðlát stillir, 124, 125, 141, 166, 177, 209, 213, 263, 294, 304.	Brúna lækna . . . 187.	
Blóðrás stillir, 79, 120, 177, 352.	Búkhreinsandi urtir, 140, 154.	
Blóðsótt lækna, 125, 164, 177, 209, 266, 294, 308, 340.	<b>D</b> ofa lækna . . . 198.	
Blóð staðnað og þykkt uppleysir og þynnir, 238.	Dreifandi urtir, 179, 189, 251, 261.	
Blóðrustein uppleysir, 185, 209, 212, 245, 285.	Drepsóttum mótstendr, 146.	
Blóðhreinsandi urtir, 115,	Drifandi jurtir . . . 251.	
	Dýnur má stoppa með, 93, 258.	
	Dökkgrænan lit gefr, 336.	
	Dökkgulan lit gefr . 338.	
	Dökkkan lit gefa, 342, 345.	
	<b>E</b> itruð urt . . . 220.	
	Eldiviðar til má brúka, 333.	

	<i>Blaðs.</i>	<i>Blaðs.</i>
<b>F</b> lær burtdrifr . . .	178.	Harðlifi lækna, 115, 164,
Fóðrurtir góðar, 78, 81, 82,		166, 199, 226, 255, 340.
85, 91, 92, 95, 96, 97,		Heyrnardeyfu lækna . 220.
98, 99, 100, 101, 102,		Hjartastyrkjandi urtir, 135,
103, 105, 108, 109, 110,		140, 210, 226, 264.
111, 114, 119, 137, 151,		Hold sveiki lækna, 164, 285.
176, 205, 206, 219, 227,		Hósta lækna, 146, 199, 230,
247, 248, 249, 250, 274,		263, 266, 287, 340.
275, 276, 290, 331, 346.		Hraðberg á tönnum upp-
Fóksandi skýlir . . .	94.	leysir . . . . . 212.
Forrotnun mótstandi, 89,		Hreinsandi jurtir, 83, 224,
136, 146, 149, 164, 166,		313.
174, 199, 214, 294, 297.		Hríngormum eyðir . 156.
Fótaveiki lækna, 212, 314.		Hundsbit lækna . . 343.
Fréknir burttékr . 156.		Húspil má troða með, 315.
Fylli eyðir . . . . . 264.		Hæsi burttékr . . . 266.
Fægja má með . 305, 306.		Höfuð styrkir . . . 84.
<b>G</b> igt lækna . . 213, 242.		Hörundssviða og húðleysi
Gráan lit gefa . . . 348.		. . lækna . 185, 254, 263.
Græðandi jurtir, 83, 123,		<b>I</b> ktsýki lækna, 135, 141,
125, 152, 209, 212, 261.		212, 220, 261.
Grænan lit gefa, 119, 138.		Iðrabólgu lækna . 152.
178, 213, 310, 329, 338,		Iðraverk lækna . . 308.
341, 345.		Igerðir, <i>njá</i> : meinsemdir.
Gulan lit gefa, 121, 164,		Innannein lækna . 340.
174, 179, 224, 230, 249,		Innantökur lækna, 146, 149,
255, 259, 286, 297, 308,		263.
309, 341, 345, 347.		<b>K</b> affebrúnan lit gefa, 176,
Gulu lækna, 115, 137, 146,		333, 347.
148, 154, 164, 179, 191,		Kláða lækna, 164, 195, 255,
230, 247, 251, 263, 285,		264, 285.
297, 333, 347.		Klæðaföll hvít lækna, 245.
<b>H</b> árvöxt eykr . . . 84		Krabbamein lækna . 200.

<i>Blæðs.</i>	<i>Blæðs.</i>
Kraptaleysi, <i>sjd</i> : máttleysi.	Mannagrjóu gefr . 110.
Kreppusótt læknar . 240.	Matar ólyst lækna, 79, 89,
Kvef lækna, 122, 153, 199,	123, 141, 146, 149, 166,
226.	177, 214, 263, 285, 294,
Kveiki má gjöra af, 93, 172.	340.
Kverkabólgu lækna . 229.	Máttleysi lækna, 122, 220,
Kverkamein læknar . 125.	285, 298, 340.
Kýli, <i>sjd</i> : meinsemdir.	Maturtir, 97, 127, 147, 165,
Kælandi urtir, 152, 166,	177, 196, 198, 213, 227,
174, 296, 333.	238, 248, 251, 312, 327,
Köldu lækna, 122, 141, 174,	328, 330, 331, 332, 333,
214, 294.	340, 342, 344, 349, 350.
<b>L</b> andfarsóttum í hollt, 115,	Megrúnarsótt læknar . 79.
141, 214.	Meinsemdir etr út, 93, 152,
Lénur má tilbúa af, 91, 114.	189, 251, 255.
Líðaverk læknar, 261, 298.	Meinsemdir innvortis
Lifrarveiki læknar, 115, 137,	lækna, 179, 255, 264,
148, 164, 179, 211, 240.	297, 333.
Lifrauðan lit gefa, 174,	Miltisbólgu lækna, 137, 153,
245, 296, 344.	240.
Lífisýki lækna, 79, 122, 124,	Mjólk góða gefr . . 346.
125, 164, 174, 177, 185,	Mjólk í konubróstum
209, 210, 213, 214, 216,	eykr . . . . . 148.
217, 230, 244, 266, 294,	Mjólk staðnaðri í kvenna-
296, 297, 298, 304, 308,	bróstum dreifir . 261.
340.	Mjólk hleypir . . . 84.
Lukt góða gefa, 85, 146, 226.	Mjöl má tilbúa af, 97, 115,
Lúgnaveiki læknar . 340.	172, 194, 215, 248, 312.
Lútarsalt má tilbúa af, 310,	Mótorf vex undir . 91.
329, 336.	Munnsviða læknar . 185.
Lýs drepr . . . . 84.	Músum ver . . . 176.
<b>M</b> agastyrkjandi urtir, 89,	Mýkjandi urtir, 83, 120,
136, 211, 231, 240, 242,	124, 152, 153, 189, 230,
298, 333.	251, 255, 263, 265, 312.
	Mölum ver . . . 226.

	<i>Blæðs.</i>	<i>Blæðs.</i>
Nasablöð stilla,	217, 304.	Sár græðir hreinsar og
Niðrfallssótt lækna,	89, 120,	þerrar, 79, 82, 122, 174,
149, 226, 264.		177, 209, 214, 217, 224,
Niðrgang verkar . . .	199.	245, 259, 297.
Nýrnastein lækna,	199, 212.	Sár í lúngum græðir, 152.
Nærandi jurtir, 135, 265,		Sinar-bilaðar og krept-
333, 340.		ar mýkja og styrkja, 120,
Óhreiniendi magans		124, 226, 263, 297.
læknar . . . . .	200.	Sinateygjur lækna, 141, 149,
Ólættum konum óholl		180, 218, 263, 264.
urt . . . . .	240.	Sjón styrkir . . . 78, 89.
Ólgu blóðsins linar .	166.	Skiun barka, 119, 174, 176,
Opnandi urt . . . . .	247.	210, 224, 244, 297, 305,
Ormdrepandi urtir, 123, 136,		310, 341.
141, 146, 240, 242, 264,		Skurði græðir . . . . 125.
285, 294, 310, 340.		Skurfur lækna . . . . 84.
Óstyrk líkamans lækna, 79,		Skýrbjúg lækna, 89, 114,
294.		146, 164, 166, 174, 199,
Purpurarauðan lit gefr, 181.		210, 238, 240, 242, 255,
Rauðan lit gefa, 120, 215,		285, 294, 296, 298.
341, 342, 347.		Slimeyðandi urtir, 230, 312.
Reykelsis í stað má		Slög læknar . . . . 200.
brúka . . . . .	298.	Smekk góðan gefa, 146, 148.
Rottum ver . . . . .	176.	Smiða til má brúka . 292.
Rúmsæng úr má uppi-		Smjör-urt góð . . . 346.
fylla . . . . .	258, 320.	Sóttum í þéttanlig . 146.
Samandragandi urtir, 120,		Spitelsku læknar . . 255.
122, 164, 177, 230, 231,		Sprúngur græðir . . 83.
237, 263, 285, 340.		Steina í blöðru og nýr-
Sápugjörðar til má		urt brýtr . . . . 189.
brúka . . . . .	310.	Stillandi urtir, 218, 265, 333.
		Styrkjandi urtir, 79, 89, 120,
		122, 124, 135, 141, 146,
		149, 164, 176, 177, 209,
		212, 214, 216, 231, 237,

*Bláðs.*

- 244, 261, 263, 285, 294,  
297, 333, 340.
- Svartan lit gefa, 119, 155,  
178, 185, 245, 339.
- Svima lækna . . . 220.
- Svitadrífandi urtir, 89, 120,  
136, 141, 146, 149, 209,  
212, 238, 247, 264, 275,  
298, 333.
- Svæfandi urtir . 180, 218.
- T**annpínu lækna . 178.
- Te-urtir . . 89, 186, 285.
- Tiðablóð leiðir, 146, 149,  
189, 226, 238, 240, 264,  
287, 298.
- Tóbaksstað í má brúka, 259.
- Tök inn- og útvortis,  
lína, 146, 220, 263, 333.
- U**ppdráttar-sýki lækna-  
ar . . . 79, 333.
- Uppleysandi jurtir, 89, 115,  
136, 141, 146, 148, 153,  
179, 191, 199, 213, 238,  
240, 242, 261, 263, 287,  
308, 333.
- Uppsölu stillir . . . 261.  
— , verkar, 140, 180,  
199.
- Uppþembu magans lækna,  
141, 263, 308, 340.
- Uppörfandi urtir, *sjá:*  
styrkjandi.

*Bláðs.*

- Úthrot lækna, 83, 164, 255,  
237.
- V**allgang leiða og  
mýkja, 152, 164, 166,  
255, 333, 340.
- Vatnssýki lækna, 115, 116,  
137, 149, 154, 164, 247,  
255, 298, 333.
- Verkeyðandi urtir, 209, 213,  
251, 263, 308.
- Vessa slæma og skarpa  
uppleysa, þurka og  
þynna, 89, 136, 164, 166,  
174, 199, 226, 238, 242,  
255, 297.
- Vinkeyðandi urtir, 141, 146,  
148, 149, 298.
- Þ**ekja má hús með, 114.
- Þetta má með . 91, 315.
- Þil á húsum má troða  
með . . . . . 320.
- Þófa má gjöra af . 114.
- Þorsta í landfarsóttum  
stilla, 166, 174, 296.
- Þrota linar, *sjá:* bólgu.
- Þvagdrífandi urtir, 89, 115,  
136, 154, 189, 209, 212,  
217, 226, 238, 240, 247,  
255, 263, 275, 285, 287,  
296, 298, 304, 333.
- Æ**xlum eyðir . . 220.

100

100

100

100

V

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

